

FE DE ERRORES

En el número 3 de 2008 de la Revista SEMERGEN en el artículo “Recomendaciones de buena práctica clínica en artrosis” (SEMERGEN. 2008;34(3):143-8) en las tres tablas incluidas en la página 146 aparecen unos datos erróneos. A continuación reproducimos las tablas correctas:

Tabla 1. Criterios de clasificación de la artrosis de mano

1. Dolor o rigidez de la mano, muchos días en el mes previo
2. Deformación ósea en ≥ 2 de las 10 articulaciones seleccionadas*
3. Tumefacción de ≤ 2 MCF
4. Deformación ósea en ≥ 2 IFD (2. ^a y 3. ^a IFD pueden ser contadas en 2 y 4)
5. Deformidad de 1 de las 10 articulaciones de la mano seleccionadas*
Diagnóstico de artrosis de mano sí: 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 Sensibilidad 93%, especificidad 97%
*2. ^a y 3. ^a interfalángica distal (IFD), 2. ^a y 3. ^a IFD y 1. ^a carpometacarpiana de ambas manos; MCF: metacarpofalángicas. Tomada de: Altman RD. Classification of disease: osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum. 1991;20(6 Suppl 2):40-7.

Tabla 2. Criterios de clasificación de la artrosis de cadera

Criterios clínicos	Criterios clínicos, de laboratorio y radiológicos
1. Dolor de cadera*	1. Dolor de cadera*
2. Rotación interna $< 15^\circ$	2. ESD < 20 mm/hora**
3. Dolor a la rotación interna $> 15^\circ$	3. Osteofitos en las radiografías (acetábulo y/o fémur)
4. ESD ≤ 45 mm/hora	4. Reducción del espacio articular radiográfico
5. Flexión de cadera $< 115^\circ$	
6. Rigidez matutina ≤ 60 minutos	
7. Edad > 50 años	
Artrosis de cadera sí:	Artrosis de cadera sí:
1, 2, 4, 6	1, 2, 3, 6
1, 2, 5, 6	1, 2, 4, 6
1, 3, 6, 7	1, 3, 4
Sensibilidad 86%	Sensibilidad 89%
Especificidad 75%	Especificidad 91%

*Muchos días el mes anterior.

**Eritrosedimentación (ESD).

Tomada de: Altman RD. Classification of disease: osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum. 1991;20(6 Suppl 2):40-7.

Tabla 3. Criterios de clasificación de la artrosis de rodilla

Criterios clínicos	Criterios clínicos, de laboratorio y radiológicos
1. Dolor de rodilla*	1. Dolor de rodilla
2. Crepitaciones	2. Osteofitos
3. Rigidez matutina de rodilla ≤ 30 minutos	3. Líquido sinovial de artrosis**
4. Edad ≥ 38 años	4. Edad ≥ 40 años
5. Deformidad ósea	5. Rigidez matutina de rodilla ≤ 30 minutos
6. Ausencia de crepitaciones y deformidad ósea	6. Crepitaciones
Artrosis de rodilla sí:	Artrosis de rodilla sí:
1, 2, 3, 4 ó	1, 2 ó
1, 2, 3, 5 ó	1, 3, 5, 6 ó
1, 6	1, 4, 5, 6
Sensibilidad 89%	Sensibilidad 94%
Especificidad 88%	Especificidad 88%

*Muchos días el mes anterior.

**Líquido sinovial < 2.000 GB/ml, claro, viscoso.

Tomada de: Altman RD. Classification of disease: osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum. 1991;20(6 Suppl 2):40-7.