

## LA IMAGEN DE LA SEMANA

Fig. 1.

Fig. 2.

Mujer de 47 años con antecedentes personales de mastectomía radical por carcinoma ductal infiltrante en 1995 en tratamiento con tamoxifeno. Acudió a la consulta de atención primaria por fiebre de 4 días de evolución y disestesias en la cara anterior del muslo izquierdo. Se inició estudio de las causas de la fiebre sin foco, siendo las exploraciones complementarias normales. Tras 15 días de evolución del cuadro acudió a la revisión ginecológica anual donde se objetivó tumefacción y eritema de la zona del muslo. En la ecografía del muslo izquierdo se observó una colección quística. En una RM se puso de manifiesto una lesión quística intramuscular (fig. 1), con múltiples imágenes vesiculares en su interior (fig. 2). En el estudio anatomo-patológico se observó una formación quística de  $18,5 \times 10 \times 8,5$  cm de tamaño con numerosas estructuras vesiculares con restos de escólicas en su interior.

**Diagnóstico:** Quiste hidatídico abscesificado.

Dra. C. Pérez Aznar, Dra. E.M. López Nuñez, Dra. I. Pérez Cano.  
Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. C.S. Francia. Fuenlabrada. Madrid.