


IMÁGENES EN UROLOGÍA



LITIASIS EN RESERVORIO ILEAL

Paciente de 49 años intervenido quirúrgicamente en septiembre de 1992 por neoplasia vesical, practicándose cistectomía radical y neovejiga ileal tipo Camey II.

Portador de prótesis de pene tipo Mark 2 desde julio de 1994.

Presentó en 3 ocasiones después de la cirugía radical, la presencia de litiasis en neovejiga secundarias a calcificación sobre elementos de sutura que precisaron abordaje endoscópico mediante litotricia vesical transuretral mecánica, extrayendo la totalidad de fragmentos (años 95, 96, 97).

Acude en octubre de 2001 por episodio de R.A.O. que precisó sondaje evacuatorio, descubriéndose en Rx de aparato urinario litiasis en reservorio (Figs. 1 y 2).

El paciente refería en el último año presencia ocasional de orina turbia y maloliente.

Finalmente el paciente fue intervenido quirúrgicamente mediante la combinación de litotricia endoscópica electrocinética y mecánica, previa dilatación de anillo subestenótico en uretra posterior.

J.A. Cuesta Alcalá, A. Solchaga Martínez, J.L. Arrondo Arrondo, I. Pascual Piédrola, L. Ripa Saldías, J. Aldave Villanueva, V. Grasa Lanau, M. Ponz González, A. Ipiens Aznar
Servicio de Urología. Hospital de Navarra. Pamplona (Navarra)