

*Imágenes en Urología***Reflujo secundario a resección transuretral**

Antonio Jalón Monzón, Miguel Álvarez Múgica, Jesús M<sup>a</sup> Fernández Gómez, Laura Rodríguez Robles, Roberto C. González Álvarez, Francisco J. Regadera Sejas

*Servicio de Urología-1. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias, España*

**V**arón de 76 años de edad controlado en nuestras consultas de uro-oncología por tumores vesicales superficiales recidivantes. En cistoscopia de control realizada se observa una vejiga con fondo eritematoso y un trígono deslustrado y fibroso con implantación de ambos orificios ureterales lateralizados, muy amplios y refluientes, consecuencia de múltiples resecciones sobre ellos (Figs. 1 y 2).



**FIGURA 1**

La actitud diagnóstico-terapéutica de aquellos tumores vesicales que asientan sobre el orificio ureteral será la resección conjunta del tumor junto con una pastilla del propio meato, teniendo



**FIGURA 2**

la precaución de no coagular sobre el orificio ureteral para evitar estenosis secundarias. Posteriormente se comprobará mediante urografía intravenosa si existe afectación tumoral del tracto urinario superior.

---

Correspondencia autor: Dr. Antonio Jalón Monzón  
Servicio de Urología-1  
Hospital Universitario Central de Asturias  
Celestino Villamil, s/n - 33006 Oviedo, Asturias  
Tel.: 985 108 004  
E-mail autor: ajalonm@hotmail.com  
Información artículo: Imágenes en Urología  
Trabajo recibido: junio 2006  
Trabajo aceptado: julio 2006