

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

Glositis romboidea mediana



Figura 1. Zona depapilada en el tercio medio y posterior de la superficie lingual (colección del Prof. Dr. G. Veltman).

Criterios de diferenciación

- Diagnóstico: test de cándida (considerada actualmente como candidiasis localizada).
 - Sin ulceración.
 - Sin márgenes ulcerosos excavados.
 - Capa blanquecina central desprendible (no siempre).
 - Posibles formas hipertróficas.

Diagnóstico diferencial

Leucoplasia: capa blanquecina no desprendible, localización central poco frecuente.

Síndrome de Melkersson-Rosenthal: gingivitis hipertrófica, asocia alteraciones granulomatosas en la superficie lingual y labial, parálisis facial.

Depósitos amiloides: pueden confundirse con la variante hipertrófica.

Carcinoma espinocelular: histología sólo en caso de sospecha, presenta márgenes infiltrados.

Tratamiento

Antimicóticos.

Tuberculosis ulcerosa de la mucosa



Figura 2. Lesiones ulcerosas en el tercio medio y posterior de la superficie lingual (colección del prof. Dr. G. Veltman).

Criterios de diferenciación

- Diagnóstico: test de tuberculina, diagnóstico etiológico microscópico y/o mediante cultivo, biopsia.
 - Desprendimiento tisular.
 - Frecuente excavación de márgenes ulcerosos.
 - Posibles depósitos blanquecinos desprendibles.
 - Posibles lesiones ulcerovegetantes.

Diagnóstico diferencial

Tuberculosis en paciente VIH: serología.

Sífilis terciaria: serología, biopsia.

Sarcoidosis: hallazgo radiológico pulmonar, histología, prueba de Kveim.

Lepra: histología.

Tratamiento

Derivar a especialista.

(Quintessenz. 2005;56(12):1225)

Correspondencia: Dr. Wolfgang Bengel.
Darmstädter Strasse 190a, 64625 Bensheim. Alemania.