

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

Lesión epitelial por intoxicación



Figura 1. Lesión epitelial blanquecina desprendible en la zona gingival.

Criterios de diferenciación

- Epitelio desprendible.
 - Localizada.
 - Anamnesis: administración de fármaco (en este caso: gel de CHX), frecuentemente automedicación.
 - Ninguna otra lesión de la mucosa.

Diagnósticos diferenciales

Candidiasis: componentes inflamatorios, anamnesis, otras lesiones.

Quemadura: anamnesis.

Tratamiento

Suspensión de la administración del fármaco, aclaración al paciente.

(Quintessenz. 2006;57(1 y 2):35 y 127)

Correspondencia: Dr. Wolfgang Bengel.
Wilhelm-Leuschner-Strasse 11. 64625 Bensheim. Alemania.

Leucoqueratosis del fumador



Figura 2. Alteración epitelial blanquecina en la zona gingival.

Criterios de diferenciación

- Alteraciones blanquecinas no desprendibles.
 - Por lo general no se circunscribe a una zona concreta.
 - Anamnesis: gran fumador (en este caso: > 50 cigarrillos al día).
 - Otras alteraciones asociadas a fumadores.

Diagnósticos diferenciales

Leucoplasias de otra etiología: anamnesis.

Leucoedema: predilección por la mucosa palatina.

Tratamiento

Visitas de control al paciente, explicación, documentar el diagnóstico.

Absceso periodontal

Figura 3. Tumefacción aguda con dolor a la presión en la zona gingival.

Fibromas simétricos

Figura 4. Engrosamiento gingival bilateral en la zona de la tuberosidad maxilar (colección de Kramer).

Criterios de diferenciación

- Cursa con dolor.
 - Unilateral.
 - Formación súbita.
 - Se pueden constatar problemas periodontales radiográficamente.
 - Frecuente en fumadores.

Diagnósticos diferenciales

Tumores: sin componentes inflamatorios, evolución lenta.

Periodontitis apical: prueba de vitalidad, radiografía.

Engrosamiento gingival medicamentoso: anamnesis, no circunscrito a un solo diente, inicio con frecuencia en el sector anterior.

Tratamiento

Incisión, tratamiento periodontal.

Criterios de diferenciación

- Cursan sin dolor.
 - Simétricos.
 - Evolución lenta, principalmente en adultos jóvenes.
 - No se aprecian radiográficamente.
 - No asociados al tabaquismo.

Diagnósticos diferenciales

Tumores: por lo general, unilaterales.

Inflamación: cursa con dolor, aguda y de rápido desarrollo.

Fibromatosis gingival: no circunscrita a la zona de la tuberosidad maxilar.

Tratamiento

En caso de molestias, extirpación quirúrgica.