

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

Queratosis seborreica



Figura 1. Tumor cutáneo pigmentado irregular pero bien delimitado.

Criterios de diferenciación

- Crecimiento lento.
 - Sin hemorragia.
 - Sin descamación.
 - Con frecuencia, llamativa en la región temporal.
 - Superficie recubierta por una capa grasa que se puede eliminar con alcohol.
 - Sin halo eritematoso inflamatorio.

Diagnósticos diferenciales

Otras lesiones pigmentadas: sin capa grasa, histología.

Basalioma: histología, telangiectasias.
 Queratoma senil: hiperqueratosis de color marrón pálido, eritema inflamatorio.

Tratamiento

Exéresis si es sintomático.

Melanoma maligno



Figura 2. Lesión cutánea elevada de coloración negroazulada en la región malar (colección Veltman).

Criterios de diferenciación

- Crecimiento rápido.
 - Posible hemorragia.
 - Posible descamación.
 - Grandes lesiones en la región temporal poco frecuentes.
 - Sin capa grasa.
 - Halo eritematoso inflamatorio.

(*Quintessenz*. 2006;57(4-5):360 y 569)

Correspondencia: Dr. Wolfgang Bengel.
 Wilhelm-Leuschner-Strasse 11. 64625 Bensheim. Alemania.

Diagnósticos diferenciales

Otros tumores pigmentados: signos sospechosos de melanoma: aumento de tamaño, crecimiento asimétrico, lesiones satélite, hemorragia, halo eritematoso, prurito, escozor.

Mancha pigmentada: sin alteraciones.

Síndrome de Peutz-Jeghers: pigmentación perioral, poliposis gastrointestinal.

Tatuaje de amalgama (intraoral): generalmente, de fácil diagnóstico en regiones próximas a los dientes, en las regiones alejadas, estigma central generalmente visible.

Tratamiento

Derivar a especialista.

Hiperplasia lingual



Figura 3. Tumor bien delimitado en el borde lingual (colección de Hagedorn).

Criterios de diferenciación

- Bien delimitada.
 - No compresible.
 - Consistencia dura.
 - Circunscrita.
 - Sin cambios de la coloración mucosa.

Diagnóstico diferencial

Fibroma: difícil diferenciación clínica, histología.

Otros tumores: histología.

Enfermedad de Heck: múltiple, plana, blanda, vírica.

Tratamiento

Exéresis si es sintomática.

Hemangioma lingual



Figura 4. Lesión elevada azulada en el territorio lingual izquierdo (colección de Hagedorn).

Criterios de diferenciación

- Peor delimitado.
 - Desaparece a la presión.
 - Fluctuante.
 - Superficie extensa.
 - Color azulado.

Diagnóstico diferencial

Hematoma: no desaparece a la presión, difunde en el tejido, anamnesis.

Linfangioma: coloración clara.

Tatuaje de amalgama: no desaparece a la presión, no elevado, estigma central generalmente visible.

Tratamiento

Por especialista, control radiográfico previo al tratamiento quirúrgico para descartar posible hemangioma mandibular central.