

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(Quintessenz. 2007;58(4):360)

Mordedura bucal



Figura 1. Mucosa yugal con alteraciones riciformes características.

Criterios de diferenciación

- Evolución a largo plazo
 - La afectación a menudo es simétrica
 - Más frecuente en pacientes jóvenes
 - La anamnesis es esencial para la detección del hábito
 - Pequeñas lesiones epiteliales
 - El resto de la mucosa está intacta

Diagnósticos diferenciales

Leucoplasia: ausencia de microlesiones.

Candidiasis: placas separables.

Estomatitis de contacto: anamnesis.

Liquen plano: en general, afectación característica de otras mucosas.

Tratamiento

No lo requiere. Informar al paciente sobre el hábito y sugerirle un cambio de conducta.

Lesión mucosa tóxica (en este caso: automedicación con esencia de clavo)



Figura 2. Epitelio mucoso separable.

Criterios de diferenciación

- Presentación aguda
 - Limitada a los lugares de aplicación
 - Sin preferencia por ningún grupo de edad
 - La anamnesis es esencial para identificar la causa
 - Mucosa inflamada
 - Transición progresiva a mucosa sana

Diagnósticos diferenciales

Candidiasis: presentación menos aguda, evolución más lenta.

Enfermedad ampollar: sin autolimitación, histología.

Liquen oral: ausencia de un cuadro clínico agudo, lesiones blanquecinas en otro lugar característico.

Gingivoestomatitis herpética: habitualmente en niños pequeños, no sólo afectación local.

Tratamiento

Evitar la exposición al agente causal, desinfectantes tópicos.