

# Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(Quintessenz. 2007;58[11]:1227)

## Lesión tóxica por esencia de clavos



Figura 1. Epitelio hinchado, parcialmente desprendible.

### Criterios de diferenciación

- El epitelio puede desprenderse parcialmente con la pípeta.
- Poco doloroso.
- Anamnesis: automedicación con un preparado basado en esencia de clavos.

### Diagnósticos diferenciales

*Acción tóxica de otras sustancias: anamnesis.*

*Enfermedades ampollosas: histología. Anamnesis, lesión menos circunscrita y limitada a una localización.*

*Mucositis por radioterapia: anamnesis.*

*Eritema exudativo multiforme: anamnesis, inicio brusco, enfermedad secundaria después de una infección herpética.*

*Liquen ruber penfigoide: habitualmente simétrico, no limitado a una sola localización.*

*Infección por Candida: posible identificación de Candida.*

### Tratamiento

Desinfectantes tópicos, informar al paciente.

## Estomatitis por rollos de algodón



Figura 2. Lesión erosionada, parcialmente cubierta de fibrina.

### Criterios de diferenciación

- Epitelio no desprendible.
- Más doloroso.
- Anamnesis: tratamiento odontológico previo.

### Diagnósticos diferenciales

*Irritación químico-tóxica: epitelio hinchado y generalmente desprendible.*

*Quemadura por ácido acetilsalicílico: anamnesis.*

*Afta: aparición en mucosa no queratinizada, no afecta a encías.*

*Traumatismo mecánico: anamnesis.*

### Tratamiento

Desinfectantes tópicos.