

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2008;59(1):14)

Liquen plano mucoso



Figura 1. Alteraciones blanquecinas en el dorso de la lengua (Colección Prof. Dr. F. A. Böhmer, Bremen).

Criterios de diferenciación

- Alteraciones reticulares blanquecinas también en otras mucosas
- También posibilidad de alteraciones cutáneas (pápulas)
- Serología normal
- VIH negativo
- No se detectan virus
- Histología

Diagnósticos diferenciales

Efecto tóxico: ni reticulación ni placas mucosas.
Candida: microbiología, recubrimiento desprendible.
Hiperqueratosis por fricción: localizada.
Nevo esponjoso: no reticulado.

Tratamiento

Información del paciente, consulta dermatológica.

Leucoplasia vellosa



Figura 2. Lesiones leucoplásicas en el borde de la lengua (Colección Prof. Dr. F. A. Böhmer, Bremen).

Criterios de diferenciación

- Alteraciones blanquecinas sobre todo en el borde de la lengua
- Ausencia de alteraciones cutáneas
- Serología normal
- VIH positivo
- Detección de virus de Epstein-Barr
- Histología

Diagnósticos diferenciales

Leucoplasia: no se limita a lesiones estriadas en el borde de la lengua.
Hiperqueratosis por fricción: serología.
Candidiasis: alteraciones desprendibles.
Placas opalinas: serología.

Tratamiento

Centro especializado.