

## Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2007;58(12):1265)

### Queilofagia



Figura 1. Epitelio tumefacto, parcialmente separable (Colección Prof. Dr. F. A. Bahmer, Bremen).

### Carcinoma verrugoso



Figura 2. Lesión exofítica en forma de coliflor (Colección Prof. Dr. F. A. Bahmer, Bremen).

### Criterios de diferenciación

- Sin aumento de volumen.
- Ausencia de infiltración.
- En general, en personas jóvenes.
- No existen grupos de riesgo.

### Diagnósticos diferenciales

*Efecto tóxico:* anamnesis.

*Candida:* microbiología, recubrimiento desprendible, generalmente simétrica.

*Líquen plano oral:* alteraciones blanquecinas más reticuladas, epitelio intacto, sólo engrosado.

*Hiperqueratosis por fricción:* puede ser secundaria a la queilofagia.

### Tratamiento

Información del paciente.

### Criterios de diferenciación

- Aumento de volumen.
- Infiltración.
- En general, pacientes mayores de 50 años.
- Sin regresión espontánea.
- Grupos de riesgo: fumadores, bebedores de alcohol.

### Diagnósticos diferenciales

*Leucoplasia verrugosa:* sólo se puede distinguir histológicamente.

*Hiperqueratosis por fricción:* sin aumento de volumen.

*Candidiasis hiperplásica:* normalmente simétrica.

*Papiloma:* histología, sin infiltración.

*Acantosis nigricans:* alteraciones cutáneas, normalmente no se limita a una localización.

*Queratoacantoma:* histología, habitualmente con un cráter central.

### Tratamiento

Centro especializado.

Correspondencia: Wolfgang Bengel.  
Röhrenbach 1, 88633 Heiligenberg, Alemania.