

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2008;59(4):343)




Figura 1. Eritema bien delimitado en la zona cubierta por la prótesis (Colección Prof. Dr. F. A. Bahmer, Bremen).



Figura 2. Alteraciones granulomatosas en la encía (Colección del Dr. E. Hornecker, Göttingen).

Estomatitis por prótesis

Criterios de diferenciación

- Normalmente en el margen gingival
 - Zona cubierta por la prótesis
 - Provoca sensación de quemazón
 - Ausencia de otros síntomas
 - No se detectan autoanticuerpos especiales
 - Histología

Diagnósticos diferenciales

Candidiasis: posibilidad de monoinfección también en ausencia de una prótesis.

Quemadura: anamnesis, no limitada a las zonas cubiertas por la prótesis.

Las alteraciones en la zona cubierta por la prótesis son inconfundibles.

Tratamiento

Tratamiento antimicótico, higiene de la prótesis.

Granulomatosis de Wegener

Criterios de diferenciación

- Por encima del margen gingival
 - No relacionado con la cobertura por la prótesis
 - Sin dolor ni sensación de quemazón
 - Vasculitis que provoca síntomas ORL, oculares, renales, pulmonares y otros
 - Presencia de autoanticuerpos en sangre (cANCA/PR3-ANCA)
 - Histología

Diagnósticos diferenciales

Papiloma: no es una enfermedad sistémica, histología, análisis de sangre.

Carcinoma verrugoso: circunscrito, no superficial.

Granuloma de la línea media: sobre todo en el paladar y la nariz, mortal, progresivo.

Linfomas: histología.

Tratamiento

Especialista, centro especializado.