

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2008;59(8):787)

Herpes simple traumático



Figura 1. Lesiones erosivas en encías y mucosa (Colección Dr. Dahmen, Mainz).

Criterios de diferenciación

- Aparición brusca
 - Normalmente después de tratamientos odontológicos (preparación de pilares)
 - Lesiones dolorosas
 - Tendencia a la recidiva
 - Autolimitante
 - El resto de la mucosa no está afectada
 - Sin alteraciones cutáneas

Diagnósticos diferenciales

Herpes zóster: limitación segmentaria.

Quemadura: anamnesis.

Enfermedad mano-pie-boca: afectación de la piel de las manos y de los pies.

Estomatitis por rollo de algodón: anamnesis, ausencia de focos aislados redondeados.

Tratamiento

Desinfección total.

Liquen plano oral



Figura 2. Erosiones en las encías (Colección Dr. Ludwig, Ulm).

Criterios de diferenciación

- Evolución a largo plazo
 - Sin relación con tratamientos odontológicos
 - Dolor moderado
 - Crónico
 - No autolimitante
 - Posibilidad de lesiones blanquecinas características en el resto de la mucosa
 - Posibilidad de alteraciones cutáneas (pápulas en localizaciones típicas como en las caras flexoras de los antebrazos)

Diagnósticos diferenciales

Varicela: alteraciones cutáneas, habitualmente en niños.

Enantema medicamentoso: anamnesis.

Intolerancia a materiales: pruebas de provocación.

Herpes zóster: distribución segmentaria.

Leucoplasia: ausencia de trama reticulada blanquecina, habitualmente más circunscrita.

Tratamiento

Geles tópicos de corticosteroides en las formas erosivas.