

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2008;59(10):1036)

Impétigo contagioso



Figura 1. Lesiones costrosas en la piel.

Herpes simple recidivante



Figura 2. Lesiones en el margen labial (Colección Prof. Dr. Hagedorn, Darmstadt).

Criterios de diferenciación

- Enfermedad pediátrica
- Afectación cutánea (perioral y facial)
- Mucosa no afectada
- La tendencia a la recidiva no es una de las características principales
- Inicio insidioso
- No se identifican virus, provocado por estafilococos y/o estreptococos
- Sumamente contagioso

Diagnósticos diferenciales

Micosis: identificación de hongos.

Varicela: no se limita a la cara.

Sifilides: serología, raras en niños.

Enfermedad de mano-pie-boca: afectación de pies y manos, intraoral.

Tratamiento

Dermatólogo, tratamientos tópicos, apósitos desinfectantes, penicilina si procede.

Criterios de diferenciación

- Afecta habitualmente a adultos
- Semimucosas
- Posibilidad de afectación de las mucosas (sobre todo las queratinizadas)
- Tasa alta de recidivas
- Inicio agudo
- Posibilidad de detección de virus
- Contagioso
- Histología

Diagnósticos diferenciales

Varicela: alteraciones cutáneas, sobre todo en niños.

Candida (boqueras): detección de hongos, inicio más insidioso.

Primo-infección luética: lesiones circunscritas.

Herpes zóster: distribución segmentaria.

Tratamiento

Antivíricos.