

## Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2008;59(11):1139)

### Herpes simple labial



Figura 1. Lesión recubierta de una costra en el labio inferior (Colección Prof. Dr. F. A. Bahmer, Bremen).

### Criterios de diferenciación

- Recidivante.
- Pródromos característicos (vesículas).
- Doloroso.
- Habitualmente limitado a los labios.
- Autolimitante.
- Edema, pero sin infiltrado.

### Diagnósticos diferenciales

*Carcinoma de células escamosas*: poco doloroso, aparición más insidiosa, sin vesículas, infiltrado.

*Afta mayor*: ausencia de estadio vesicular.

*Furiúnculo*: agudo, dolor a la presión, no recidivante.

### Tratamiento

Mantener los labios húmedos para evitar la formación de fisuras. Aciclovir sólo en la fase prodrómica.

### Leucemia linfática



Figura 2. Lesión hemorrágica en labio inferior (Colección Prof. Dr. M. Zehm, Schönried, Suiza).

### Criterios de diferenciación

- No recidiva en los mismos lugares.
- Infiltrados, posteriormente costras, exudados.
- Posibilidad de aparición por todo el cuerpo.
- Las lesiones no se autolimitan.
- Infiltrado.
- Afectación del estado general.

### Diagnósticos diferenciales

*Carcinoma de células escamosas*: anamnesis, evolución lenta.

*Afta mayor*: dolor.

*Eritema exudativo multiforme*: aparición brusca, lesiones en escarapela en la piel, costra descamativa en los labios, hemograma, enfermedad secundaria a herpes.

### Tratamiento

Centro especializado.