

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2010;61(9):1131)

Proptosis bucal/«fibroma» de la mejilla, hiperplasia irritativa

Criterios de diferenciación

- Consistencia relativamente dura.
 - Tumoración sobresaliente semiesférica.
 - Localización frecuente junto a brechas edéntulas.
 - Color rosa pálido.
 - Histología.



Figura 1. Tumor semiesférico asentado sobre la mucosa bucal.

Diagnósticos diferenciales

Fibromas «verdaderos»: histología.

Neurofibroma: independiente de brechas edéntulas como factor desencadenante.

Granuloma piógeno: superficie no lisa, tendencia a la hemorragia.

Otros tumores: histología.

Tratamiento

Escisión y examen histológico.



Figura 2. Tumor asentado sobre la mucosa bucal.

Correspondencia: W. Bengel.
Röhrenbach 1, 88633 Heiligenberg, Alemania.

Fibrolipoma

Criterios de diferenciación

- Consistencia más blanda.
 - Ligeramente «descolgado» por la presencia de células adiposas en su estructura.
 - No es imprescindible la presencia de una brecha edéntula para desencadenar su crecimiento.
 - En algunas partes muestra una tinción ligeramente amarillenta.
 - Histología.

Diagnósticos diferenciales

Fibromas «verdaderos»: histología.

Neurofibroma: independiente de brechas edéntulas como factor desencadenante.

Lipoma: histología.

Otros tumores: histología.

Tratamiento

Escisión y examen histológico.