

# Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2010;61(8):918)

## Líquen plano oral



Figura 1. Alteraciones gingivales de color blanquecino y rojizo (Colección Dr. Grabbert).

## Criterios de diferenciación

- Distribución difusa.
- Lesiones en otras mucosas.
- Existe «desde hace tiempo».
- La anamnesis no aporta datos de interés.
- Posibilidad de alteraciones cutáneas.

## Diagnósticos diferenciales

*Dermatosis vesiculares*: histología, inmunofluorescencia directa.

*Candidiasis*: recubrimientos blanquecinos desprendibles.

*Lesión liquenoide*: anamnesis farmacológica, presencia de dos metales.

## Tratamiento

Corticosteroides tópicos (como fluocinonida al 0,05%) en las lesiones sintomáticas (formas erosivas).

## Lesión tóxica



Figura 2. Epitelio descamado, parcialmente separable (etiología: uso erróneo de Pyralvex).

Correspondencia: W. Bengel.  
Röhrenbach 1, 88633 Heiligenberg, Alemania.

## *Criterios de diferenciación*

- Relativamente circunscrita.
- Restringida en general a un área.
- Aparición aguda.
- La anamnesis lleva al diagnóstico.
- Aparece sólo en mucosas.

*Materia alba:* desprendible, anamnesis.

*Recubrimiento de fibrina:* anamnesis, erosión subyacente.

## *Tratamiento*

Supresión de la noxa, desinfectantes tópicos.

## *Diagnósticos diferenciales*

*Dermatosis vesiculares:* anamnesis, histología.

*Candidiasis:* recubrimientos blanquecinos desprendibles, fondo inflamatorio.