

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2010;61(1):21)

Gingivitis por hidantoína

Criterios de diferenciación

- Relación directa con los dientes (encía).
- Consistencia relativamente dura.
- Dependiente de la presencia de placa.
- Anamnesis farmacológica (hidantoína en este caso).
- Inflamación secundaria.

Diagnósticos diferenciales

Otras hiperplasias gingivales medicamentosas: ciclosporina, nifedipino.

Hiperplasia no medicamentosa: ausencia de anamnesis farmacológica, anamnesis familiar.

Hiperplasia de origen hormonal: embarazo, anticonceptivos orales, pubertad, diabetes.

Gingivitis granulomatosa: tumefacciones faciales recidivantes, paresia facial, síndrome de Melkersson-Rosenthal.

Tratamiento

Consulta con el médico responsable del tratamiento: ¿existe la posibilidad de cambiar o disminuir la dosis del

medicamento? Modelación quirúrgica gingival, control de la placa en citas de revisión frecuentes.

Lipoma

Criterios de diferenciación

- Sin relación directa con los dientes.
- Consistencia relativamente blanda.
- Independiente de la presencia de placa.
- No hay anamnesis medicamentosa.
- Ausencia de inflamación secundaria.



Figura 1. Hiperplasia gingival masiva.

Correspondencia: W. Bengel.
Röhrenbach 1, 88633 Heiligenberg, Alemania.



Figura 2. Hiperplasia importante en el vestíbulo (Colección C. Herbst).

Diagnósticos diferenciales

Absceso: proceso agudo, dolor opresivo, examen radiográfico.

Otros tumores: sólo se distinguen mediante pruebas histológicas.

Exostosis: consistencia dura, habitualmente en localizaciones características.

Tratamiento

Cirugía en un centro especializado.