

## Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2008;59(9):999)

### Hiperplasia irritativa (hiperplasia falsa)



Figura 1. Hiperplasia gingival en la zona del puente (Colección Dr. Ludwig, Ulm).

### Criterios de diferenciación

- Limitada a la zona del puente.
  - No hay antecedentes farmacológicos (inhibidores de los canales de calcio, ciclosporina, anticonvulsionantes).
  - Independiente de la formación de placa.

### Diagnósticos diferenciales

*Fibroma*: histología.

*Otros tumores*: histología.

*Absceso*: agudo, dolor a la presión.

### Tratamiento

Extirpación, se recomienda confeccionar una nueva prótesis en caso de que la existente no presente un ajuste preciso.

### Hiperplasia por nifedipino



Figura 2. Hiperplasia gingival principalmente en el sector anterior (Colección Dr. Herbst, Kraiburg).

### Criterios de diferenciación

- Puede aparecer, en principio, en toda el área dentada, preferentemente en el sector anterior.
  - Anamnesis farmacológica positiva.
  - Dependiente de la formación de placa.

### Diagnósticos diferenciales

*Gingivitis por hidantoína*: anamnesis.

*Hiperplasia por ciclosporina*: anamnesis.

*Hiperplasia idiopática*: la anamnesis farmacológica no aclara la causa, historia familiar.

*Leucemia*: hemograma, erosiones, hemorragias.

### Tratamiento

Control de la placa, cambio del fármaco después de consultar con el médico responsable, cirugía.