



Radiología



0 - CAMBIOS DIFUSOS EN LA SUSTANCIA BLANCA CEREBRAL EN LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. UN ESTUDIO DE ESPECTROSCOPIA Y TENSOR DE DIFUSIÓN CON RESONANCIA MAGNÉTICA

J.M. García Santos¹, A. Inuggi², C. Vázquez Ólmos¹, F. Iniesta¹, J. Gómez Espuch¹ y J.M. Moraleda¹

¹Murcia, España. ²Génova, Italia.

Resumen

Objetivos: Analizar los cambios de la sustancia blanca cerebral relacionados clínica y metabólicamente con la motoneurona, y con la progresión de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Material y método: Estudiamos 35 pacientes con ELA definitiva (12 mujeres; 25-70 años; media $47,8 \pm 11$ años) con espectroscopia-RM univóxel (ERM) 1,5T en las circunvoluciones motoras, e imagen de tensor de difusión (ITD). Obtuvimos la puntuación de afectación de las motoneuronas superior e inferior. Establecimos la progresión clínica con la escala funcional ALS-FRS y la duración de la enfermedad. Calculamos los ratios ERM de los metabolitos N-acetilaspártato-NAA, colinas-Cho, creatina-Cr y mioinositol-mI. En la ITD aplicamos los estadísticos espaciales basados en el tracto (TBSS) y la tractografía de las vías piramidales usando el FSL diffusion Toolbox. Los signos de motoneurona, la progresión clínica, y los ratios metabólicos se correlacionaron con los cambios ITD de la fracción de anisotropía (FA) y la difusividad media (DM). El nivel de significación estadística se estableció para una $p < 0,05$.

Resultados: La progresión clínica y la FA frontal y parietal, callosa y piramidal se correlacionaron negativamente. NAA/Cr y, especialmente, NAA/Cho se correlacionaron positivamente con la FA frontal y callosa. La DM parietal izquierda se correlacionó positivamente con la progresión clínica, y la DM frontal, parietal y piramidal, con los signos de motoneurona superior, especialmente las fibras más cercanas a la corteza motora. NAA/Cho y NAA/mI se correlacionaron negativamente con la DM callosa, frontal y parietal.

Conclusiones: La sustancia blanca frontal, parietal y callosa se altera con la progresión clínica y los signos de motoneurona superior en la ELA.