



# Radiología



## 0 - Actualización de la terminología radiológica en las pancreatitis agudas

D.J. López Ruiz<sup>1</sup>, I.M. Fernández López<sup>2</sup>, L.A. Rivera Alcántara<sup>1</sup>, L. Rudski Ricondo<sup>2</sup> y R. Lerma Ortega<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hospital Valle de los Pedroches, Radiodiagnóstico, Córdoba, España. <sup>2</sup>Hospital Reina Sofía, Radiodiagnóstico, Córdoba, España.

### Resumen

**Objetivo docente:** Revisar los criterios propuestos por la nueva clasificación de Atlanta con el objetivo de estandarizar la terminología radiológica en el contexto de las pancreatitis aguda. Conocer nuevos aspectos de la enfermedad que tienen impacto en el manejo diagnóstico y terapéutico de la enfermedad.

**Revisión del tema:** Recientemente, un grupo de expertos en el manejo de la pancreatitis aguda (PA) ha modificado la antigua clasificación de Atlanta con el propósito, entre otros aspectos, de estandarizar la terminología empleada en esta enfermedad para mejorar la comunicación entre los múltiples profesionales, de distintas especialidades médicas, involucrados en el manejo de estos pacientes. Más concretamente, en esta actualización, se han consensuado los criterios definitorios de PA, se ha clasificado la pancreatitis aguda por criterios morfológicos en pancreatitis intersticial edematosa y pancreatitis necrotizante; se han diferenciado las fases clínicas de la enfermedad relacionadas con el curso y severidad de la misma en fase inicial o temprana (primera semana) y fase tardía de la pancreatitis aguda (después de la primera semana). Introduce cambios en la estratificación de la severidad distinguiendo tres grados: leve, moderadamente severa y severa. También ha incorporado nueva terminología en la descripción morfológica de las colecciones peripancreáticas.

**Conclusiones:** La nueva Clasificación de Atlanta, basada en el consenso de un grupo de trabajo multidisciplinar e internacional, pretende estandarizar la terminología relacionada con los criterios de imagen en el contexto de la pancreatitis aguda con el objetivo de mejorar la comunicación entre profesionales y disminuir la variabilidad en la práctica clínica.