



## ANÁLISIS DE LA ANGIOARQUITECTURA DE LAS FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS DURALES CEREBRALES Y SU IMPLICACIÓN CLÍNICO-TERAPÉUTICA

C. Pérez-Serrano., M. Werner Reyes, J. Moreno Negrete, F. Zarco Contreras, N. Macías y A. López-Rueda.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España.

### Resumen

**Objetivos docentes:** El objetivo del trabajo consiste en describir las características angioarquitectónicas de las fistulas arteriovenosas durales (FAVD) cerebrales, así como su relación con la forma de presentación clínica y el tratamiento de elección a seguir en cada caso.

**Revisión del tema:** La presentación clínica de las FAVD está relacionada con sus características angiográficas, ya que el patrón de drenaje venoso es el factor pronóstico más importante. Las FAVD con drenaje venoso leptomenígeo cortical retrógrado se asocian a mayor riesgo de sangrado. La localización de la lesión no condiciona directamente un factor de riesgo, pero puede predisponer a ciertos tipos de drenaje venoso de riesgo, y tiene implicaciones en la decisión terapéutica. El abordaje terapéutico de las FAVD es variado e incluye la cirugía, radioterapia, tratamiento endovascular, radiocirugía por estereotaxia, o una combinación de las técnicas descritas anteriormente, incluso en algunos casos se opta por el tratamiento conservador. El tratamiento endovascular se puede realizar por abordaje arterial y/o venoso, y en la actualidad es de primera elección en muchos centros. En la terapia con radiación (radioterapia y radiocirugía), la localización de la lesión cobra especial importancia.

**Conclusiones:** En el estudio por métodos de imagen de las FAVDs cerebrales es importante incluir, además de su detección, una descripción de su angioarquitectura que permita determinar riesgos de sangrado, justificación de su presentación clínica y valoración de la decisión terapéutica.