

COMUNICACIONES PÓSTERS

PÓSTER I Calidad percibida por los pacientes

Sala Navarra
Miércoles 9

APLICACIÓN DEL MODELO EFQM EN UN DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA: RESULTADOS EN CLIENTES

M. Vilaseca Fortes, R. Monis Delgado, E. Rubio Laseca, B. Gómez Pozo, E. González López y J. Pérez Aparicio

Palabras clave: Calidad percibida, Autoevaluación, EFQM.

Introducción: Tras un proceso de formación y aprendizaje del Modelo EFQM de Excelencia, el Equipo de gestión del Distrito Ronda-Guadalhorce (DRG), Málaga, ha iniciado el proceso de auto evaluación. Como parte de del mismo se presentan los resultados de la evaluación del Criterio 6.

Objetivos: Evaluar los Resultados en Clientes del Distrito Ronda-Guadalhorce (DRG): puntos fuertes, áreas de mejora y puntuación.

Metodología: Se adaptaron contenido y terminología del Criterio 6 (Resultados en Clientes) del Modelo EFQM para PYMES al ámbito sanitario. Los indicadores de percepción se derivaron de los resultados de los cuestionarios de IEZA y ESUCAP para 1999-01, Grupos focales y entrevistas con clientes; y los de rendimiento, de los Contratos Programa del Distrito. La información se estructuró en formato memoria y fue evaluada por el Equipo de Gestión del DRG en función de los atributos de Resultados y Ámbito de aplicación.

Resultados: Cinco de los siete indicadores de percepción presentaban tendencias positivas y superiores a la media andaluza, y dos, negativas. El Índice de Accesibilidad para el 2001 obtuvo la máxima puntuación.

La satisfacción general de nuestros clientes con los servicios experimentó, durante el período 99-01, tendencia positiva y superior al promedio andaluz. Los nueve indicadores que componen el Índice de Satisfacción del DRG presentaron tendencias positivas o rendimiento sostenido. La satisfacción con la atención domiciliaria de enfermería fue el referente 2001 para el conjunto de distritos andaluces. Las reclamaciones presentaban tendencia alcista en el trienio. La puntuación global del Criterio fue 110.

Conclusiones: En cuanto al subcriterio 6a, los puntos fuertes del DRG se resumen en el Índice de Satisfacción. Las áreas de mejora: adecuación de horarios de dos centros, accesibilidad telefónica, demora en cita previa, tiempo de respuesta y resolución de reclamaciones.

APLICACIÓN DE UN CICLO PDCA EN EL DISEÑO ORGANIZATIVO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS CENTROS DE SALUD

J.M. Mallo Fernández, C. Granda Menéndez y J. Ferrández Santos
Unidad Calidad Área 11.

Palabra clave: Unidad Administrativa, Centro de Salud, Ciclo evaluativo PDCA.

Objeto: Validar el diseño organizativo de atención al usuario en la Unidad Administrativa (UUA) de los centros de salud (CS) mediante un ciclo evaluativo PDCA.

Metodología: (P) Se identificaron los circuitos de atención al usuario externo (oficina usuario) e interno (oficina de centro) del CS. Dimensión de la calidad evaluada: accesibilidad del usuario. Áreas de intervención susceptible de mejora: (1) Predominio de la atención presencial sobre la telefónica, (2) déficit en la priorización de las actividades dirigidas al usuario externo, (3) falta de flexibilidad en la aplicación de procedimientos sin segmentación de tiempos de trabajo, (4) Falta de liderazgo definido en la UUA. (D) Se seleccionaron 9 Unidades funcionales (8 CS) evaluando la idoneidad de la prestación del servicio mediante observación directa externa. Aplicación de cambios sobre: (1) Redefinición normalizada de los procedimientos/tareas en las UUAA para el conjunto del Área; (2) Formación estructurada teórica (gestión de tiempos, calidad del servicio), y práctica (análisis de causas y aplicación del rediseño organizativo en cada UUAA). (C) Medición centrada en la accesibilidad telefónica (sistemático en el Área) mediante encuesta telefónica semestral, y en cada UUAA (mediante despliegue de indicadores propios a partir de sus áreas de mejora específicas). Verificación posterior mediante evaluación externa. (A) Áreas de actuación centradas en la especialización de puestos: Asignación de posiciones independientes y mixtas con flexibilidad según tamaño de UUAA y de la demanda del servicio, priorizando la atención telefónica.

Resultados: En las unidades funcionales donde se obtuvieron mejoras, los resultados se situaron en la optimización de tiempos y asignación de puestos de trabajo, así como en los indicadores de atención telefónica. En los centros sin mejoras sustanciales, subyace una resistencia al cambio sin interiorizar el enfoque del problema.

Conclusiones: Un ciclo evaluativo PDCA permite un marco estructurado y visible de intervención sobre determinadas áreas de mejora, facilitando la actuación sobre las deficiencias potenciales e introduciendo las acciones correctivas pertinentes. Su aplicación en la adecuación de las UUAA, precisa una estrategia directiva adicional, basada en la dinámica de grupos, y en un análisis de la situación interna/externa promoviendo una actitud facilitadora de gestión del cambio.

SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LA ACCESIBILIDAD A LAS CONSULTAS DE MEDICINA FAMILIAR

H. Sánchez Janáriz, E. Sanz Oliveda y R. Henandez Gallego

Palabras clave: Accesibilidad, Atención Primaria.

Objetivos: Conocer la evolución de la accesibilidad del usuario a la consulta del médico de cabecera a través de la cita telefónica y valorar los tiempos de espera para entrar en consulta en la Comunidad Autónoma Canaria.

Metodología: Se realiza un estudio descriptivo transversal por encuesta telefónica, en el último semestre de 2001; comparando los resultados con los datos obtenidos en otra encuesta realizada en 1997, antes de la puesta en marcha de la cita previa centralizada. Se extrae una muestra representativa de la Comunidad Autónoma, se estratifica por Área de Salud atendiendo a la población adscrita. El tamaño de la muestra se calcula para una precisión del 3%, un nivel de confianza del 95% y una $p=q$ del 50%. Se incluyen en el estudio los usuarios que han acudido a consulta de Medicina en los últimos 15 días.

Resultados: Se realizan 1.575 encuestas, al 81,4% de los encuestados les resulta muy fácil o fácil contactar con su centro para pedir cita frente a un 47% en el año 1998. El 79% están satisfechos con la cita que le dan. La espera para entrar en consulta se distribuye de la siguiente manera: hasta 15 minutos un 32,2%, entre 16 y 30 minutos un 28%, entre 31 y 60 minutos un 26% y un 14% espera más de una hora. En el año 1998 se observó un 25% en cada uno de los tramos citados. El 45% opina que sería razonable esperar hasta media hora, si lo reducimos a 15 minutos el porcentaje asciende a 90. El tiempo de espera para entrar en consulta les parece Muy bien o Bien al 43%, mientras que en el 1998 el resultado fue de un 47%.

Conclusiones: Destaca la ostensible mejora en la accesibilidad a la cita telefónica con la centralización de la misma. Ligera disminución en los tiempos de espera para entrar en consulta, que no se ve reflejado en la satisfacción de los usuarios.

¿QUÉ VALORAN LOS PACIENTES A LA HORA DE ELEGIR HOSPITAL?

J.J. Mira Solves, S. Tirado González, V. Pérez Jover, J. Aranaz Andrés, J.A. Buil Aína, J. Rodríguez-Marín, J. Vitaller Burillo y E. Sitges Maciá

Universidad Miguel Fernández. Dpto. Psicología.

Palabra clave: Métodos de información al paciente; Satisfacción del paciente.

Objetivo: Este trabajo forma parte de un estudio cuyo objetivo general es determinar cuál es la mejor forma de informar a un paciente para que su elección de centro y servicio sea responsable e identificar los principales factores que actuarían como motivadores de esta decisión en un paciente potencial. El objetivo específico es evaluar si la elección del hospital está determinada por la valoración de dos aspectos: el resultado médico de las intervenciones y la satisfacción de los pacientes, para patologías etiquetadas como "graves" y "leves".

Metodología: Se asignaron 983 sujetos a cuatro situaciones de presentación de la información referida a tres hospitales ficticios construidos para el estudio. Dentro de cada condición, a las mujeres se les administró información sobre cáncer de mama y cataratas y a los hombres sobre hipertrofia benigna de próstata y cataratas. En todas las condiciones se incluyó información sobre: personal del servicio, resultados de las intervenciones, efectos secundarios, satisfacción de los pacientes y reclamaciones efectuadas. Tras esto, los sujetos cumplimentaron un cuestionario sobre su valoración de la información recibida y la elección de hospital.

Resultados: Para analizar la relación existente entre las variables, dado su carácter cualitativo, se aplicó un modelo loglineal. Los estadísticos de bondad de ajuste indican que el modelo es adecuado ($\chi^2 = 0,00, p = 1$; razón de verosimilitud $\chi^2 = 0,00, p = 1$). En ambos casos (mama/próstata - cataratas), la prueba de asociaciones parciales arrojó valores significativos para las interacciones de primer orden pero no para la interacción de segundo orden. Concretamente, hay un efecto significativo de la bondad percibida del resultado médico en cada hospital y la elección subsiguiente del mismo en ambos casos. Por otro lado, también se observa un efecto significativo del nivel de satisfacción de los pacientes y la elección de hospital en el caso de la patología "cataratas".

Conclusiones: Los resultados indican que cuando se trata de una patología "grave" (mama/próstata) los sujetos valoran fundamentalmente a la hora de elegir hospital los resultados médicos; sin embargo, en el caso de patologías "leves" (cataratas), tienen en cuenta tanto los resultados médicos como la satisfacción de otros pacientes.

P-004

CICLO DE MEJORA SOBRE LA DEFICIENTE ADHESIÓN AL TRATAMIENTO DIETÉTICO EN EL PACIENTE DIABÉTICO

J.M. Lucas Boronat, C. Vilaplana Bernabeu, J. Güell Ayuda, L. Costart Tafalla, D. Mora Palomares y C. Gasch Salvador

Centro de Salud Mora de Rubielos.

Palabra clave: Educación para la Salud. Comunicación. Encuesta. Dieta. Nuestro ciclo de mejora se desarrolla en la Zona Básica de Salud de Mora de Rubielos (Teruel).

La Educación para la Salud (E.P.S.) es esencial en el abordaje terapéutico del diabético. No podemos introducir la dieta, el ejercicio y la medicación sin informar al paciente sobre su importancia y sin motivarlo para que adquiera protagonismo en el control de su enfermedad, debiendo resaltar el papel primordial desarrollado desde la Atención Primaria. La E.P.S. pretende que las personas estén preparadas para pensar por sí mismas, tomar sus propias decisiones y fijarse metas realistas. El objetivo es que las personas "estén y vivan" lo mejor posible. Nuestro *objetivo específico* es conseguir que al menos el 80% de nuestros diabéticos reciban E.P.S.

Metodología: El elemento clave utilizado ha sido la comunicación tanto individual (por medio del dialogo, en una entrevista motivada y bidireccional), como colectiva en grupos reducidos (charlas, coloquios, discusiones, talleres...). Nos apoyamos en medios audiovisuales, televisión, vídeo, diapositivas, transparencias, folletos, dietas, menús.....

Actividades: Como punto de partida en la intervención se implanta una primera encuesta a los pacientes diabéticos, que nos orientará sobre los conocimientos en los aspectos dietéticos fundamentales de su enfermedad, esperando que sea el reflejo de sus conocimientos y conductas. Una vez impartida la E.P.S. se reimplanta la encuesta para evaluar lo conseguido.

Resultados alcanzados: Mediante los indicadores desplegados obtenemos: Un grado de cobertura del 100% tanto en las actividades de E.P.S. como en ambas encuestas. Un grado de conocimientos que asciende desde el 67,27% de la primera encuesta al 81,52% de la segunda.

Conclusiones: a) El nivel de participación ha sido mayoritario (100%) superando con creces el objetivo fijado. b) Aumento significativo en todas las áreas de aprendizaje, fundamentalmente las relativas a:

Las repercusiones de la dieta en el tratamiento.

Diferenciar los principios inmediatos contenidos en los alimentos.

Valorar la importancia de los suplementos y los horarios.

Identificar los alimentos que contienen Hidratos de Carbono.

Tener información sobre edulcorantes artificiales y alimentos de régimen.

La importancia de una alimentación equilibrada, proporcionada, rica y variada.

LA VOZ DEL CLIENTE COMO EJE CENTRAL DE LA GESTIÓN DE RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES

C. Alonso Marchante, Y. Lanza Salcines, S. Martínez Fernández, R. Mur Cascarra, V. Martínez Mayor y R. Nadal Queralt Residencia de Mayores de Alagón.

Palabra clave: Calidad percibida; Encuesta a usuarios; Residencias de personas mayores.

Objetivos: Realizar en las Residencias de mayores de Alagón y Barbastro (Residencias públicas gestionadas por la Fundación Ramón Rey Ardid) una encuesta de Calidad Percibida, con el fin de conocer la opinión de los usuarios respecto a diferentes aspectos del servicio prestado, en relación con el objetivo de mejorar la atención prestada en las residencias y satisfacer las necesidades de los residentes y sus familias.

Metodología: Dentro del objetivo estratégico de la Fundación Ramón Rey Ardid de conseguir que la voz del usuario sea el eje de la gestión de sus recursos, se realizan sistemáticamente en todos los centros gestionados por ésta, unas encuestas a los usuarios y a los familiares; tras su análisis se detectan problemas y se ponen en marcha acciones de mejora.

Resultados: Se presentan los resultados más relevantes de la encuesta de calidad percibida de usuarios de las residencias de personas mayores, distribuidos en las diferentes áreas que componen la encuesta.

Se apartan también los resultados de las áreas de mejora detectadas y las acciones llevadas a cabo para conseguir dicha mejora.

Conclusiones: 1) El usuario y su familia son el eje central de la gestión de la organización. 2) La integración de la voz del cliente como eje central de la organización, permite la mejora continua de los procesos de atención. 3) La recogida sistemática de la voz del cliente a través de las encuestas de percepción de calidad del servicio, crea en los centros y entre los profesionales, una cultura de enfoque hacia el cliente.

P-006

LAS ACTITUDES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS ANTE EL CUIDADO DE LOS PACIENTES EN ESTADO VEGETATIVO

P. Hernando Robles, A. Mariné y P. Solé
Corporació Sanitària Parc Taulí.

P-007

Palabras clave: Ética, Estado vegetativo persistente, Actitudes de los profesionales.

Introducción: El estado vegetativo (EV) es una de las situaciones éticamente más conflictivas. Existe poca tradición en nuestro país sobre este tema siendo un tema esencial el de las actitudes de los profesionales sanitarios entorno al cuidado de estos pacientes.

Objetivos: Describir las creencias (opinión sobre la conciencia del entorno, dolor, etc...) de los profesionales asistenciales de la Corporación Sanitaria Parc Taulí (CPT) en torno al cuidado de los pacientes (opinión sobre la conciencia del entorno, dolor, etc...) en EV.

Métodos: Aplicación de un cuestionario de actitudes a los profesionales que habitualmente cuidan a los enfermos en EV de la CPT. Los contenidos del cuestionario se realizaron en base a los dilemas que aparecen mencionados en la literatura y es una adaptación del de Payne et al. Contenía 26 preguntas, las cuales se pueden englobar en tres aspectos:

"confianza y seguridad en el tratamiento"

"calidad de vida"

"sobre provisión de tratamientos"

Fue enviado en un sobre de correo interno a todos los profesionales asistenciales que, en un momento u otro, podían cuidar a este tipo de pacientes (N = 500). Hubo un único recordatorio a los 15 días del primer envío. Se ha realizado un análisis estadístico de los datos (test de Chi cuadrado) para determinar si existen diferencias entre los tres colectivos profesionales más numerosos (auxiliares de enfermería, enfermeras y médicos)

Resultados: La tasa de respuesta al cuestionario fue del 50%. Un 66% de las personas que han respondido han tratado o cuidado enfermos en EV más de 4 veces al año (36%) o entre una y tres veces al año (31%). Aparecen diferencias estadísticamente significativas en gran parte de los ítems. Éstas diferencias tienen que ver, básicamente, con la desigual respuesta entre el colectivo de médicos y enfermería. Sin embargo, en aquellas preguntas que cuestionan la provisión o retirada de tratamientos, a excepción de una pregunta, hay un importante consenso en los diferentes colectivos.

Palabra clave: Calidad Percibida, Expectativas, Hospitalización Psiquiátrica.

Objeto: Entre los principios básicos de la gestión de la calidad se incluye el enfoque dirigido al cliente considerando en todo momento sus necesidades y expectativas. De la misma manera consideramos interesante el conocer las expectativas que los profesionales presentan en relación con el servicio que prestan El Complejo Asistencial Benito Menni de Ciempozuelos (Madrid), tras la puesta en marcha en junio de 2001, de una Unidad de Hospitalización Breve para pacientes psiquiátricos, plantea la necesidad de conocer el grado de acuerdo entre las expectativas de los pacientes y de los profesionales en relación al servicio prestado, como medida dirigida a la mejora continua.

Metodología: Hemos tratado de comparar la satisfacción percibida por los pacientes psiquiátricos, ingresados en una Unidad de Hospitalización Breve y las expectativas de sus profesionales respecto a los siguientes aspectos de la prestación del servicio: infraestructura, trato personal, hostelería, ocupación del tiempo de ocio, valoración de la utilidad del tratamiento, conformidad con las actividades terapéuticas desarrolladas. Para ello hemos utilizado una encuesta de satisfacción general que ha sido contestada tanto por los pacientes como por los profesionales. El análisis de los datos lo hemos realizado a través de la comparación de medias, utilizando la prueba t de Student, de la satisfacción general y de los aspectos individuales que componen la satisfacción.

Resultados: Aunque en términos generales se observa tanto en los pacientes como profesionales, una alta satisfacción sobre los diferentes aspectos valorados, la satisfacción mostrada por los pacientes es mayor a la mostrada por los profesionales. El análisis comparativo de los datos indica que los profesionales tienden a estar menos satisfechos en los siguientes aspectos: servicio de limpieza, cafetería, hostelería, privacidad, seguridad, actividades al aire libre y trato recibido por el psiquiatra.

Conclusiones: Podemos concluir que la satisfacción percibida por ambos grupos respecto al servicio prestado es alta. Las diferencias encontradas pueden estar determinadas por las características de los diferentes grupos (pacientes/profesionales). Creemos que estas diferencias en relación a algunos aspectos del servicio, son susceptibles de análisis para establecer que aspectos de la calidad percibida son susceptibles de mejora.

EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN PERCIBIDA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 1999-2001

F. Pérez Riquelme, J.R. Ordoñana Martín, P. Luna Meseguer y M.J. Valcarcel Saavedra

Dirección General de Salud Pública.

Palabra clave: Palabras clave: satisfacción, prevención, mamografía.

Objetivos: Analizar la evolución del grado de satisfacción de las usuarias del Programa de Prevención del Cáncer de Mama de la Región de Murcia. Valorar la utilidad de esta estrategia en esta población, así como detectar oportunidades de mejora, tanto a escala global como en las distintas unidades de mamografía integrantes del Programa.

Metodología: La muestra está compuesta por un total de 1250 mujeres (Edad: M: 58,28; SD: 4,67) usuarias recientes de los servicios del Programa, distribuidas proporcionalmente entre los años 1999 (N = 420), 2000 (N = 420) y 2001 (N = 410). A partir de los listados de usuarias se llevó a cabo anualmente un muestreo polietápico estratificado por fecha de asistencia y unidad de mamografía con afijación proporcional. Se administró, a través de entrevista telefónica, un cuestionario validado previamente con muestra similares. Las puntuaciones se ordenan en una escala tipo Likert de 5 puntos, a excepción de la satisfacción global que se evalúa de 1 a 10 puntos. Los datos han sido valorados de acuerdo a un criterio riguroso basado en el porcentaje de la puntuación máxima alcanzable (PMA): cuando la puntuación media no supera el 90% del máximo posible (4,5 sobre 5) se considera que es un área con oportunidad de mejora; si este porcentaje es menor del 75% (3,75 sobre 5) se considera que necesita mejorar.

Resultados: Los resultados muestran que la satisfacción global con el Programa se ha mantenido elevada (M > 9,0) durante los tres años. En 1999 todas las áreas quedaban por debajo del 85% de la PMA, y dos de ellas por debajo del 75% (Comodidad al colocar los pechos en el aparato M = 3,64; Nerviosismo al realizarse la prueba M = 3,59). En 2001, todos los ítems han incrementado la puntuación, ningún área queda por debajo del criterio de actuación, y solo 4 quedan por debajo del 90% de la PMA (Molestia al realizarse la prueba M = 4,11; Modernidad de los aparatos M = 3,87; Comodidad al colocar los pechos M = 3,92; Nerviosismo M = 4,12).

Conclusiones: La satisfacción global de las usuarias del Programa en la Región de Murcia es muy alta. La satisfacción percibida en las distintas áreas se ha incrementado en estos tres años. A pesar de ello se considera necesario utilizar otras estrategias complementarias de detección de problemas.

CALIDAD PERCIBIDA POR ENFERMOS INGRESADOS HOSPITAL "LA PAZ"

O. Monteagudo Piquerás, P. Alonso Vigil, E. López Jiménez, A. Fernández Llanes, L. Rodríguez Suárez y J. García Caballero

Palabra clave: SERVQHOS, calidad percibida, información.

Objetivo: Cumplimiento del objetivo propuesto por el INSALUD de divulgar e implantar la encuesta SERVQHOS en los hospitales. Evaluar no sólo la calidad global percibida, si no también por servicios concretos.

Metodología: *Tipo de estudio:* Estudio transversal (periodo concreto de tiempo) que utiliza encuesta anónima. *Periodo de estudio:* Se utilizó la segunda quincena del mes de Octubre del 2001. *Población y muestra:* A partir del número total de altas ocurridas durante la segunda quincena de Octubre del año anterior (obtenido del HP-HIS), estimamos las altas del 2001. Dentro del número total de altas quedaron exceptuados éxitus, cuidados intensivos, reanimación, pediatría, así como personas con incapacidad física o psíquica que impiden la respuesta. Se obtuvo un tamaño muestral con los siguientes parámetros: alfa = 0,05, beta = 0,2, precisión = 0,1; prevalencia esperada = 0,8. Tasa de no respuesta, 25%.

Procedimiento: 1) Se realizó un pilotaje por servicios durante la primera quincena de octubre, para detectar posibles dificultades. 2) El día 15 de octubre se entregó un total de 580 encuestas de satisfacción a las Unidades de Enfermería de 24 servicios del hospital. El personal de enfermería se encargó de entregar la encuesta, sólo el día de alta, a aquellos enfermos ingresados entre el 15/10/01 y el 30/10/01. Análisis estadístico: análisis no paramétrico (U Mann-Whitney, Test exacto de Fisher) y regresión logística.

Resultados: Cobertura del 80,68%. Los pacientes más satisfechos son aquellos que recomendarían el Hospital "La Paz" sin dudarlo. Corresponde al 91,64% de los enfermos. Los pacientes más satisfechos son aquellos que han recibido más información. Corresponde al 85,05% de los enfermos.

Conclusiones: Los enfermos más satisfechos son los que han recibido información y aquellos que recomendarían el hospital. Para mejorar la información se han desarrollado trípticos y folletos de información, generales del hospital y específicos de cada servicio, que son entregados en la acogida del enfermo. También se ha mejorado la información de los consentimientos informados.

MODELO DE ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO

M. Santillán Vila, M. del Amo Conill, R.J. Perea Palazón, A. Prat Marín, C. Bru Saumell y Asenjo Sebastián
Hospital Clínico.

Palabras clave: Opinión del usuario, Calidad percibida.

Objetivo: Evaluar la opinión de los pacientes atendidos en el servicio de Radiodiagnóstico de la sede Maternidad del hospital Clínico de Barcelona.

Metodología: Se analizó el funcionamiento y organización del servicio, estableciendo el circuito que sigue un paciente ambulatorio, desde que se le indica la prueba radiológica hasta que se le entrega el resultado de la misma. Se estableció un grupo de mejora de la calidad que diseñó una encuesta de opinión para los pacientes ambulatorios. Para conocer si la encuesta era comprensible para los pacientes y su grado de participación se realizó una validación previa. También sirvió para comprobar si la base de datos, preparada en Access, era adecuada para procesar los resultados de las encuestas. El trabajo de campo definitivo se realizó, mediante un corte transversal de prevalencia, durante 5 días diferentes de la semana.

Resultados: Contestaron la encuesta 56 de los 67 pacientes ambulatorios programados durante los días de realización de la encuesta (84% de participación).

El 71% eran mujeres, con una media de edad de 45,8 años. La mayoría de las once preguntas obtuvieron valoraciones positivas. Respuestas que mayoritariamente (mas del 80%) se situaban en el bien, en el excelente o en el si. Aunque también se evidenciaron posibilidades de mejorar ítems como, la explicación sobre cómo llegar al servicio de radiología; la entrega de la hoja de preparación de la prueba radiológica y la información recibida sobre la prueba por parte de médico solicitante.

Conclusiones: La realización de encuestas de opinión de los pacientes atendidos en áreas asistenciales específicas contribuye a mejorar la evaluación de la calidad percibida por los usuarios de un hospital; permite desarrollar la evaluación de la calidad implantada en esa área; favorece que los profesionales implicados se sientan valorados adecuadamente y ayuda a implantar mejoras tanto organizativas como de motivación personal (actitud).

SATISFACCIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS EN SERVICIO DE URGENCIAS DEL H.C.U. DE VALLADOLID. RESULTADOS PRELIMINARES, AÑO 2002

R. Fadrique Toledo, V. Fernández Espinilla, J. García Crespo, J. Barbado Ajo, J.M. Gil González y J. Castrodeza Sanz
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Palabra clave: Satisfacción, Pacientes, Urgencias.

Objetos: Conocer la opinión y la satisfacción sobre la prestación sanitaria recibida por los pacientes durante los dos primeros meses del año 2002 en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Valladolid.

Metodología: El estudio se ha desarrollado mediante encuesta telefónica. El paciente contestaba telefónicamente a un cuestionario normalizado de 30 preguntas cerradas en el que se recogían aspectos sobre: su satisfacción sobre la atención recibida y sobre el tiempo que permaneció en el Servicio de Urgencias. También su opinión sobre la información sobre su proceso, sobre la capacidad profesional del equipo que le atendió y si volvería nuevamente a solicitar nuestra atención o, si por el contrario, la solicitaría en un servicio de urgencias privado. La selección de los pacientes fue por muestreo aleatorio estratificado, de las historias clínicas de los pacientes mayores de 14 años atendidos cada día, con la finalidad de obtener representación de todos los días de la semana y de sus diferentes franjas horarias.

Resultados. Hemos estudiado 144 personas de un total de 14.264 pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias para el período enero y febrero del 2002. La edad media ha sido de $51,4 \pm 21,4$ años. El 47,2% eran hombres y el 52,8% mujeres. El 53,4% de los pacientes estudiados consideraban que tenían un proceso grave o muy grave. El 86,8% contestaron que consideran importante que se les informe u oriente cuando llegan al Servicio de Urgencias. El tiempo de espera y el transcurrido hasta la atención fue excesivo en opinión de un 11,8% y un 7,6% respectivamente. El 97,2% reconocieron haber recibido una información suficiente sobre su proceso por el médico de guardia y un 92,4% valoraron la capacidad profesional del médico como buena. El 96,5% valoró como buena en su conjunto la asistencia recibida. El 15,3% de los encuestados acudirán a un servicio de urgencias de un hospital privado si tuvieran esa posibilidad.

Conclusiones: La satisfacción de los encuestados sobre la atención recibida alcanza valores elevados. El estudio en función del sexo y edad no muestra importantes diferencias y sólo hemos encontrado que el nivel de estudios se relaciona con diferentes niveles de satisfacción. Se observan algunos puntos débiles, como es la poca información u orientación que recibe el paciente a la llegada al servicio de urgencias y que en su opinión le resultaría de interés.

P-012**¿QUE DETERMINA LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON EL TRATAMIENTO DEL DOLOR?**

F. López Soriano
Hospital Comarcal del Noroeste.

Palabra clave: Satisfacción del paciente. Tratamiento del dolor.

Objetivo: Confirmar la paradoja de que los pacientes dicen estar satisfechos con el tratamiento de su dolor a pesar de no conseguir alivio o conseguirlo solo parcialmente. Explorar que factores pudieran asociarse con la satisfacción del paciente en el tratamiento del dolor.

Metodología: Se estudian 197 pacientes ingresados en nuestro hospital a los que se les preguntó sobre la presencia de dolor en las últimas 24 horas, la intensidad del mismo (EVA), las expectativas sobre el mismo, la respuesta del hospital a su dolor, si pidió alivio y si recibió respuesta, la satisfacción con la respuesta y la satisfacción con el alivio recibido. Se aplicaron pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas, aceptando como significativos valores de $p < 0,05$.

Resultados: Ni la satisfacción con la respuesta ni la satisfacción con el alivio se relacionaron con los niveles de intensidad del dolor, ni con el alivio obtenido. Tampoco la satisfacción se relacionó con las expectativas del paciente, aunque un alto porcentaje de los pacientes no pidió alivio para su dolor a pesar de soporar niveles altos de intensidad. La edad y el sexo no se relacionaron con la satisfacción de los pacientes. La única variable cuya relación con la satisfacción demostró ser estadísticamente significativa ($p = 0,028$) fue en aquellos pacientes que dijeron no haber tenido dolor en las 24 horas anteriores al sondeo.

Conclusiones: Confirmamos la paradoja de que la satisfacción del paciente con el tratamiento de su dolor no se asocia a la intensidad del mismo, ni al alivio obtenido. Igualmente, no se asocia a las expectativas que tiene el paciente sobre su manejo. Los estudios similares publicados confirman, en parte, nuestros hallazgos, y solo parece que existe asociación entre la satisfacción del paciente y la rapidez de respuesta a su demanda, así como con la capacidad de autonomía del paciente para aliviar su dolor (analgésica controlada por el paciente).

P-014**CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE ERITROPOYETINA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS**

A. González Iniesta, F.J. Gracia San Román, L. Rodríguez Suárez, N. Fernández de Larrea, E. Sánchez Santos y J. García caballero
Hospital Materno-Infantil, Servicio Medicina Preventiva.

Palabra clave: Calidad de vida, Satisfacción, EPO (Eritropoyetina), Oncológico.

Objetivos: Medida y mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos con la administración de EPO en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario "La Paz". Mejora del grado de satisfacción de dichos pacientes con la terapia y el Servicio implicado.

Metodología: Para medir la calidad de vida de los pacientes se utiliza el cuestionario de salud SF-36; este cuestionario es anónimo y explora diferentes dimensiones:

- funcionamiento físico; limitaciones para realizar actividades cotidianas por causa física
- dolor corporal
- funcionamiento social
- salud mental
- limitaciones debidas a problemas emocionales
- vitalidad, energía o fatiga
- percepción global de la propia salud

Este cuestionario se encuentra disponible en formato electrónico, lo cual facilita la recogida de datos obteniéndose finalmente los resultados de las diferentes dimensiones exploradas. Para medir la satisfacción de los pacientes se diseñó una encuesta para valorar fundamentalmente la satisfacción en relación con la atención, la información recibida y el grado de mejoría percibido; se termina con una pregunta que evalúa en la misma frase percepciones y expectativas "¿en qué grado se ajustó la atención que recibió a la que esperaba?"; de esta forma se puede recoger el índice de satisfacción. Además la encuesta incluye un último apartado que consiste en una pregunta abierta sobre lo que más y lo que menos le ha gustado al paciente para detectar los puntos fuertes y débiles.

Resultados: A pesar de que en el momento actual el tamaño muestral es pequeño (20 pacientes), los primeros análisis nos dicen que la calidad de vida de los pacientes oncológicos sometidos a tratamiento con EPO, medida según el cuestionario de salud SF-36 aumenta de manera considerable. Los pacientes del Servicio Oncología Radioterápica del Hospital "La Paz" están muy satisfechos con la información recibida y el trato de los profesionales, ajustándose lo que esperaban con lo recibido. Las preguntas abiertas, última parte de la encuesta de satisfacción ya han detectado una posible falta de analgesia en algunos de estos pacientes oncológicos.

Conclusiones: La medición de la calidad de vida y de la satisfacción de los pacientes supone que los Servicios dan cada vez mayor valor a la calidad percibida por los pacientes; en este sentido, instrumentos como el SF-36 y encuestas de satisfacción son realmente útiles para mejorar la atención centrada en el paciente.

P-013**SEGUIMIENTO OSTOMIZADOS AL ALTA HOSPITALARIA**

P. Suárez
Hospital de Jove.

P-015

Palabra clave: Ostomizado, seguimiento, complicaciones, calidad de vida.

Introducción: En el Hospital de Jove se creó en el año 1999, una consulta de enfermería de apoyo a los pacientes ostomizados tras el alta hospitalaria, y en el año 2001 se inicia un protocolo de estudio cuyo objetivo es evaluar este seguimiento y comprobar su eficacia en la prevención de las complicaciones del postoperatorio tardío, así como valorar en qué medida facilita la reinserción social del paciente en su vida cotidiana.

Metodología: Se trata de un estudio prospectivo sobre pacientes con ostomía temporal o permanente independientemente de su patología de base, en los que se evalúa periódicamente:

- 1) Complicaciones del postoperatorio tardío.
- 2) Problemas dermatológicos de la piel periostomal.
- 3) Perfil sociodemográfico. Se completa el estudio con una encuesta de satisfacción del paciente.

Resultados: A través del análisis de los resultados obtenidos, se comprobó que el seguimiento favorecía la detección de problemas a nivel del estoma y piel periostomal de forma precoz lo que agilizaba su resolución disminuyendo el número de ingresos. Al mismo tiempo los pacientes recibían una información gradual que les daba seguridad en si mismos y disminuía su dependencia hospitalaria.

Conclusión: Esta consulta de seguimiento ha servido para mejorar la calidad de vida de los pacientes ostomizados en el Servicio de Cirugía General del Hospital de Jove.

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE E INFORMACIÓN RECIBIDA EN LA CITA TELEFÓNICA EN RADIODIAGNÓSTICO

M. Ribera Coves, A. Jiménez Marco, M. García Martínez, M.A. Iborra Segura, C. Torregrosa Llopis e I. González Álvarez
H.U. San Juan SCIO. de Radiología.

P-016

Palabra clave: Satisfacción, paciente, cita telefónica, radiodiagnóstico.

Objetivo: Conocer la opinión de los pacientes respecto a la información recibida en la citación telefónica en la realización de pruebas complementarias en el servicio.

Material y métodos: Se confeccionó un cuestionario sencillo que recogía diferentes aspectos de la cita telefónica y se invitó a los pacientes a que contestasen a la misma una vez hubo concluido la exploración. Se pasó la encuesta a un total de 108 pacientes. Las preguntas se referían a la identificación del profesional que llamaba, la preparación posible para la prueba, la realización previa de pruebas, la grabación de la cita en contestador automático, la indicación de avisar en caso de no poder acudir, la cantidad de información referida y la comprensión de la misma.

Las tres últimas cuestiones se contestaban mediante una escala tipo Likert y las anteriores de forma dicotómica, dejando una última pregunta abierta para sugerencias.

Resultados: Se había hablado directamente al paciente o familiar en el 84% de los casos, dejando el aviso en el contestador automático en el resto y habían realizado alguna prueba en el servicio en el 56% de los casos. Se identificó el profesional en el 82,4% de los casos y la cantidad de información fue valorada como suficiente o muy suficiente en el 91,6%.

La comprensión de la información se valora como buena y muy buena en el 94,5% de los casos y el trato recibido se valoró como bueno o muy bueno en el 95,8% de los casos.

Conclusiones: La satisfacción con la información recibida durante la cita telefónica y la comprensión de la misma es bien valorada por los pacientes, aunque existe algunas situaciones en que esto no sucede y sería interesante el conocer sus causas. El trato recibido es considerado como satisfactorio. Es conveniente el disponer datos de estas situaciones para controlar este aspecto del servicio prestado y proponer medidas de formación para el aseguramiento de la calidad de los servicios en la línea de mejora continua de la calidad.

INFLUENCIA DEL NÚMERO DE VISITAS EN EL BIENESTAR DEL PACIENTE Y EN LA APLICACIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

B. Moncín García y M.M. Gascón Pastor

P-017

Palabra clave: Visitas hospitalarias, bienestar del paciente.

Introducción: El HUSJR y sus profesionales se comprometen a tratar a todos los pacientes, familiares y acompañantes con respeto cuidando su intimidad y dignidad humana. Para realizar este estudio hacemos una revisión del código ético de enfermería y de las competencias de enfermería.

Objetivo: Valorar en qué grado el horario y nº de visitas que reciben los usuarios repercute en la aplicación de cuidados enfermeros y bienestar del paciente.

Metodología: Elaboración de planillas para la recogida del nº de visitas en tres horarios. Validación; información, formación de los profesionales que realizan la recogida de datos.

Elaboración de 3 cuestionarios dirigidos a profesionales, usuarios y acompañantes que exploran la repercusión de las visitas en los pacientes, con opción igual de respuesta de 4 ítems según escala de Likert Tabulación y análisis estadístico de los datos según programa informático SPSS.

Estudio realizado en una semana en el servicio de cirugía.

Resultados: Se recogieron 70 planillas; 32 pacientes IQ con media de visita de 1,77; 32 pacientes no IQ con media de 1,18. Encontramos 44 diagnósticos diferentes.

Total de 38 cuestionarios por grupo. Al 50% de enfermeras el nº de visitas les dificulta la aplicación de cuidados. Un 34,5% de usuarios refiere que el personal no trabaja adecuadamente cuando hay visitas, el 35,5% opina que las visitas le han molestado más de una vez. El 31,3% de acompañantes opina que no les molesta. Los encuestados están de acuerdo en que no existe control de visitas, el 53,3% de pacientes estarían de acuerdo en una restricción del horario de visitas. El 63,6% de acompañantes manifiesta no tener dificultad en acceder a la habitación.

Conclusiones: Aunque del estudio se desprende que las visitas pueden ocasionar ciertas molestias en los pacientes e interferir en cierto grado la realización de intervenciones de enfermería, no debemos olvidar la sensibilización de la población e informar de las repercusiones que pueden ocasionar una afluencia masiva de visitas. Las visitas son importantes durante el ingreso hospitalario pero han de regularse.

Es aconsejable respetar los horarios y no permanecer más de 2 personas/usuario, las visitas numerosas fatigan al enfermo.

EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE PACIENTES EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

A. González Torga, A.M. Haro Pérez, L. Rosado Breton, J.L. Zaragoza Fernández, A. Hernández de Antonio y J.F. Navarro Gracia

P-018

Palabra clave: Satisfacción, encuestas, pacientes, SERVQUOS, calidad.

Objetivos: Conocer la evolución de la satisfacción de los pacientes atendidos en un hospital y proponer actuaciones de mejora.

Metodología: Para conocer la satisfacción de los pacientes se ha utilizado el cuestionario SERVQUOS, mediante envío por correo de la encuesta, que incluye sobre pre-franqueado para su devolución, a pacientes dados de alta durante un período de 2 semanas. El estudio se realiza con una periodicidad semestral; la primera evaluación se realizó el segundo semestre del año 2000 y hasta el momento se dispone de 4 evaluaciones. Posteriormente a cada una de ellas, se envía un informe a dirección con los resultados obtenidos.

El análisis de datos se ha realizado con el programa SPSS, mediante análisis de frecuencias de los diferentes ítems de la encuesta.

Resultados: Se dispone de un total de 848 encuestas, que suponen una tasa de respuesta del 29,13%.

Desde el año 2000 hasta el momento actual se observa un ligero aumento de las personas que "recomendarían el hospital sin dudarlo" (85%-88,2%), y de las personas que están "satisfechas" o "muy satisfechas" con la asistencia recibida (90%-92,5%). No se observan variaciones importantes en aspectos relacionados con el trato y la información proporcionada por el personal (más del 55% consideran que es "mejor o mucho mejor de lo que esperaban"). Tampoco se aprecian diferencias significativas en la opinión de los pacientes sobre características estructurales del hospital (aproximadamente el 50% consideran que es "como lo esperaban"). El aspecto peor valorado se refiere al tiempo de espera, observándose un pequeño descenso de las personas que consideran este ítem "mejor o mucho mejor de lo que esperaban" (42,8-40,5%).

Conclusiones: Se observa una elevada tasa de respuesta, comparada con otros estudios, lo que podría estar relacionado con el elevado porcentaje de buena satisfacción global. Los informes que se proporcionan periódicamente a la dirección del hospital ayudan a orientar los programas de mejora de calidad del centro.

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES EN UN SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO

M. Ribera Coves, M.J. Barceló Rodríguez, A. Jiménez Marco, M. Novella Ruiz, J. Puche Martínez e I. González Álvarez
H.U. San Juan Scio de Radiología.

P-019

Palabra clave: Reclamaciones, paciente, radiodiagnóstico.

Resumen: Describir la evolución en los últimos nueve años de las reclamaciones recibidas en el servicio de radiología, analizándose desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa.

Material y métodos: Se han revisado las reclamaciones recibidas en relación con el servicio de radiodiagnóstico desde el año 1993 hasta el 2001, realizándose una lectura detallada de las mismas con el fin de asignarle el tipo de la misma.

Resultados: El número total de las reclamaciones en los años 1993 y 1994 fue de 52 y 28 respectivamente siendo en los siguientes años bastante menor con valores de 8, 4, 2, 3, 3, 4 y 5 sucesivamente.

En los dos primeros años más del 50% correspondían a problemas de la lista de espera, siendo fallo organizativo el resto. En los siguientes años se aprecia la práctica desaparición de esta causa quedando fallos organizativos y de comunicación con el paciente.

Se han contestado todas las reclamaciones por escrito, además de realizar una llamada telefónica a los pacientes con el fin de conocer de primera mano las posibles causas y desarrollar las propuestas de mejora.

Conclusiones: La gestión adecuada de la lista de espera, aumentando la accesibilidad de los pacientes con horarios de tarde es la que provoca el descenso de las quejas en los últimos años y de la misma forma el rediseño de circuitos organizativos ha dado lugar a la práctica desaparición de este tipo de reclamaciones. Las quejas en los últimos años han sido por problemas de comunicación y relación con los profesionales realizándose en cada caso el contacto directo con el paciente para conocer la situación, circunstancia que ha sido muy bien valorada en todos los casos.

Palabra clave: Calidad percibida. Encuesta de satisfacción. Mejora continua de la calidad.

Introducción: La calidad percibida constituye uno de los puentes básicos de la mejora continua de la calidad, puesto que en definitiva la asistencia sanitaria gira en torno al paciente.

Objetivo: Diseño e implantación de una encuesta que permita conocer la satisfacción de los pacientes incluidos en la vía clínica de dolor agudo postoperatorio.

Metodología: La elaboración de la encuesta se encuentra fundamentada en la teoría de la desconfianza: la satisfacción del paciente es el resultado de la diferencia entre las expectativas y las percepciones de la asistencia sanitaria. Para soslayar la dificultad de comprensión de las preguntas que valoran las expectativas y con el objetivo de elaborar una encuesta sencilla se introdujeron en la misma frase percepciones y expectativas, metodología ya utilizada en el cuestionario SERVQHOS.

Resultados: La encuesta de satisfacción de la vía clínica del dolor agudo postoperatorio es anónima y autoadministrada, recogiendo los datos sociodemográficos de los pacientes (edad, estudios, ocupación y hospitalización previa). Consta de 10 preguntas que exploran dimensiones de la calidad percibida como son el trato asistencial, la información recibida, la competencia profesional y la calidad global.

El análisis preliminar de los 103 pacientes a los que se les ha suministrado la encuesta muestra un 52% de pacientes satisfechos o muy satisfechos con la información recibida sobre la atención del dolor, un 83% manifiestan un alto grado de satisfacción con el trato del personal sanitario médicos y un 78% de pacientes recomendarían sin dudarlo la unidad de dolor agudo.

Conclusiones: Las encuestas de satisfacción no son un fin en sí mismas sino que fueron diseñadas con un propósito en concreto: evaluar la situación actual para tomar una decisión que mejore la calidad de la asistencia sanitaria, centrada y orientada hacia el paciente. Combinar preguntas que abarcan aspectos globales tanto específicos de la satisfacción logra una mayor sensibilidad en la detección de aspectos clave a mejorar como por ejemplo la información. Es fundamental vincular la satisfacción con el comportamiento en el futuro del paciente, las expectativas cumplidas otorgan confianza y recomendaciones del servicio.

Palabra clave: Calidad, enfermería, psoriasis.

Introducción: La psoriasis es un proceso cutáneo multifactorial, de carácter benigno en general y de evolución crónica en forma de brotes. Se distribuye entre ambos sexos, siendo raro en raza negra e india. Debido a sus distintas formas de presentación clínica 8psoriasis en gotas, en placas, pustulosa, intradérmica,...) se convierte en una patología que no solo conlleva una clara afectación física, sino que influye de manera considerable en el ámbito social y personal de la persona, ya que la piel es la principal conexión que tenemos entre nosotros y el mundo exterior.

Objetivos: Valorar y analizar de manera objetiva qué grado de influencia ejerce la psoriasis en la calidad de vida de la persona que la padece.

Método: En el desarrollo del estudio se ha utilizado el test SKIN-DEX-29, instrumento de valoración que evalúa la escala emocional, funcional y sintomática de la persona, mediante 29 ítems.

Sujetos de estudio: Se han seleccionado al azar 27 personas que padecen y/o han padecido la enfermedad ó que han padecido brotes de psoriasis a lo largo de su vida y han acudido a la Consulta de Dermatología hospitalaria.

Resultado/Conclusiones: la calidad de vida de las personas con psoriasis se ve claramente alterada. Al ser una enfermedad crónica y en brotes, a los afectados les preocupa que su proceso empeore. En múltiples ocasiones les produce frustración, enfado, vergüenza y limitación alta en sus ocupaciones y relaciones sociales. Con este estudio hemos logrado obtener una visión más completa de la afectación percibida por la persona ante su enfermedad y hemos podido establecer un plan de autocuidados para estos pacientes. (En el Congreso se ampliarán los datos estadísticos del estudio).

Palabra clave: Programa acogida.

Introducción: Después de un seminario sobre Metodología de Evaluación y Mejora de Calidad se detectó el problema de que a pesar de existir un plan de acogida al usuario que se realiza al ingreso, el enfermo y familia desconocen aspectos básicos de la información. Se efectuó un análisis mediante Diagrama de Causa Efecto y Diagrama de Pareto de los tres años anteriores de evaluación. Se decidió realizar un ciclo de mejora sobre aquellos criterios de calidad del Plan de Acogida que no superaban el estándar del Hospital, fijado en un 71%.

Objetivos: Evaluación y mejora del programa de Acogida al Usuario del Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Dirigido al paciente y su entorno familiar.

Metodología: Evaluación interna, concurrente y realizada por personal implicado y ajeno a la Unidad, mediante entrevista directa a todos los enfermos o familiares que se encuentran hospitalizados mediante cuestionarios de tres días al azar.. En la entrevista se les pregunta sobre cuatro criterios de calidad, que se pueden verificar. La implantación de mejoras consistió en la difusión de los datos de la evaluación inicial entre el personal de enfermería de la segunda planta y elaboración e implantación de una hoja que se anexa al programa de acogida.

Resultados:

Criterio	% cumpl. antes	% cumpl. después	Mejora abs.	Mejora % rel.	Probabilidad	Nivel signif.
Nombre enfermería	27,5	83,9	56,4	77,8	2,010E-006	p < 0,001
Guía de información	32,5	96,8	64,3	95,3	8,200E-009	p < 0,001
Nombre médico	57,5	100,0	42,5	100,0	8,567E-006	p < 0,001
Horario información	67,5	93,5	26,0	80,0	0,006947	p < 0,01

Conclusiones: Tras la implantación de mejoras, se supera el estándar en todos los criterios, siendo el más bajo el conocimiento del nombre de la enfermera con un 84% de cumplimentación.

La información y el trato deben formar parte de la práctica clínica. Se deben planificar y sistematizar dichas actividades implicando a los profesionales que tienen que aplicarlos.

La condición más importante del éxito de los programas de calidad es la determinación de hacerlos funcionar y para ello la formación es básica en la estrategia de implantación de los programas.

Palabra clave: Hernias y CMA.

Objetivo: Valorar los indicadores de calidad en Cirugía Mayor Ambulatoria en pacientes intervenidos por hernias de la línea media colocando una prótesis de polipropileno preperitoneal con anestesia local

Material y método: De esta forma hemos intervenido de enero de 1999 a diciembre de 2001 a 124 pacientes, 85 con hernia umbilical y 39 con hernia epigástrica. La incidencia hombre/mujer fue de 5,5/1 para ambos tipos de hernia. La edad media de los pacientes fue de 52 años. El tiempo medio quirúrgico fue de 30 minutos para las hernias umbilicales y de 25 para las hernias epigástricas.

Resultados: El índice de sustitución fue del 98% para las hernias umbilicales y del 96% para las epigástricas. Tasa de ingreso y reingreso: 0%. Morbilidad: 0,8% (un caso de infección de herida quirúrgica).

Conclusiones: El tratamiento de las hernias de la línea media colocando una prótesis de polipropileno preperitoneal bajo anestesia local proporciona unos resultados excelentes para su utilización en régimen de cirugía ambulatoria.

ACTIVIDAD 2001 DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL SUMMA-061

C. Buey Mayoral, A. Álvaro Moreno, J. Lecuona Gutiérrez, M. Cuadrado Martín, M.J. Fernández Campos y L. Trujillo Hernández

P-024

Palabras clave: Atención al Usuario. Calidad percibida.

Objetivo: Presentar los datos de actividad de la Unidad de Atención al Usuario (UAU) durante el año 2001.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo sobre los datos recogidos durante el año 2001 en registros informáticos y soporte de papel de la UAU.

Resultados: Sobre 539.429 demandas asistenciales:

1. Reclamaciones escritas. 212 casos. Motivos: demora asistencia de ambulancias [91(42,9%)], demora asistencia de Unidades de Atención Domiciliaria (UAD) [22(10,4%)], disconformidad asistencia de la UAD [18(8,5%)], derivar pacientes a otros Centros por el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) [16 (7,5%)], disconformidad asistencia del médico CCU [14 (6,6%)] y cada motivo restante < 5%. Englobando motivos por Áreas: Servicio ambulancias [106(50,0%)], Servicio UAD [50(23,6%)], Servicio CCU [31(14,6%)], Servicio Unidades Móviles Emergencias (UME) [19(9%) y otros [6(2,8%)]. El 85,5% de contestaciones al usuario < 30 días.
2. Reclamaciones telefónicas. 371 casos. Motivos: demora asistencia UAD [82(22,1%)], demora asistencia ambulancia [82(22,1%)], disconformidad asistencia UAD [57(15,4%)], disconformidad asistencia médico CCU [45(12,1%)], disconformidad asistencia ambulancia [30(8,1%)] y cada motivo restante <5%. Englobando motivos por Áreas: Servicio UAD [154(41,5%)], Servicio ambulancias [113(30,5%)], Servicio CCU [71(19,1%)], Servicio UME [17(4,6%)] y otros [16(4,3%)]. Gestionadas por supervisores del CCU.
3. Felicitaciones. 49 casos (42 telefónicas y 7 escritas). Las primeras motivadas por el funcionamiento general del Servicio o la atención prestada por el personal facultativo. Las escritas son situaciones críticas atendidas por UME.
4. Solicitudes de información escritas. 116 casos, el 65,5% contestados en < 30 días.
5. Solicitudes de información telefónica. 8,5% llamadas-061 gestionadas por personal teleoperador CCU.

Conclusiones: 1) La proporción del número de reclamaciones/número de demanda asistencial es 1/1000. 2) Los resultados son una fuente de información para la mejora continua. 3) La sistematica de la Unidad implantada mejora los plazos de contestación a los usuarios y el registro de datos para su explotación. 4) Resaltar el servicio prestado a los usuarios con el tratamiento de las solicitudes de información escritas y telefónicas. 5) La atención a las emergencias representa el mayor grado de satisfacción de los usuarios.

RECLAMACIONES EN LA SANIDAD PÚBLICA EXTREMEÑA. 1999-2000. ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

J.M. Fernández Mastro, J.L. Ferrer Aguareles, I. Gago Frutos y G. González Conde
Consejería de Sanidad y Consumo, Servicio Evaluación.

P-025

Palabra clave: Reclamaciones, Clasificación, Normativa.

Objetivo: Analizar las reclamaciones de la C. A. Extremadura (1999-2000) y diseñar una propuesta de ordenación y desarrollo operativo que mejore la gestión de las mismas.

Metodología: Se recuperaron datos de las D. Provinciales de Insalud, agregándolos en fichas-resumen de una base de datos. Se procedió a la desagregación por Comunidad Autónoma, Provincias y Gerencias de Atención Primaria y Especializada. Paralelamente se creó un Grupo de Trabajo para la elaboración de una propuesta normativa de ordenación y gestión de las reclamaciones y sugerencias.

Resultados: Total de 2.668 reclamaciones (1999) y 3.320 (2000). En Atención Especializada el 84,23 % (3693) correspondieron a Badajoz, frente al 15,77% (691) de Cáceres. En Atención Primaria: 47,24 % (753) y 52,76% (841), respectivamente.

El hospital más reclamado es el de Mérida. Por conceptos, el apartado "listas de espera" destaca con un 33,78% de las reclamaciones en Especializada: 568 (1999) y 913 (2000), y un 24,77% del número total de reclamaciones.

Conclusiones: El número de reclamaciones no se corresponde con las poblaciones de Badajoz y Cáceres. Esta desproporción es particularmente acentuada en el ámbito de Atención Especializada. Tampoco existe proporcionalidad con los índices de actividad hospitalaria ni con la población atendida en el ámbito de Primaria. La clasificación usada por Insalud, (de 10-06-1992), se reveló como insuficiente e inespecífica, por lo que el Grupo de Trabajo tuvo que elaborar una nueva clasificación como soporte a la propuesta de ordenación para la gestión de las reclamaciones en nuestra Comunidad Autónoma.

DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PROPUESTA DE RECURSOS SOCIALES PARA LA GENTE MAYOR EN LA COMARCA DE L'ALT CAMP

Y. Domingo Calduch, E. López Prats, J. Tolosa, M. Luzón Torres y J.A. García Navarro

P-026

Palabras clave: Detección de necesidades y preferencias. Recursos sociales.

Introducción: Los cambios demográficos de la sociedad hacen que a un corto plazo se necesiten nuevos equipamientos sociales y sociosanitarios para nuestra gente mayor y por tanto planificar los recursos. Para ello necesitamos conocer las preferencias y necesidades de los mayores.

Objetivos:

- Realizar un análisis de las preferencias del usuario de la comarca de l'Alt Camp para planificar los recursos sociosanitarios.

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo transversal para conocer el estado de salud, dependencia y expectativas de la población mayor de 65 años entre los meses de octubre-diciembre del 2001 mediante encuestas telefónicas. Los ámbitos a estudio fueron: datos demográficos, sociales, funciones físicas (índices de Katz, Lawton y Brody), situación mental (índice de Pfeiffer), expectativas respecto al uso de servicios sociales y situación de salud.

Resultados: La comarca de l'Alt Camp (Tarragona) formada por 20 pueblos y 35.000 habitantes, es la comarca más envejecida: el 19,1% son mayores de 65 años (16,3% en Cataluña) siendo su densidad poblacional tres veces inferior (63,4 habitantes/km²) a la media catalana (192 habitantes /km²). Además el 58,2% de la población reside en Valls (capital de l'Alt Camp). Todo junto dificulta la provisión de servicios. En los resultados se vio que el 62,1% vive en pareja o pareja y familiares y el 21,4% solo; el 61% se relaciona con más de 5 personas y un 4,5% se relacionan con un sola persona (población de grave riesgo social).

Realizando el Katz, se vio que el 6,7% era dependiente. Respeto a Lawton el 65% son independientes, el 6,7% tiene un total dependencia y el 10,6% empezaron a mostrar alguna dificultad (grupo de riesgo alto).

El 15,7% necesitan cuidador. El 82% está satisfecho de los servicios sociales y cree que las actividades culturales, viajes y sociales tendrían que potenciarse.

El 7,3% de los residentes en Valls creen que se tendrían que potenciar los servicios sociales, frente al 31,5% que residen en municipios. De estos, un 70% estaría "dispuesto a pagar" para que el servicio estuviera en el pueblo y no tener que desplazarse.

Conclusiones: Necesidad de potenciar la formación de cuidadores-familias, estudiar y potenciar los servicios domiciliarios y plantear plataformas de multiservicios entre grupos de municipios.

EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS ANDALUCES SOBRE LOS PROCESOS ASISTENCIALES

M.A. Prieto Rodríguez, M.J. Escudero Carretero, J.C. March Cerdá, M. Hernán García, E. Fernández de la Mota y A. Torres Olvera
Escuela Andaluza de Salud Pública.

P-027

Objetivo: Conocer las expectativas de los ciudadanos andaluces sobre diferentes procesos asistenciales para incorporarlas a la GPI.

Metodología: Se ha utilizado un abordaje cualitativo basado en grupos focales y en entrevistas semiestructuradas. En cada uno de los procesos asistenciales estudiados (5 procesos asistenciales: diabetes, cefaleas/migrañas, dolor torácico, ataque cerebro vascular, y cáncer de cuello-útero) se han realizado un mínimo de dos grupos focales por segmento de opinión para garantizar un nivel suficiente de saturación. Para el diseño de los grupos se han tenido en cuenta criterios de homogeneidad inclusiva y heterogeneidad excluyente. En total se han realizado 16 grupos focales y 30 entrevistas semiestructuradas. En todos los casos se utilizó un guion de entrevista que incluía preguntas sobre dos grandes áreas: 1) recorrido asistencial vivido y calidad percibida en las distintas etapas del mismo 2) expectativas sobre la atención que creen que deben recibir. Se han identificado expectativas de 4 tipos (Thompson y Suñol): ideales, previas, normativas y no formadas. La información recogida se ha analizado mediante análisis de contenido.

Resultados: Entre los resultados globales (además se obtienen resultados específicos de cada proceso asistencial) señalar:

Expectativas ideales: Aspiraciones y deseos moderados. En pacientes crónicos deseo de un "descubrimiento que les cure". Apoyo emocional. Poder hablar sobre los aspectos no clínicos del proceso. Menos trámites. Más coherencia. Menos tiempos de espera. Participar en grupos autoayuda y EpS. Participar en la toma de decisiones.

Expectativas previas: Alto nivel científico técnico de los profesionales. Tecnología avanzada. Alto nivel de resolución. Capacidad de respuesta en situaciones graves. Los tratamientos más avanzados. Disponibilidad de los medios y recursos que necesiten. No racionalización de recursos. Ser bien informados. No errores. **Expectativas normativas:** Más agilidad. Más coordinación. Más accesibilidad al especialista: citas a demanda y teléfono. Pruebas complementarias en poco tiempo. Teléfono 24 horas. Programa de dispensación largos tratamientos. Comunicar los diagnósticos con "tacto". Seguimiento individual. Un responsable único de su proceso.

Expectativas no formadas: Pocas expectativas sobre la dimensión relacional y psicológica de la práctica sanitaria. Imagen de las/os enfermeras/os poco visible y/o ligada sólo a la amabilidad.

COMPARACIÓN DE DOS ENCUESTAS DE CALIDAD DE VIDA EN LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA

E. Gil Piñero, C. Martín Castro, F.J. Gómez Jiménez,
M. Colmenero Ruiz, I. Segado Jiménez y L. Olavarria Govantes
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía.

P-028

Objetivo general: Encontrar la herramienta/encuesta más adecuada para la medida de la calidad de vida residual en dos cohortes de pacientes con parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria.

Objetivos específicos: 1) Medir la calidad de vida residual en aquellos pacientes que sufren parada cardiorrespiratoria (PCR) en el medio extrahospitalario. 2) Determinar la herramienta de medida más adecuada para medir la calidad de vida residual ocurrida en el medio extra e intra hospitalario comparando para ello dos encuestas validadas.

Material y método: Se va a realizar un estudio observacional de un año de duración.

Ámbito: Provincia de Granada.

Criterios de inclusión: Se tomarán todos las PCR que sean atendidas por los Equipos 061 de la Empresa Pública de Emergencias de Granada. Se tomarán sistemáticamente todos los pacientes que sufran PCR en el medio extrahospitalario y únicamente se excluirán aquellos pacientes menores de 14 años por considerarlos dentro de la edad pediátrica. En la recogida de datos se seguirán las definiciones del estilo Utstein.

Como instrumento de medida para la calidad de vida se utilizará la escala de calidad de vida del proyecto (PAEEC) específica para enfermos críticos y la descrita en el estilo Utstein que evalúa capacidad cerebral y funcional.

Resultados: Han sido analizados un total de 410 paradas cardiorrespiratorias atendidas por los equipos de emergencias sanitarias de Granada de ellos 90 llegaron vivos al hospital (supervivencia extrahospitalaria del 22%), el 8% morían entre las 8 y las 12 primeras horas sin recuperar el nivel de conciencia, un 4,5% morían entre la primera y segunda semana de ingreso y el 87,5% eran dados de alta de los cuales presentaron nivel óptimo de calidad de vida según las dos encuestas y el 67% presentaban un nivel de calidad de vida residual óptimo a los seis meses y solamente el 37% de ellos a pesar de permanecer vivos a los seis meses estaban en coma valorada por ambas encuestas.

Conclusiones: La valoración sobre la calidad de vida residual fue la misma en ambas encuestas por lo que concluimos que según nuestros resultados las dos encuestas calibran y discriminan igual la calidad de vida residual y creemos que es indistinto utilizar una u otra para valorar dicha calidad de vida en la PCR.

DE LA INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE A LA MEJORA DE LA CALIDAD PERCIBIDA

C. Bayo Peiró y S. Juncosa Quílez
Hospital Creu Roja de Barcelona Unidad de Atención Primaria.

P-029

Palabra clave: Satisfacción usuario, calidad.

Objeto: Demostrar la utilidad del análisis de reclamaciones, quejas y sugerencias que realiza la Unidad de Atención al Usuario con el objetivo de identificar áreas de mejora de acuerdo con la percepción de los clientes del Hospital Creu Roja de Barcelona.

Metodología: Descripción de los principales motivos de insatisfacción de los clientes, recogidos por la Unidad de Atención al Usuario y clasificados según la tipología establecida por el Servei Català de la Salut en los últimos tres años (1999-2000-2001); muestra de las acciones de mejora potenciadas por el Equipo Directivo del Hospital.

Resultados: Disminución progresiva del número de expresiones de insatisfacción en los motivos que inicialmente aparecían con mayor frecuencia.

Conclusiones: El análisis de las muestras de disconformidad y insatisfacción expresadas por los pacientes y sus acompañantes, es útil para identificar los aspectos susceptibles de mejora y contribuir, con la implementación de acciones concretas, a mejorar el nivel de la calidad percibida por los clientes de un centro hospitalario.

PROTOCOLIZACIÓN MEDIANTE PLANTILLAS ASISTIDAS DE LOS INFORME DE ALTA

J. Domenech Calvet, X. Fort Barbera, O. Ros Garrigos y J.M. Sabate Guasch

P-030

Introducción: Debido a la gran cantidad de especialistas quirúrgicos que colaboran en nuestro centro, abierto a cualquier profesional, se decidió protocolizar y uniformizar los informes de alta de los enfermos quirúrgicos, debido a la gran diversidad que pudiera haber existido. Así mismo y como calidad asistencial, los informes de alta son realizados por los mismos profesionales, mediante el sistema informático de nuestro centro, para reducir al mínimo los errores de transcripción, siendo el propio profesional el dador de la documentación médica al paciente.

Material y métodos: En nuestro centro la gestión administrativa y de documentación clínica de los pacientes se realiza mediante el conjunto de programas informáticos OMI-SIGA (STACKS.S.L.). A partir de este conjunto de programas se realiza un informe de alta utilizando un documento creado con el procesador de textos Microsoft Word 97. En este documento, del cual existe una modalidad para cada especialidad, se crea dependiente de la base de datos de OMI-SIGA, de manera automática, los datos de filiación del paciente para el encabezamiento del informe. En el informe de alta, redactado de manera clásica, existen varias listas de menús desplegables i obligatorios: diagnóstico preoperatorio, alergias farmacológicas, tipo de anestesia, anestesiista, diagnóstico operatorio, tratamiento quirúrgico, complicaciones postoperatorias leves, lugar de consulta externa escogido y tratamiento domiciliario. Para realizar el informe solo se tiene que escoger las opciones deseadas e imprimir posteriormente para entregar al enfermo. En varias localizaciones del documento existe la posibilidad de añadir texto de manera libre por si no existe en la lista desplegable.

Discusión: Si bien al inicio de estos protocolos hubo un cierto rechazo hacia los mismos, en estos momento (mas de 3 años de aplicación) más del 98% de los informes son realizados por el profesional y entregados en mano al paciente. Para la realización de los informes no se tarda mas de dos minutos, quedando estos, almacenados en la base de datos central de la clínica para posterior recuperación si es necesario. Al estandarizar los informes hemos creado un modelo de informe que identifica al centro y se han eliminado la gran diversidad existente. Al realizar el informe el propio responsable del paciente, se reduce la fuente de errores que puede significar la transcripción por parte de una administrativa así como se cumple con la norma de guardar al máximo el secreto profesional. En nuestro caso creamos positiva la introducción de estos informes normalizados mediante menús desplegables, sobre todo en cirugía programada de baja y mediana complejidad, donde los diagnósticos, tratamientos y profesionales participantes son poco variables y existe un alto grado de protocolización.

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS PACIENTES

R. Pessel, E. Llorca, J. Ybarra, J.J. Mira Solves, V. Pérez-Jover y J. Rodríguez-Marín
Universidad Miguel Hernández, Dpto. Psicología.

P-031

Palabra clave: Encuestas satisfacción.

Fundamento: En muchos estudios mediante encuestas se cuenta con la colaboración del personal sanitario para conocer la opinión de los pacientes. No obstante, no es frecuente aprovechar la experiencia de este personal para mejorar estas evaluaciones.

Objetivo: Identificar puntos fuertes y áreas de mejora desde el punto de vista del personal sanitario que colabora en un estudio de satisfacción de pacientes.

Material y método: Se encuestó al personal de enfermería que había colaborado durante un estudio de campo (explicando a los pacientes el objetivo, forma de responder, etc.) para conocer la opinión de pacientes mediante una encuesta con 15 cuestiones clave. Las primeras cuatro con escala de respuesta dicotómica, las siete siguientes con una escala tipo Likert de 5 pasos y dos preguntas adicionales abiertas para recoger otras opiniones o sugerencias.

Resultados: Respondieron 352 enfermeros/as. 132 (37,5%) de Atención Primaria y 220 (62,5%) de especializada. 302 (85,8%) asistieron a la sesión de formación previa a la realización de las encuestas. 334 (96,3%) afirmaron haber recibido el documento de guía elaborado sobre el proceso de encuesta.

El 94,5% se declaró satisfecho con la claridad de las explicaciones recibidas. El 83,8% encontró el formato de las encuestas satisfactorio. El 95,3% se declaró satisfecho con el apoyo recibido desde la Dirección de los centros durante el estudio de campo. El 78,3% se mostró satisfecho con la colaboración recibida de los pacientes. El 77,5% consideró que los pacientes valoraron positivamente o muy positivamente la realización de la encuesta de opinión.

Conclusiones: Aunque los datos fueron positivos, las sugerencias recibidas permitieron identificar áreas potenciales de mejora, especialmente en lo referente a las encuestas realizadas a personas de edad.

LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO: INCIDENCIA Y PREVENCIÓN

S. Romero Carmona, C. Cabello Hidalgo, M.J. Cabrera Aguera,
I. Ruiz Leal, P. Limpo de la Iglesia y J.A. Sánchez Albusac

P-032

Palabra clave: Úlcera por presión, calidad, cuidados enfermeros.
Objetivos: Identificación del paciente de riesgo y aplicación del protocolo de medidas preventivas.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Para la valoración de riesgo de aparición de UPP, la unidad ha utilizado la escala de NOVA 5.

Resultados: Determinación de la tasa de prevalencia de UPP, de los pacientes que la padecen al ingreso en la unidad, se realizaron cuatro cortes de un mes de duración: 1º corte: 9,37%, 2º corte: 5,945, 3º corte: 14,8%, 4º corte: 14,73%. determinación de la incidencia de UPP en la unidad, relacionadas con el riesgo de padecerla según la escala NOVA 5. muestra 397 pacientes ingresados en la unidad de gestión de cuidados, la recogida se realizó con dos cortes de una duración de 2 meses del año 2001 la idea media 73,14, con una desviación típica de 12,93 la media de días de estancia es de 10,85.

los resultados de la incidencia acumulada relacionándola con el riesgo son:

pacientes sin riesgo: 0
pacientes riesgo bajo: 0,009

pacientes riesgo medio: 0,10
pacientes riesgo alto: 0,16

la densidad de la incidencia se relaciona con los resultados de aplicar la escala NOVA 5:

pacientes sin riesgo: 0%
pacientes riesgo bajo: 0,10%

pacientes riesgo medio: 0,9%
pacientes riesgo alto: 1,22%.

Conclusiones: La incidencia de UPP, disminuye con la valoración de riesgo del paciente al ingreso de la unidad y la aplicación de las medidas preventivas protocolizadas, y el uso de registros para su seguimientos.

CALIDAD PERCIBIDA COMO PARTE DE LA ATENCIÓN INTEGRA. APLICACIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS

F.J. Gracia San Román, N. Fernández de Larrea,
A.B. Fernández Llanes, R. Valencia Martín, E. Román Casares
y J. García Caballero

Hospital Materno-Infantil, Servicio Medicina Preventiva.

P-033

Palabra clave: Calidad Percibida. Satisfacción. Consultas Externas.

Objetivos: Introducir un documento que permita medir la calidad percibida por los pacientes atendidos en las Consultas Externas del Hospital "La Paz" como parte integral del proceso asistencial.

Metodología: La experiencia existente en nuestro hospital en la aplicación de encuestas de satisfacción como herramienta de medida de la calidad percibida por los enfermos ingresados, nos llevó a pensar en adaptar estos cuestionarios al ámbito de las consultas externas.

La elaboración de la encuesta se encuentra fundamentada en la teoría de la desconfirmación: la satisfacción del paciente supone las diferencias entre las expectativas y las percepciones de la asistencia sanitaria.

A través de reuniones con los Servicios interesados se ha adaptado el modelo de encuesta hasta obtener uno que realmente fuera operativo para poder detectar puntos fuertes y puntos débiles; es decir, la encuesta se diseñó para que de una manera sencilla pero directa se puedan detectar los logros y las deficiencias percibidas por los pacientes, lo cual nos permite caminar hacia la mejora continua.

Resultados: La encuesta se lleva a cabo de modo anónimo y trata de abarcar los aspectos más relevantes del ámbito de las consultas externas. En primer lugar se recogen los datos sociodemográficos del paciente para posteriormente explorar diferentes dimensiones de la calidad percibida. Las primeras preguntas están enfocadas hacia el trato/acogida por parte del personal sanitario; posteriormente se pregunta sobre la habitabilidad de la consulta; importancia clave sigue siendo la información recibida por los pacientes, aspecto explorado con otra batería de preguntas.

Por último, se añadieron tres apartados finales que dan una idea muy clara de dónde puede estar el problema; además, el paciente tiene la posibilidad de hacernos llegar con unas pocas palabras que es lo que considera que realmente podemos mejorar: "¿qué podemos hacer mejor?".

Conclusiones: La introducción de encuestas de satisfacción en las Consultas Externas de los hospitales supone una innovación y nos indica que los Servicios comienzan a preocuparse por la calidad percibida por los pacientes; este compromiso implica una tendencia hacia la mejora continua de la calidad asistencial, sin olvidar que el centro de nuestra atención debe ser principalmente el paciente (calidad percibida).

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN

J.J. Mira Solves, J. Rodríguez-Marín, R. Peset, V. Pérez-Jover,
J. Ybarra y F. Borras
Universidad Miguel Hernández, Dpto. Psicología.

P-034

Palabra clave: Encuestas de opinión, validación, atención especializada y primaria.

Introducción: En el 2001, la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, realizó un estudio para conocer las opiniones de los ciudadanos de nuestra comunidad acerca de la atención sanitaria recibida, tanto a nivel de atención primaria como especializada.

Objetivo: Describir el proceso de construcción y validación de una serie de encuestas, diseñadas específicamente para conocer la opinión de los pacientes sobre diferentes dispositivos.

Método: El proceso se desarrolló en 5 etapas: la primera es la revisión sistemática de instrumentos de medida de la satisfacción y/o calidad percibida del paciente. Posteriormente se llevaron a cabo grupos focales con pacientes que habían sido atendidos en cada dispositivo asistencial. En tercer lugar, una vez confeccionados los ítems de los distintos instrumentos, un grupo de expertos revisaron la primera versión de cada una de las encuestas. Seguidamente se pasó una prueba piloto a un reducido grupo de pacientes para determinar la comprensión de los ítems, el formato en el que se había diseñado cada encuesta, si habían diferentes interpretaciones posibles, etc. Finalmente, una vez recogidas todas las diferentes aportaciones de los participantes en estas fases previas, se procedió al estudio piloto.

Resultados: Las encuestas fueron cumplimentadas por 1.183 pacientes (edad media 48,93, 62,6% de mujeres). Los nuevos instrumentos tuvieron entre 21 y 17 ítems, con un Alfa de Cronbach entre 70 y 86. En todos los casos, el análisis factorial, confirmó la estructura teórica. Las dimensiones evaluadas fueron: empatía, información dada tanto al paciente como a los familiares, confort de las instalaciones y restauración (la varianza explicada osciló entre 65,72 y 76,29). Las encuestas incluyeron ítems para valorar las percepciones de los pacientes y si se estaban llevando a cabo aspectos identificados como 'buenas prácticas'.

Conclusiones: Al final del estudio se desarrollaron nueve tipos diferentes de encuestas de opinión, siete de atención especializada (hospitalización, cirugía, cirugía sin ingreso, obstetricia, pediatría, urgencias y consultas externas) y dos de primaria (medicina y pediatría).

PÓSTER II

Calidad percibida por los profesionales

Sala Navarra
Miércoles 9

¿CÓMO SE SIENTEN LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE UN ÁREA DE SALUD?

D. Serrano Peris, C. Cebrian Martín, A. Cortes Rama, C. Bendicho Rojo, F. Flordelis Marco y J.L. Grima Moliner
Gerencia Atención Primaria Área 3.

Palabra clave: Satisfacción laboral, Calidad, Profesionales sanitarios, Atención Primaria.

Objetivo: El objetivo de este estudio es conocer el nivel de satisfacción laboral y analizar sus componentes en los trabajadores del Área 3 de Zaragoza.

Metodología: Estudio descriptivo transversal realizado mediante el cuestionario auto administrado de satisfacción laboral "Font Roja", al que se le ha añadido una pregunta de sugerencias. Las preguntas se agrupan en 9 dimensiones que exploran diferentes aspectos de la satisfacción.

Resultados: Han respondido a la encuesta 538 profesionales del Área (69,3%); En general los profesionales están moderadamente satisfechos, 3,15 de una puntuación de 1 a 5; los que mejor valoran su trabajo son el colectivo de enfermería 3,24, y los que peor los administrativos, 2,95 Por dimensiones, las mejor valoradas son el contenido de trabajo y la autonomía profesional; las peor valoradas la tensión y el exceso de trabajo. La satisfacción media en los centros urbanos es ligeramente inferior a los rurales ($p < 0,01$), existiendo diferencias en la comunicación con los superiores, la tensión con el puesto de trabajo, el exceso de trabajo, la autonomía profesional y la relación con los compañeros.

Por colectivos, los administrativos de los C.S. rurales están más satisfechos que los urbanos, con diferencias significativas en este sentido en la comunicación con los superiores, la satisfacción y el contenido del trabajo, y la autonomía; en enfermería es mayor la satisfacción en los centros rurales, siendo significativa la mejor comunicación con los superiores. En medicina en el ámbito urbano es significativamente mayor la carga de trabajo (en ambos insatisfactorio) y la relación con los compañeros.

Se han recogido 215 sugerencias, siendo las dos más frecuentes entre los profesionales médicos: mejora de la formación continuada y disminución de la carga asistencial; en enfermería mejora/ampliación de recursos materiales y mejora de la formación continuada.

Conclusiones: La información obtenida en esta encuesta concuerda con la sensación que se advierte en los centros de salud; los administrativos urbanos están insatisfechos, los médicos sufren una mayor carga en los centros urbanos, siendo mejor la relación entre compañeros en los centros rurales. Respecto a las sugerencias debería hacerse una notable inversión en formación.

MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL MEDIANTE ELABORACIÓN CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS POR EL SERVICIO DE FARMACIA

M.J. Gimeno Jordá, J. Cabeza Barrera, T. Moreno Díaz y P. Acosta Robles
Hospital de Poniente Área de Farmacia.

Palabra clave: Medicamentos intravenosos, ahorro tiempo, calidad asistencial.

Objetos: Evaluar el ahorro de tiempo que supone en el trabajo diario de enfermería la elaboración de los medicamentos intravenosos, mezclas intravenosas (MIV) y jeringas precargadas, por el Servicio de Farmacia. Evaluar el impacto económico.

Metodología: Se analizan los diferentes medicamentos elaborados por el Servicio de Farmacia y administrados a los pacientes ingresados en las diferentes unidades de hospitalización y quirófanos durante el año 2001. Se calcula el tiempo medio empleado en la preparación por el Servicio de Farmacia y el tiempo medio indicado en la bibliografía para la elaboración en las unidades de enfermería. Se determina también el porcentaje de ahorro respecto al gasto total en medicamentos ocasionado por los pacientes ingresados en el hospital durante el período de estudio.

Resultados: El tiempo total que hubiese empleado enfermería en la preparación de los 95.239 medicamentos intravenosos elaborados por el Servicio de Farmacia (54.831 jeringas precargadas y 40.498 MIV) sería de 3.080 horas (440 jornadas/7 h), 830 h para las jeringas y 2.250 h para el resto. El ahorro obtenido con las MIV comparando la elaboración por el Servicio de Farmacia respecto a la elaboración en las unidades de enfermería es de 7.479 euros y con las jeringas precargadas es de 23.004 euros. El ahorro total supone un 2,2% del gasto de medicamentos en pacientes ingresados.

Conclusiones: La elaboración de MIV y jeringas precargadas por parte del Servicio de Farmacia es una actividad altamente costo/efectiva, que proporciona una mayor seguridad en la administración de los medicamentos intravenosos, tanto para el personal de enfermería como para los pacientes. Es importante el ahorro de tiempo que supone para enfermería el recibir estos medicamentos listos para su administración, correctamente identificados y elaborados en condiciones estériles, por lo tanto libres de posibles contaminaciones.

ESTADÍSTICA SOBRE EL HALLAZGO DE AGUJAS COMO UN FACTOR DE RIESGO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANT JOAN DE REUS

C. Aznar Labrador, A. García López, P. García Peña y G. Pellejà Estivill

Palabra clave: aguja, contenedor rígido, pinchazo, registro.

Resumen: Una de las preocupaciones que tienen actualmente las empresas es poder reducir el número de accidentes que se producen dentro del mundo laboral. El personal de limpieza, sensibilizado y consciente de la problemática existente en el centro, decide realizar mediante una hoja de registro, la contabilización de las agujas halladas fuera de los contenedores rígidos y de esta manera, hacer una aportación a la prevención de los riesgos laborales que se generan por los pinchazos con agujas, que afectan no sólo al personal de limpieza, sino a todo el personal asistencial.

Objetivos: Conocer el nivel de incidencia en el hallazgo de agujas fuera de los contenedores rígidos. Disminución del riesgo laboral por los pinchazos con agujas. Propuestas para mejorar la seguridad.

Metodología: Periodo de 1 año (octubre/00-septiembre/01)

- Confección de una hoja de seguimiento para el registro de agujas para cada servicio.
- Cumplimentación diaria de registros por parte del personal de limpieza del centro.
- Resumen mensual y anual de los datos registrados.
- Soporte fotográfico.
- Información de accidentes por pinchazos recogidos por el departamento de Relaciones Laborales.

Resultados: a) Meses: El recuento anual de agujas encontradas es de 645. N° de agujas mensuales oscila entre 12 y 105. b) Ubicaciones: El 47,4% de las agujas se localizan en las habitaciones, 11,3% en los pasillos, 9,4% en otros sitios que no son indicados, 7,1% en la mesita de noche y 6,6% en el botiquín. c) Servicios: El 29,4% de las agujas se localizan en el Servicio de Medicina Interna, 12,4% en Urgencias, 11,6% de Cirugía, 9,6% en Traumatología, 8,6% en Oncología y 7,4% en Reanimación.

Conclusiones: Después del cumplimiento de la Ley de Riesgos Laborables donde el Hospital de Sant Joan tomó las medidas adecuadas, el número de accidentes por hallazgo de agujas fuera del contenedor rígido continua siendo elevado, aunque presenta una mejora respecto del último trimestre 2000. En el momento de iniciar una acción de mejora sería necesario incidir en el hecho de dejar agujas en las habitaciones, ya que suponen cerca del 50% del volumen total. Potenciar el cumplimiento del protocolo de prevención y sensibilizar al personal a efectos de notificar todos los casos de pinchazos para el registro de accidentes. Incidir tanto en la formación como en la información de medidas preventivas a los trabajadores. El personal del centro tiene todavía un camino importante para conseguir una correcta manipulación de las agujas y disminuir así el riesgo de accidentes laborales por pinchazos.

SATISFACCIÓN DE LOS PROFESIONALES: UN NUEVO RETO EN LA ASISTENCIA SANITARIA

F.J. Gracia San Román, P. Jadraque Jiménez, R. Valencia Martín, A.B. Fernández Llanes, C. Riñón Aguilar y J. García Caballero
Hospital Materno-Infantil, Servicio Medicina Preventiva.

P-038

Palabra clave: Profesionales, satisfacción, EFQM (European Foundation Quality Management); Modelo Europeo de Gestión de Calidad

Objetivos: Medir el grado de satisfacción de los profesionales en un Servicio del Hospital Universitario "La Paz" y conseguir a partir de esta medición, localizar aquellos aspectos a mejorar y aquellos aspectos a consolidar. A partir de una mayor satisfacción del personal conseguir, como propone el EFQM, mejores resultados en los servicios prestados.

Metodología: Se diseñó una encuesta para medir la satisfacción del personal del Servicio de Nefrología del H. Universitario "La Paz" que pretendía abarcar los aspectos más relevantes en cuanto a la satisfacción del personal se refiere. La encuesta es anónima y consiste en primer lugar en 5 preguntas sobre las características del puesto de trabajo. A continuación se realizan al personal una batería de preguntas sobre su satisfacción en distintas dimensiones de su trabajo: salario, tipo de trabajo que hace, con el personal que depende de él/ella, con los jefes y superiores, con los compañeros, con sus posibilidades de ascenso, con la organización del trabajo que actualmente tiene, con su Servicio en general y con el Hospital. Finalizamos con una pregunta abierta en la que se brinda la oportunidad de hacer algún comentario por si hay algo que realmente el personal quiere destacar.

Resultados: La encuesta fue completada por el 100% del personal del Servicio. La opinión de los profesionales, independientemente de su categoría, coincidía bastante en casi todos los aspectos explorados. Los aspectos peor valorados globalmente fueron las posibilidades de ascenso y el salario; sin embargo, y de nuevo globalmente, los aspectos mejor valorados fueron aquellos que se referían al personal que depende del entrevistado, a los compañeros y al tipo de trabajo realizado. Además, se proponen las sugerencias realizadas cómo puntos fuertes y débiles, encasillándolas en los criterios pertinentes abordados por el Modelo Europeo de Gestión de Calidad (EFQM) (liderazgo, personas, política y estrategia, recursos, satisfacción (del personal, del paciente), impacto en la sociedad y resultados), para posteriormente hacer propuestas de mejora.

Conclusiones: Los Servicios comienzan a preocuparse además de por la calidad percibida por los pacientes por la satisfacción de su propio personal; este compromiso implica una tendencia hacia la mejora continua de la calidad asistencial siguiendo el Modelo EFQM, es decir, a través de una mayor satisfacción de los profesionales.

CLIMA LABORAL EN TRABAJADORES DE ZONAS BÁSICAS DE SALUD

P. González de la Flor, J.L. Navarro Espigares, J.M. Jover Casas y M.C. Fajardo Contreras
Complejo Hospitalario de Jaén.

P-039

Palabra clave: Clima Laboral, Clima Organizacional, Atención Primaria.

Introducción: Diversos estudios han puesto de manifiesto la influencia del clima organizacional existente en una institución sobre el nivel de salud de los trabajadores de la misma. En esta línea, el objetivo de este estudio es conocer el clima organizacional existente en 10 Zonas Básicas de Salud de Jaén (España) y analizar su influencia sobre la salud percibida por los trabajadores.

Métodos: Se diseñó un estudio descriptivo transversal en el que se incluyeron todos los trabajadores de 10 Zonas Básicas de Salud de Jaén (España). A cada trabajador se le realizó un cuestionario donde constaban los siguientes datos: sociodemográficos, de su historia laboral, y de percepción de salud. Además, se les realizó el cuestionario sobre problemas de salud, VOEG, y el cuestionario WES, de clima organizacional. Se realizó un análisis estadístico mediante las siguientes pruebas: el test de Kruskal-Wallis, la U de Mann-Whitney y la Correlación de Spearman. En todos los casos se analizaron los fenómenos de interacción y confusión.

Resultados: Los cuestionarios empleados en la investigación fueron respondidos por 179 (63,13%) trabajadores de las Zonas Básicas de estudio. La edad media es de 41,06 años (desviación típica: 6,60 años). El 59,2% de los participantes son hombres y el 40,8% son mujeres. El clima organizacional medio es de 63,92 puntos en una escala de 1-90 puntos (con una desviación típica de 12,44 puntos). Globalmente, la percepción de la salud de los trabajadores de las zonas Básicas objeto de estudio es muy positiva: el 86,03% considera que su salud, como mínimo, es buena. Concretamente, el 48,6% considera que su salud es buena, el 24,6% que es muy buena y el 12,8% considera que es excelente. Por el contrario, el 13,97% considera que su salud es mala o regular. El clima organizacional mostró una asociación estadísticamente significativa con la salud percibida ($p = 0,008$).

Conclusiones: En concordancia con las aportaciones de otros autores, el clima organizacional existente en una organización está relacionado con la salud percibida por los trabajadores de la misma. Por tanto los esfuerzos preventivos deberían ir encaminados hacia la promoción de políticas de mejora del clima organizacional en el trabajo.

RELACIÓN ENTRE SATISFACCIÓN LABORAL Y SÍNDROME DE BURNOUT EN ENFERMERÍA HOSPITALARIA

F. López Soriano
Hospital Comarcal del Noroeste.

P-040

Palabra clave: Satisfacción laboral. Burnout. Enfermería.

Objetivos: Conocer la relación que existe entre padecer el Síndrome de Burnout y estar satisfecho con el trabajo que desempeña la enfermería en el hospital.

Metodología: Se exploraron los niveles de satisfacción laboral de todos los trabajadores dependientes de la Dirección de Enfermería de nuestro hospital mediante el cuestionario Font Roja. A su vez, se exploraron los niveles de "quemado en el trabajo" mediante el Maslach Burnout Inventory. Se aplicaron pruebas estadísticas de correlación entre variables ordinales, aceptando como significativos valores de $p < 0,05$.

Resultados: Los ítems de Desrealización personal y de Agotamiento emocional no se correlacionaron estadísticamente con las dimensiones del cuestionario Font Roja.

La dimensión de Despersonalización (cinismo) se correlacionó negativamente con los niveles de satisfacción laboral. Los menos satisfechos con su trabajo dieron mayores puntuaciones en Despersonalización ($CC = -0,59$). Los que peor puntuaron las relaciones de jerarquía ($CC = -0,44$) y las relaciones con sus compañeros de trabajo ($CC = -0,42$) presentaron mayores puntuaciones en Despersonalización. La desorganización ($CC = -0,49$) y la falta de oportunidades ($CC = -0,66$) se asoció con mayores niveles de cinismo.

Conclusiones: Aunque no todos los trabajos publicados son coincidentes, la mayoría de ellos admiten una relación negativa entre satisfacción laboral y Síndrome de Burnout, de tal forma que se afirma que el aumento de la satisfacción en el trabajo haría descender los niveles de Burnout de los trabajadores. Aunque nosotros no encontramos relación entre Desrealización o Agotamiento emocional con la satisfacción laboral, es preocupante la relación satisfacción laboral con la dimensión Despersonalización, por los altos niveles de cinismo en la enfermería, detectados en un reciente estudio realizado en nuestro hospital.

Las Direcciones de Enfermería deberían tomar buena nota para atajar ambos problemas a la par, así como adoptar medidas correctoras más allá del simple diagnóstico organizacional.

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL ÁREA 9 DE MADRID

M.T. Sanz Cuesta, J. Rodríguez Escobar, J.L. García Más, J.C. García Antón, J.M. Peiro e I. Silla
Dirección Atención Primaria Área 9 Madrid.

P-041

Palabra clave: Satisfacción laboral. Atención Primaria.

Objetivo general: Conocer el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de atención primaria del Área 9 de Madrid. Comparar el grado de satisfacción entre categorías profesionales y Centros. Analizar si diversos factores influyen en el grado de satisfacción.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Se estudiaron todos los profesionales del Área, excluyéndose residentes y suplentes de menos de 6 meses. Variables: satisfacción, edad, sexo, profesión, titulación, tipo de contrato, antigüedad, centro de trabajo y turno de trabajo. El cuestionario de satisfacción fue el CSLPS-EAP/33, que contiene 33 ítems (escala de respuesta desde 1: muy insatisfecho hasta 7: muy satisfecho) agrupados en 8 factores. Recogida de información en julio del 2000.

Resultados: Tasa de respuesta: 58,23%. El nivel de satisfacción total fue de 3,9. Las dimensiones con niveles más altos fueron: satisfacción intrínseca a la actividad laboral (4,6), con el equipo (4,3), con el grado de autonomía y supervisión (4,3) y con la definición de objetivos y tareas (4,2). Las dimensiones con niveles más bajos fueron: satisfacción con la retribución (2,8), con la carga de trabajo (3,1), con la empresa y la relación con otras unidades (3,5) y con las condiciones de trabajo (3,8). Se observaron diferencias significativas entre las diferentes categorías profesionales en 4 dimensiones: satisfacción con la retribución, intrínseca a la actividad laboral, con la carga de trabajo y con el grado de autonomía. En cuanto al centro de trabajo, se observaron diferencias significativas en todas las dimensiones excepto en 2 de ellas: con la retribución y con la relación con la empresa y otras unidades. El turno de trabajo influyó significativamente en el grado de satisfacción con las condiciones de trabajo y con la carga de trabajo.

Conclusiones: El nivel medio de satisfacción global obtenido (3,9) podría caracterizarse de "indiferente", ni satisfechos ni insatisfechos. Entre las distintas dimensiones o facetas estudiadas las diferencias son importantes, siendo la satisfacción intrínseca con la actividad laboral la que produce mayor satisfacción y la satisfacción con la retribución la que produce mayor insatisfacción. Es necesario plantear un análisis detallado de los centros, con la participación de los profesionales implicados para tratar de determinar con más detalle las fuentes y motivos de insatisfacción y las potenciales estrategias para su mejora.

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL AL PROTOCOLO DE ACOGIDA A FAMILIARES DE PACIENTES DE UCI

J.J. García Morales, M.A. Muñoz Caballero, I. Puertas Vázquez, A. Moya García, I. García Morales y C. Muñoz Caballero

P-042

Palabra clave: Información familiares, satisfacción.

Objetivos: Exposición del protocolo de atención a familiares UCI Conocer el grado de aceptación del protocolo por parte del personal de la unidad.

Material y método: En nuestra unidad de CI se permite la entrada de los familiares (8.15 h, 13.30 h, 20.30 h) 30 minutos. En cada visita se permite un máximo de 2 familiares que entran conjuntamente. Tras la visita de mediodía, se informa a la familia de forma conjunta médico y enfermero.

Estudio descriptivo transversal entre Médicos y DUEs del servicio a través de una encuesta anónima pasada en mayo del 2002 y que consta de 15 ítems sobre diferentes aspectos como horario, demanda de información, información sobre cuidados de enfermería, información multidisciplinar.

Resultados: El 77,3% del personal colaboró con nosotros en la encuesta, un 44% de hombres frente a una mayoría del 56% de mujeres. La edad media es de 31 años, con media experiencia laboral de 8,4 años.

Resultados: Un 81,3% cree adecuado el horario establecido y la duración un 68075%. El 100% de los encuestados creen importante la información sobre cuidados de enfermería aunque 63% opina que es insuficiente. Existe un 25% del personal que opina que esta información es suficiente, destacando que este grupo es en un 75% médicos. Todos están de acuerdo en que con la información se fomenta una mejor relación con la familia y 87,5% que es la mejor manera de disminuir la ansiedad familiar. Un 62,5% está de acuerdo con la información multidisciplinar y aunque un 50% reconoce encontrarse cómodo solamente "a veces" durante esta, reconocen que siempre casi siempre favorece el trabajo en equipo (75%).

Conclusiones: Nuestro equipo esta convencido de los beneficios que una información completa y adecuada producen en el estado emocional familiar y en nuestra relación con la familia.

El abordaje multidisciplinar de la información a pesar de resultar menos atractiva para el profesional, la gran mayoría reconoce sus beneficios para un trabajo en equipo.

Existe insatisfacción por parte del personal de enfermería sobre la información de sus cuidados. Relacionamos esta insatisfacción con la explicada dentro de la sala de información ya que esta responde mas a aspectos vitales, dadas las características de los pacientes de UCI, que generalmente son resueltos por el médico

Este estudio nos ha mostrado la necesidad de seguir profundizando, siendo en próximos estudios la familia el eje de recogida de datos.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE VACUNACIÓN EN PACIENTES ESPLÉNECTOMIZADOS EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (2001)

C. Cejallos García, A. Estirado Gómez, T. Martín Acero y J. Fereres Castiel

P-043

Palabra clave: Interconsulta demora vacuna.

Objetivo: Conocer el total de pacientes esplenectomizados en el Hospital Clínico San Carlos durante el año 2001, el porcentaje de pacientes en los que nuestro servicio valoró la vacunación y el tiempo de demora entre la esplenectomía y la interconsulta.

Métodos: El número de esplenectomías totales o parciales realizadas en el hospital durante el año 2001 se ha obtenido a partir del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), utilizando como código de proceso de la CIE-9 el 41,5 y el 41,43, y de las interconsultas recibidas en nuestro servicio. Las variables de edad, sexo y diagnóstico principal se obtuvieron a partir del CMBD. Los pacientes en los que nuestro servicio realizó la valoración de vacunación se obtuvieron de los partes de interconsulta contestados por nuestro servicio, de los volantes de petición de vacuna a Farmacia y de los informes de alta del ingreso correspondiente a la esplenectomía.

Resultados: El total de esplenectomizados durante el período de estudio fue de 33 pacientes (66,7% varones y 33,3% mujeres), con edades comprendidas entre 6 y 83 años. Las indicaciones de la esplenectomía fueron: neoplasias digestivas en el 39,4% de los casos, enfermedades hematológicas en el 24,2%, politraumatismos en el 15,2% y otros motivos en el 21,2%. El 48,5% de los pacientes había sido vacunado por indicación del Servicio de Medicina Preventiva, no habiendo sido consultados para la vacunación el 51,5% restante. Sólo el 12,5% fue vacunado antes de la cirugía, con enfermedades hematológicas como indicación de la esplenectomía.

Conclusiones: El Servicio de Medicina Preventiva no tiene conocimiento de la mayoría de las esplenectomías realizadas en el hospital (51,5%) Sólo un 12,5% de las interconsultas son recibidas antes de la cirugía; si la cirugía es programada la vacunación previa consigue que el paciente ya esté protegido en el momento de realizar la esplenectomía. Sería de gran utilidad implementar un programa de vacunación interdisciplinar para conseguir una cobertura vacunal más precoz en nuestros esplenectomizados.

ESTUDIO DE CAÍDAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

P. Limpio de la Iglesia, S. Romero Carmona, A. Alfaro Doñoro, P. Baños Martín, V. Fernández Rodríguez y M. Flores Blanco

P-044

Palabra clave: Caídas, ancianos, lesiones, pluripatológico.

Objetivo: Conocer la frecuencia, circunstancias y consecuencias de las caídas en el ámbito hospitalario,

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las caídas producidas en la UGCE durante el año 2001, en una población comprendida entre 65 y 99 años que generaron una estancia de 9641 aplicación de protocolo de detección de pacientes de riesgo.

Resultados: Incidencia de caídas: 0,082%

edad media que sufren caídas: 76,7 años, el turno más frecuente en que se producen es en la noche, en el 62% de las veces acompañado por un familiar. Motivo de caída: 12% desorientación en el sueño, 12% al levantarse de la cama. Lugar de la lesión/caída: desde la cama.

Relación fármacos/caídas: 19% diuréticos, 13% antihipertensivos, cardiotónicos y ansiolíticos

Conclusiones: La aplicación del protocolo del riesgo de lesión/caídas, por parte del personal así como el registro en la historia de enfermería de ese riesgo, y de las medidas preventivas adoptadas, en pacientes de edad avanzadas, pluripatológicos y polimedificados, hacen disminuir la frecuencia de aparición de las caídas, el uso de camas de altura regulable contribuiría a una mayor disminución de la incidencia.

IMPLANTACIÓN CICLOS EVALUATIVOS CUMPLIMENTACIÓN DE CUIDADOS SONDAJE VESICAL Y REPERCUSIÓN EN SALUD DEL PACIENTE**P-046**

C. Castillo Gómez, F. Hernández Garcías, A. de la Cruz Pérez y M. Pérez Gutiérrez
Hospital Virgen del Castillo.

Palabra clave: Evaluación, Sondaje, Infección Urinaria.

Objetivos: 1) Ver el grado de cumplimiento cuidados enfermería relación paciente sondado, 2) Analizar repercusión dichos cuidados en salud (% de infección urinaria)

Material y método: Material: Registro seguimiento catéter. Hoja evaluación protocolo sondaje. Hoja evaluación Infección Urinaria. Método: Se parte de un protocolo de sondaje vesical, ver grado de cumplimiento (indicador-proceso) y posible relación con tasa de infección urinaria (indicador-resultado). La evaluación no la realizan los profesionales implicados en la técnica, es una única persona ajena a las unidades a estudiar quien sube a las plantas y posteriormente pasa los datos a los implicados.

Desarrollo: 1) Se realiza hoja de evaluación basada en dicho protocolo con 12 ítems dicha hoja es una escala binaria donde aparece si-no para ver el cumplimiento-Incumplimiento del criterio. La acción evaluadora es retrospectiva concurrente, 2) Hoja de seguimiento de catéteres donde aparece fecha de sondaje, retirada, complicaciones, 3) Hoja de recogida de datos de Infección Urinaria. La hoja de seguimiento de catéteres está dentro de la historia clínica, las hojas de cumplimentación de protocolo y desarrollo de infección urinaria, las lleva el evaluador. Por lo cual todo enfermo sondado durante los días de estudio tendrá tres hojas. La dimensión a evaluar es todo paciente sondado e ingresado en plantas de hospitalización (1^a y 2^a plantas). El periodo de tiempo son tres cortes longitudinales de 15 días en los meses de febrero, mayo y octubre.

Resultados:

Año	Nº total enfermos sondados en los cortes anuales	Nº enfermos sondados de acuerdo a protocolo cumpliment.	Protocolo	Nº enfermos infec. urinaria	% infección urinaria
99	89	73	82,00%	6	6,70%
00	100	84	84,00%	6	6,00%
01	102	87	85,20%	6	5,88%

Conclusiones: Establecer ciclos evaluativos ayuda a mantener el nivel de cumplimiento de un proceso determinado. A partir de medir una técnica ver el resultado en salud del paciente y encaminarse hacia el nivel óptimo que debe alcanzar dicho indicador. De esta manera disminuiremos riesgos y mejoraremos resultados.

GRUPOS DE MEJORA DEL SUMMA-061 PARA LA ADECUACIÓN A LA NUEVA NORMA UNE-EN-ISO-9001:2000

M.A. Pérez Cuevas, C. Infante Rodríguez, C. Buey Mayoral, M. Cuadrado Martín, J. Lecuona Gutiérrez y M.J. Fernández Campos

P-047

Palabra clave: Grupos de mejora. Certificación de Servicios Sanitarios. Normas ISO.

Objetivo: Analizar el grado de participación de cada uno de los colectivos que integran la organización en los grupos de mejora, detectando las causas que la favorecen o dificultan.

Metodología: 1) Se revisó la sistemática utilizada para implicar a todo el personal en la elaboración de los procedimientos que eran susceptibles de mejora:

- Se identificaron desde el Área de Calidad aquellos procedimientos que debían ser mejorados.
- Se notificó a todos los integrantes de la organización la creación de los grupos.
- Se crearon 19 grupos específicos y multidisciplinares de mejora.
- 2) Se clasificó a los profesionales según categoría, área de procedencia y tipo de actividad desarrollada.
- 3) Se analizaron los porcentajes que reflejan el índice de respuesta de los distintos colectivos.

Resultados: 1) De 500 trabajadores han participado 89 (17,8%). 2) Solo en una categoría no hubo participación. 3) Existen diferentes porcentajes entre los distintos colectivos y entre las distintas categorías profesionales (sanitarias y no sanitarias). El personal asistencial representa el menor porcentaje de implicación en los grupos de mejora. El índice de participación en el Área Asistencial es más alto entre el personal sanitario que el no sanitario. El personal que desarrolla sus tareas en la sede del SUMMA-061 tiene mayor índice de implicación.

Conclusiones: Existen razones que justifican las diferencias reseñadas.

1) Los grupos han sido específicos lo que ha supuesto una limitación a la participación de determinados profesionales. 2) La dispersión geográfica limita la participación. 3) Las diferencias de implicación pueden reflejar un distinto nivel de motivación entre el personal sanitario y el no sanitario. 4) El desconocimiento de los incentivos previstos para la participación en los grupos puede determinar el grado de implicación. 5) No obstante, se ha registrado una alta participación de los profesionales en los grupos de mejora.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN LOS CENTROS DE GRUP SAGESSA

M. Imma Borràs Borràs, Antònia Aguilar Santos y Joan Costa Doménech
SAGESSA

P-048

Palabra clave: Satisfacción, calidad y rentabilidad.

Introducción: La gestión por competencias tiene por objeto introducir un modelo de gestión de recursos humanos basado en el desarrollo del potencial de los profesionales, mediante el análisis de las conductas observables y evaluables (las competencias), que permitan alienar las cualidades de los trabajadores con los retos de la organización.

Objetivos: Los principales objetivos que se persiguen son los siguientes:

- Integrar los procesos de gestión de recursos humanos (selección, formación, desarrollo...) desde una perspectiva única, que además facilite la involucración en la cultura de la Institución.
- Obtener un modelo de actuación que permita alinear las personas con la estrategia del Grupo y sus cambios a través del tiempo. (gestión del cambio)
- Conseguir incrementos en la efectividad de la actuación profesional de las personas que integren la organización.
- Disponer de un lenguaje para operacionalizar la cultura corporativa, mediante su concreción en comportamientos esperados (competencias).

Resultados a obtener: El objetivo primordial de un sistema de gestión por competencias es dirigir de forma integral los recursos humanos de la organización, mediante el aprovechamiento de los conocimientos, habilidades y capacidades de cada persona.

- Permite centrarse en comportamientos clave para desarrollar el puesto de trabajo.
- Aporta transparencia al comunicar a las personas el qué espera la organización de ellas.
- Permite evaluar mediante la observación de conductas, incrementando la objetividad.
- Permite descentralizar la gestión de los Recursos Humanos, y transferirla donde realmente se realiza.

La aplicación, hasta el momento parcial de este sistema de gestión, ha supuesto una mejor comprensión del potencial de los profesionales subyacente en la organización y ha resultado especialmente útil para:

- El diseño de los sistemas de desarrollo profesional.
- Los procesos de promociones internas.
- Los procesos de selección externa.
- Creación de inventarios de perfiles como base para diversas aplicaciones, en especial para la selección de personal y planificación de la formación.
- Introducir sistemas de evaluación por competencias.

AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN CUATRO SERVICIOS AUTONÓMICOS DE SALUD –SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, SERVICIO CANARIO DE SALUD, OSAKIDETZA E INSALUD ÁREA II–

I. Bilbao Acedos, J.C. March Cerdá y M.A. Prieto Rodríguez
Escuela Andaluza de Salud Pública.

P-049

Objetivos: Conocer la percepción de los profesionales de Atención Primaria sobre la Comunicación Interna, analizar su grado de satisfacción con el funcionamiento de la misma, conocer aquellos aspectos que en opinión de ellos contribuyen al buen funcionamiento y/o dificultan de la Comunicación Interna en sus organizaciones y recoger propuestas de mejora.

Metodología: Se utiliza una combinación de metodología cualitativa y cuantitativa, basada en la realización de entrevistas semi-estructuradas a profesionales de las tres categorías profesionales consideradas (médicos, personal de enfermería y técnicos) y su posterior análisis de contenido y en una encuesta de Comunicación Interna, Clima y Satisfacción Laboral a una Población de médicos, personal de enfermería y técnicos de Atención primaria de los cuatro servicios de salud analizados.

Tipo de muestreo: Muestreo polietápico, con selección de distritos/gerencias/unidades/áreas a través de muestreo estratificado con afijación proporcional según el tamaño del distrito y posteriormente selección de los individuos a través de muestreo aleatorio simple dentro de cada uno de los estratos definidos por las tres categorías profesionales consideradas, para una $p = 70\%$ y un nivel de confianza del 95%. El error máximo admitido es de $\pm 5\%$ para el conjunto de la muestra.

Instrumento: Cuestionario diseñado y validado especialmente para este contexto.

Resultados de la fase cualitativa:

La idea de la Comunicación Interna resulta positiva para los profesionales: "Hombre, yo creo que la comunicación es la base de todo..."

En cuanto a su funcionamiento, consideran que es fluido y correcto en el nivel horizontal, dentro del grupo de su misma profesión, sin embargo los problemas surgen al pensar en la comunicación entre distintas categorías profesionales y con la Dirección, si bien encuentran accesibles a los mandos intermedios. El sistema de Comunicación Interna lo catalogan como carente de formalización, con una información escasa, impuntual y que llega "a golpe de suerte". Entre las propuestas de mejora, destaca la necesidad de agilizar la comunicación con la Gerencia, con el fin de que sus sugerencias lleguen a las instancias superiores. En cuanto a los canales de comunicación, los profesionales solicitan la promoción de canales directos, tanto formales (reuniones de equipo) como informales (charlas de café), por favorecer el diálogo, frente a los canales indirectos, menos interactivos.

CUIDANDO A LOS PROFESIONALES: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA

D. Villarreal Benítez, M. Boqué Cavallé, M. Cruz Román, F. Oliver Robres, A. Palau Galindo y J. San Miguel San Martín

P-050**Palabra clave:** Prevención.

Objeto: Basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/95), se evidencia la necesidad de iniciar una política preventiva en nuestro centro de trabajo, por lo que todos los profesionales del centro deben identificar los riesgos derivados de su puesto de trabajo y conocer las medidas preventivas y correctoras.

Metodología: Después de una evaluación inicial de riesgos llevada a cabo por una empresa ajena dedicada a esta actividad, se elabora un cronograma de la planificación de la actividad preventiva (marzo-2002), en el que se distribuye mensualmente toda la actividad preventiva programada para este año.

- En marzo se lleva a cabo una sesión informativa sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- En abril se adquiere diferente material para la prevención de riesgos: cortinas para evitar reflejos, reposapiés.
- En mayo se realiza una sesión a todos los profesionales, en la que se reparte una hoja informativa sobre el lavado de manos y sobre prevención de riesgos biológicos. Además se adquiere material específico: gafas protectoras de salpicaduras, guantes anticorte y contenedores de desecho de material punzante para el domicilio.
- En junio se realizan dos sesiones a todos los profesionales sobre ergonomía en las tareas administrativas, repartiendo un dossier formativo. Está previsto durante este año la distribución de 2 hojas informativas, respecto a la manipulación de gases comprimidos e información de riesgos derivados de las radiaciones ionizantes.

Resultados: La asistencia de los profesionales a las sesiones hasta la fecha ha sido de un 85%.

Las hojas informativas repartidas en las diferentes sesiones han llegado al 100% de los profesionales.

Durante el año 2001 hubieron cuatro accidentes biológicos en el centro, frente a un accidente biológico a fecha de junio-02.

Esta previsto valorar a finales de año el impacto de la información mediante la observación de tareas.

Conclusiones: La importancia de la formación e información para transmitir una cultura preventiva correcta a nuestros profesionales.

ANÁLISIS COMPARADO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE DIVERSOS HOSPITALES SOBRE LA COMUNICACIÓN INTERNA

J.C. March Cerdá, M.A. Prieto Rodríguez e I. Bilbao Acedos
Escuela Andaluza de Salud Pública.

P-051**Palabra clave:** Comunicación interna, percepción.

Introducción: La comunicación interna constituye por tanto una política estratégica de cualquier institución. El establecimiento de dichos objetivos y de las estrategias más adecuadas requieren de un conocimiento previo de la situación de partida de la comunicación dentro de la organización, por medio de la realización de una auditoría de comunicación. El análisis comparado de los resultados obtenidos con los de organizaciones similares resulta fundamental para la comprensión del fenómeno comunicativo en cada organización y de la percepción relativa de cada estamento profesional.

Metodología: Estudio de tipo descriptivo transversal. La información se obtuvo mediante un cuestionario autoadministrado de Clima Laboral y Comunicación Interna, a una muestra representativa por categoría profesional de los profesionales de un hospital del Servicio Murciano de Salud, obteniéndose una tasa de respuesta del 50%. Se utilizaron escalas de tipo Likert de 1 a 7 para la medición de las variables. Los resultados obtenidos sobre la percepción de la comunicación se compararon con los obtenidos en 5 hospitales del Servicio Andaluz de Salud, entre los años 1998 y 2001.

Resultados: Para el conjunto del hospital, la credibilidad de la información y la formalización de los canales utilizados para transmitir la información son mejor puntuadas que en los hospitales anteriormente evaluados, sin llegar por ello a presentar puntuaciones positivas, puesto que no logran superar el punto medio de la escala; por el contrario, la cantidad de la información es percibida como aún más escasa que en los otros cinco hospitales. Por categorías profesionales, el personal médico y el no sanitario del hospital en estudio se encuentran más satisfechos con la comunicación interna de su centro que los profesionales de estas mismas categorías de otros hospitales, pese a que sus niveles de satisfacción sean todavía bajos. Sin embargo, el personal de enfermería y sus mandos intermedios no ocupan una posición aventajada con respecto a otros hospitales, por el contrario sus niveles de satisfacción inferiores a los de sus colegas de varios de los hospitales estudiados.

PÓSTER III

Modelos de gestión, certificación y acreditación

Sala Navarra
Miércoles 9

DE LA AUTOEVALUACIÓN EFQM A LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS LÍNEAS DE MEJORA: DESPLIEGUE POR OBJETIVOS EN UN ÁREA SANITARIA

A. Rodríguez Balo y J. Ferrández Santos
Unidad de Calidad Área 11 Atención Primaria.

P-052**Palabra clave:** Planificación estratégica. EFQM. Dirección por objetivos. Cuadro de Mando Integral.

Objeto: Desarrollar un modelo de despliegue por objetivos a partir del análisis EFQM en la planificación estratégica de un área sanitaria de Atención Primaria.

Metodología: Fase de Autoevaluación: Planificación estratégica mediante el análisis del entorno interno (modelo EFQM) y del entorno externo (modelo GIB General, Integrativo, Básico- ESADE 1989)

Fase de selección y priorización de estrategias: Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y diagrama de afinidades.

Fase operativa: Despliegue por objetivos (modelo Hoshin Kanri) en las unidades de Dirección Gerencia. Seguimiento de actividades y resultados, mediante la aplicación progresiva de un Cuadro de Mandos Integral.

Resultados: Priorización y agrupamiento de las líneas estratégicas respetando los objetivos institucionales. Despliegue por objetivos sistemático, vinculando cada objetivo con determinada línea estratégica, con formulación en cascada para el conjunto de las unidades de Gerencia con responsabilidad en su ejecución. Traducción de los objetivos, actividades, responsabilidades e indicadores de evaluación en el contrato de gestión de cada unidad de Gerencia. Fase inicial de elaboración del Cuadro de Mando Integral a partir de los indicadores resultantes del despliegue junto con indicadores de las actividades de "administración diaria" (Sing Soin 1997). Asignación de un indicador motor (o de futuro) o de resultado según el tipo de actuación u objetivo (Kaplan & Norton, 1996).

Conclusiones: El modelo de autoevaluación (EFQM) junto con diferentes técnicas de agrupamiento y priorización, facilitan el análisis competitivo de un Área sanitaria y se traduce en potenciales líneas de mejora. La planificación estratégica precisa del desarrollo operativo para hacer visible el compromiso de su realización. El despliegue por objetivos permite aplicar cada línea estratégica, objetivo y actividad, de forma gradual, participativa y por niveles en todas las Unidades de Gerencia. La extensión del modelo al conjunto del Área, requiere de una "gestión del cambio" para reducir las resistencias e interiorizar el enfoque. El Cuadro de Mandos Integral permite la visualización progresiva del alcance de la planificación estratégica. En conjunto, el despliegue Hoshin y el cuadro de mandos integral constituyen fuertes comunicadores tanto de la estrategia como de la relevancia de los objetivos.

MODELO EFQM: EVALUACIÓN DE CÓMO SE GESTIONAN LOS PROCESOS DE FORMA SISTEMÁTICA EN UN HOSPITAL

J.L. Mestre Ricote, C. García Aparicio, P. Partor Roca,
N. Pastor Santonja, J. García Llorens y J. García Guerrero
Hospital de Villajoyosa.

P-053**Palabra clave:** EFQM, gestión, procesos.

Introducción: Nuestro Hospital está trabajando siguiendo el modelo europeo de calidad EFQM. Inicialmente se realizó la autoevaluación del Hospital por parte de nuestro personal ayudado por personal de la Inspección Técnica de Servicios de la Generalitat Valenciana. Actualmente nos vemos inmersos en la elaboración y puesta en marcha de proyectos de mejora.

Objetivo: Nuestro objetivo es evaluar el subcriterio IB de liderazgo, cómo los líderes apoyan la mejora y la involucración proporcionando los recursos y ayuda adecuados.

Metodología: Se está siguiendo el modelo de Calidad EFQM. Todo el personal del Hospital que está trabajando en los grupos de mejora de Calidad realizó un curso para formarse en la metodología bajo la cual iba a trabajar, evaluando posteriormente el cumplimiento de cada uno de los criterios del modelo EFQM para nuestro Hospital. Para el subcriterio que nos interesa se detectaron en nuestra organización los puntos fuertes y las áreas de mejora.

Resultados: Como puntos fuertes hemos encontrado el que exista un responsable designado formalmente para cada proceso y subproceso, disponemos de estándares operativos y de instrucciones para cada proceso, existen manuales de procedimientos normalizados y disponemos de indicadores para medir los procesos.

Las áreas de mejora detectadas son: Crear equipos de trabajo como mecanismo básico para la mejora, identificación del personal ante el paciente, mejorar las labores de información, ampliar y establecer programas de docencia e investigación, etc.

Conclusiones: De la evaluación se desprende que son necesarios diferentes proyectos de mejora para progresar en las áreas de mejora detectadas. De hecho, ya tenemos identificados y se están empezando a poner en marcha algunos de ellos.

MODELO EFQM: EVALUACIÓN DEL SUBCRITERIO 1B DE LIDERAZGO EN UN HOSPITAL COMARCAL

V. Company Beltrán, M. Ballester Artigues, J. Clement Imbernón, A. González Leainzbarritua, J. Garijo García y J. García Guerrero
Hospital de Villajoyosa.

P-055**Palabra clave:** Liderazgo, evaluación, EFQM.

Introducción: Nuestro Hospital está trabajando siguiendo el modelo europeo de calidad EFQM. Inicialmente se realizó la autoevaluación del Hospital por parte de nuestro personal ayudado por personal de la Inspección Técnica de Servicios de la Generalitat Valenciana. Actualmente nos vemos inmersos en la elaboración y puesta en marcha de proyectos de mejora.

Objetivo: Nuestro objetivo es evaluar el subcriterio IB de liderazgo, cómo los líderes apoyan la mejora y la involucración proporcionando los recursos y ayuda adecuados.

Metodología: Se está siguiendo el modelo de Calidad EFQM. Todo el personal del Hospital que está trabajando en los grupos de mejora de Calidad realizó un curso para formarse en la metodología bajo la cual iba a trabajar, evaluando posteriormente el cumplimiento de cada uno de los criterios del modelo EFQM para nuestro Hospital. Para el subcriterio que nos interesa se detectaron en nuestra organización los puntos fuertes y las áreas de mejora.

Resultados: Entre los puntos fuertes detectados en nuestro Hospital destacan: Se facilita la participación de los empleados en las actividades formativas, se promueve la participación de los trabajadores en equipos de mejora y los mandos dedican tiempo para actividades de mejora mediante reuniones formales e informales con los diversos estamentos. Las áreas de mejora que hemos encontrado son que no están definidos mecanismos para el reconocimiento de logros obtenidos, la necesidad de establecer sistemas de evaluación del rendimiento y establecer criterios para selección de candidatos para promociones y crear la figura de responsable-coordinador de las actividades emprendidas por los equipos de mejora.

Conclusiones: El apoyo del liderazgo a la mejora se ve refrendado por el hecho de que directivos del Hospital formen parte de los grupos de mejora, faciliten la participación del personal en acciones formativas y el nombramiento de Coordinador de Calidad.

MODELO EFQM: EVALUACIÓN DEL SUBCRITERIO IIA: POLÍTICA Y ESTRATEGIA EN UN HOSPITAL COMARCAL

J. Raduán Ripoll, R. Sánchez Domenech, F. Martínez, M. Hernández, M.T. Martínez Ases y García Guerrero
Hospital de Villajoyosa.

P-054**Palabra clave:** Política, estrategia.

Introducción: Nuestro Hospital está trabajando siguiendo el modelo europeo de calidad EFQM. Inicialmente se realizó la autoevaluación del Hospital por parte de nuestro personal ayudado por personal de la Inspección Técnica de Servicios de la Generalitat Valenciana. Actualmente nos vemos inmersos en la elaboración y puesta en marcha de proyectos de mejora.

Objetivo: Evaluar el subcriterio IIA, cómo la política y estrategia de la organización se basa en información relevante y global.

Metodología: Se está siguiendo el modelo de Calidad EFQM. Todo el personal del Hospital que está trabajando en los grupos de mejora de Calidad realizó un curso para formarse en la metodología bajo la cual iba a trabajar, evaluando posteriormente el cumplimiento de cada uno de los criterios del modelo EFQM para nuestro Hospital. Para el subcriterio que nos interesa se detectaron en nuestra organización los puntos fuertes y las áreas de mejora.

Resultados: Los puntos fuertes detectados en nuestro Hospital son: La organización recopila información a través de la participación del personal en las distintas comisiones del centro, de los indicadores de funcionamiento interno (actividad quirúrgica, lista de espera, etc.), del funcionamiento de la "competencia" a través de estudios de benchmarking y en el área de facturación, existe una normativa renovada anualmente, con criterios establecidos de actuación.

Las áreas de mejora que hemos encontrado son: La organización no recopila información de clientes, proveedores, la comunidad y organizaciones externas, de indicadores demográficos, nuevas tecnologías, resultados y prácticas de otras organizaciones externas y materiales sociales y de medio ambiente.

Conclusiones: Nuestra organización debe profundizar en obtener más información tanto del cliente externo como del interno, así como de otras organizaciones externas consideradas las mejores.

IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PLAN DE ACOGIDA EN EL HOSPITAL MARINA BAIXA

T. Alonso Romero, M. Ivañez Martí, J. Albert Carbonell, F. Limiñana Samper, J. García Guerrero y M.J. Gallego Aura
Hospital de Villajoyosa.

P-056**Palabra clave:** Acogida, personal, nuevo, evaluación.

Introducción: La mayoría de los hospitales carecen de planes de acogida dirigidos a todos sus trabajadores de nueva incorporación, salvo en el estamento de enfermería, que sí lo suelen tener desarrollado. Nuestro Hospital está trabajando siguiendo el modelo europeo de calidad EFQM. Una vez realizada la autoevaluación, detectamos un área de mejora en este aspecto, por lo que desarrollamos como proyecto de mejora el elaborar un plan de acogida para todo el personal que se incorpore al Hospital.

Objetivo: El objetivo de nuestro trabajo es implantar y evaluar un Manual de acogida para todo el personal de nueva incorporación al Hospital.

Metodología: El Manual fue elaborado por uno de los cinco grupos de mejora constituidos una vez concluida la autoevaluación. Para su implantación, se le dará copia del "Manual de Orientación al Personal de Nueva Incorporación" a todos los jefes de Servicio y Unidades del Hospital, tanto sanitarios como no sanitarios, que se encargarán de dárselos a los nuevos trabajadores que se incorporen a su Servicio. Para evaluar la implantación se le realizará una encuesta a los nuevos trabajadores, en la que se valorará tanto si les ha sido repartido como distintos aspectos que figuran en el Manual.

Resultados: En la actualidad el Manual de Orientación al Personal de Nueva Incorporación se encuentra a disposición de los jefes de Servicio, que lo están repartiendo al nuevo personal que llega a sus servicios, por lo que el Plan de Acogida ya está en funcionamiento. La encuesta nos evaluará la cobertura que tiene el Plan de Acogida y las necesidades expresadas por los trabajadores en materia de incorporación al trabajo.

Conclusiones: El Plan de Acogida ha sido recibido favorablemente entre el personal del Hospital. Consideramos de mucha importancia el hecho de que un trabajador a su llegada a un nuevo centro sepa donde se tiene que dirigir, la estructura y organigrama de su Hospital, sus medios de transporte, etc. Con el Plan de Acogida conseguimos acelerar la integración de los nuevos trabajadores en el Hospital.

EL MODELO EFQM EN EL HOSPITAL DE BASURTO. CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DEL RENDIMIENTO

M. Álvarez Yeregi, K. Mezkorta Echaurren, J. Guajardo Remacha, A. Bolado Velasco y M. Latorre Guisasola
Hospital de Basurto.

P-057

Palabra clave: EFQM; management.

Objetivos: 1) Describir las medidas que informan al hospital acerca del nivel de cumplimiento de los objetivos de rendimiento de la organización. 2) Analizar el desarrollo del hospital desde el año 1996 al 2001 en función del logro de los objetivos, las tendencias y la comparación con otras empresas del sector.

Metodología: 1) Se definen los grupos de interés de la organización. 2) Se identifican los aspectos relevantes que el hospital pretende satisfacer en cada uno de estos grupos. 3) Se seleccionan en 9a las medidas que hacen referencia a los resultados clave en cada uno de los aspectos relevantes; y en 9b las medidas operativas que utiliza el hospital para supervisar, entender, predecir y mejorar los resultados clave del rendimiento del hospital. 4ª- Los resultados son evaluados conforme a los objetivos marcados y a los obtenidos por otros hospitales de similares características en cuanto a actividad, dimensión y cartera de servicios

Resultados: 9a_1 Resultados clave económicos: Suficiencia financiera, Equilibrio presupuestario, Coste de la Estancia, Coste del Alta, Coste de la Urgencia no Ingresada, Coste de la Primera Consulta y Coste del Peso. 9a_2 Resultados clave no económicos: -ACTIVIDAD: Nº de Ingresos, Nº de Urgencias no ingresadas, Nº de Primeras consultas intrahospitalarias, Nº de intervenciones en cirugía de día, Nº de procedimientos en hospital de día; -CALIDAD: Índice de mortalidad, Prevalencia de Infección Nosocomial, Tasa de úlceras por presión y Tasa de Accidentes.

9b Indicadores clave: -EFICIENCIA: Estancia Media, Estancia Media preoperatoria, Índice de ocupación, Índice de utilización de quirófanos; -CALIDAD: Nº de reingresos, Tasa de ambulatorización, Calidad del Informe de alta, Listas de espera (quirúrgica, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos)

Conclusiones: ACTIVIDAD: el hospital muestra una tendencia de crecimiento constante en la actividad desde 1996, superando los objetivos planificados y los resultados de otros hospitales competidores. CALIDAD: el nivel de calidad es similar en los resultados clave; sin embargo, las áreas de mejora observadas tras el seguimiento de los indicadores de 9b, han conducido a realizar inversiones estratégicas en el área de la cirugía (construcción de quirófanos), que van a conducir al éxito de la organización a medio plazo. EFICIENCIA: las medidas de este elemento son muy positivas para el hospital en comparación con nuestros competidores.

LA CONEXIÓN ENTRE LA NUEVA NORMA ISO 9001: 2000 Y EL MODELO E.F.Q.M. DE EXCELENCIA: NUESTRA EXPERIENCIA

P. Segura Sádaba, C. Zulueta Guridi y M. Elósegui Mendizábal
Hospital del Bidasoa.

P-058

Palabra clave: Certificación ISO 9001: 2000. modelo E.F.Q.M. de excelencia. satisfacción del cliente, gestión por procesos.

Introducción: La Dirección del Hospital Comarcal del Bidasoa optó por orientar su política de Calidad hacia el modelo de Calidad Total. Fruto de este planteamiento, la Unidad de Cirugía Sin Ingreso obtuvo la certificación en 1997, los Servicios Clínicos Centrales (Laboratorios de A. Clínicos y Anatomía Patológica y Servicio de Radiología), en 1999 y los Servicios de Admisión y Archivo de Historias Clínicas en 2001. Este año nos hemos adaptado a la nueva Norma ISO 9001: 2000 y unificando el alcance. ¿Cuáles son los cambios más relevantes? Por otro lado, el Hospital adopta como Política de Calidad en la Gestión el Modelo EFQM de Excelencia, habiendo sido reconocidos en 2000 con la Q de plata del Gobierno Vasco. En 2002 nos presentamos a una nueva Evaluación externa. ¿Cuál es la conexión entre ambos Sistemas?

Objetivos: 1) Aplicar el modelo de Calidad basado en la norma ISO 9001: 2000. 2) Pasar del Aseguramiento de la Calidad a la Gestión de la Calidad. 3) Lograr el reconocimiento oficial por el organismo certificador AENOR. 4) Aplicar el Modelo de la E.F.Q.M. de Excelencia en toda la Organización 5) Elaborar la Memoria 2002 según el Modelo E.F.Q.M. y someterlo a evaluación externa. 6) Cohesionar ambos sistemas

Metodología: La Dirección, como líder del proyecto, facilita la asesoría de un consultor externo y la dedicación al proyecto ISO del metodólogo de calidad del Hospital. Formación de grupo de trabajo con los responsables del servicio y reuniones semanales. Planificación del proceso de implantación con responsabilidades designadas. Aplicación de las novedades que implica la Nueva Norma. Desarrollo de la documentación del Sistema de Calidad basándose en la Normativa externa aplicable y los métodos de trabajo implantados en el servicio. Autoevaluación según el Modelo EFQM, con la participación de todos los Mandos Intermedios. Elaboración de la Memoria 2002 según el Modelo de la EFQM.

Resultados: Unificar el alcance de todos los Servicios Certificados ISO. Adaptarnos a la Nueva Norma ISO 9001: 2000. Aplicar el Modelo EFQM de Excelencia a toda la Organización. Elaborar la Memoria 2002 según el Modelo EFQM y presentarlo para una nueva evaluación externa en 2002.

Conclusiones: La implantación de este Sistema de Calidad basado en la Nueva Norma ISO9001: 2000 es una herramienta muy útil para abordar el camino hacia la gestión de la Calidad Total, ya que implica a clientes y profesionales, realizando una gestión más eficaz de todos nuestros procesos, fortaleciendo la imagen de calidad del Servicio y de la Organización y monitorizando el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Por otro lado, el Modelo E.F.Q.M. de Excelencia es un modelo global de Calidad en la gestión y, como tal, implica a toda la Organización en su conjunto. Ambos sistemas, lejos de ser incompatibles, se complementan.

ANÁLISIS A.E.P. DEL GRD 140 (ANGINA DE PECHO) EN UN ÁREA HOSPITALARIA

A. Ariztiz Bayon, R. Díaz Peral, F. Marín Puerto, A. Martínez Sánchez y B. Rico Rico

P-059

Palabra clave: Decuación, Estancias, Cardiología.

Objetivo: Análisis de adecuación de ingresos y consumo de estancias del GRD 140 en dos Servicios de Medicina Interna y uno de Cardiología pertenecientes al mismo área hospitalaria.

Material: Equipo de trabajo compuesto por dos Médicos Evaluadores (colaboradores externos a los Servicios). Sistema de información y disponibilidad del CMBDA correspondiente al periodo 2000.

Soporte informático: hoja de cálculo Excel y programa estadístico SPSS.

Manual de Aplicación del A.E.P. (APPROPRIATENESS EVALUATION PROTOCOL) editado por la Fundación Avedis Donabedian.

Método: Obtención de las Historias Clínicas necesarias a través de un proceso de muestreo sistemático aleatorio (al 95% y error: 0,05)

Servicio de Medicina Interna del hospital 1 (hospital de agudos): 75 (MIN 1)

Servicio de Cardiología del hospital 1 (hospital de agudos): 56 (CAR 1)

Servicio de Medicina Interna del hospital 2 (hospital de crónicos): 58 (MIN 2)

Aplicación de la versión Medico-Quirúrgica adultos del Manual.

Resultados: *Ingresos:* Diferentes niveles de Inadecuación: 20% (MIN 2).-10% (MIN 1).-5% (CAR 1).

Causas más importantes: nº 1: Las pruebas Diagnósticas y/o Terapéuticas pueden realizarse en consultas externas.

nº 19: Negativa del paciente a ser Alta en Urgencias.- Consideración de altable.

Adecuación: señalar la prevalencia del criterio nº 16: Electrocardiograma compatible con Isquemia Aguda en forma decreciente: CAR 1,MIN 1, MIN 2.

Estancias:

Diferentes niveles de Inadecuación: 40 % (MIN 2) -30 % (MIN 1) -28 % (CAR 1).

- Coexistencia en los tres Servicios de la causa nº 29; Permiso fin de semana.

- Causa nº 24 días de no trabajo en el hospital-, relevante en el hospital de agudos.

- Causa nº 21 Pendiente de realización de pruebas diagnósticas: 48% (MIN 1); 22 % (CAR 1)

Adecuación: aceptables niveles (MIN 1) 69,5 % y (CAR 1) 72%

- Gran adecuación conseguida en base a criterios extraordinarios: (CAR 1) 44,2%; (MIN 1) 42 % (MIN 2) 16%

Conclusiones: Agotar las expectativas de optimización del tratamiento médico, aún cuando en la práctica pudiera aumentar la estancia media, que redundaría en ahorro a largo plazo. Agilizar los plazos de realización y disponibilidad de resultados de pruebas. Evitar repetición de estudios complementarios innecesarios.

LA CONEXIÓN ENTRE LA NUEVA NORMA ISO 9001: 2000 Y EL MODELO E.F.Q.M. DE EXCELENCIA: NUESTRA EXPERIENCIA

P. Segura Sádaba, C. Zulueta Guridi y M. Elósegui Mendizábal
Hospital del Bidasoa.

P-058

Palabras clave: Appropriateness evaluation protocol (AEP), enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), Trombosis venosa profunda (TVP), Tromboembolismo pulmonar (TEP).

GRADO DE ADECUACIÓN O INADECUACIÓN DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA EN EL ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA

P-060

P. Sanchez Moliní y C. Sanz Sebastian
Hospital Universitario de la Princesa.

Palabras clave: Appropriateness evaluation protocol (AEP), enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), Trombosis venosa profunda (TVP), Tromboembolismo pulmonar (TEP).

Objetivo: Conocer el grado de adecuación de los días de estancia en los pacientes ingresados por ETEV en nuestro hospital, aplicando el protocolo de evaluación AEP.

Metodología: Se valoran todos los días de estancia excepto el día del alta, en las historias de los pacientes ingresados por el diagnóstico de ETEV durante el año 2000. Estudio observacional y descriptivo con recogida de datos retrospectiva de la historia clínica. Se aplican los criterios de adecuación de dicho protocolo tanto en las hojas de diario y seguimiento médico de los enfermos, como en las hojas de medicación facilitadas por el Servicio de Farmacia, o en las hojas de seguimiento diario de enfermería.

Variables a aplicar: Grado de adecuación o de inadecuación de dichas estancias. Programa estadístico SPSS, significativo si $p < 0,05$.

Resultados:

• 126 episodios incluidos.

• Estancia media 10 días.(DE = 7). Rango de 1 a 36.

• Se valoran 1064 estancias.

1. Estancia adecuada N = 851 (80%)

2. Estancia inadecuada N = 213 (20%)

Las principales causas de inadecuación son:

• En el 50% de los casos no se presta atención a dar el alta una vez conseguido el propósito de la hospitalización, cuando ya no requiere la atención de un centro de agudos.

• 30% se encuentra pendiente de pruebas diagnósticas o interconsultas para tomar decisiones.

• 5,6% no existe ningún plan de diagnóstico y/o tratamiento.

• 4,7% falta de preparación de la familia para poder dar de alta al paciente.

Adecuación de estancias según diagnóstico:

1. TEP = 175 estancias inadecuadas (20,9%)

2. TVP = 48 estancias inadecuadas (20,6%)

No diferencias significativas

Conclusiones: Aplicando los criterios de adecuación e inadecuación de los días de estancia según el AEP, el grado de adecuación de las estancias es aproximadamente del 80%, y no se encuentran diferencias significativas entre ambos diagnósticos: TVP y TEP.

APLICACIÓN DEL AEP EN LOS INGRESOS DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA

P. Sanchez Moliné y C. Sanz Sebastian
Hospital Universitario de la Princesa.

P-061

Palabras clave: Appropriateness evaluation protocol (AEP), Enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), Trombosis venosa profunda (TVP), Tromboembolismo pulmonar (TEP).

Objetivo: Conocer el grado de adecuación de los ingresos por ETEV en nuestro hospital durante el año 2000.

Metodología: Pacientes diagnosticados de ETEV durante el año 2000. Estudio observacional y descriptivo con recogida de datos retrospectiva. Variables a considerar: Edad, sexo, servicios responsables, día de ingreso, mes del ingreso, diagnóstico (TVP) o (TEP). Programa estadístico SPSS. significativo si $p < 0,05$.

Resultados:

- 126 episodios, 64% mujeres.
- Edad media 71 años, (DE = 17). Rango de 24 a 101. El 83% era > 65 años.
- Ingreso en el 99% de los casos a través del Servicio de Urgencias.
- No diferencias significativas respecto al día de la semana.
- Distribución de ingresos por mes similar al 9%, excepto en diciembre 6%.
- 70% de los ingresos se producen en Medicina Interna, 22% en Neumología, 8% en otros Servicios.
- Por diagnóstico: TEP: 73,4%, TVP: 26,6%.

1. Ingreso adecuado 110 pacientes (87,1%)
2. Ingreso inadecuado 16 pacientes (12,9%)

Causas del ingreso inadecuado: En el 88% las pruebas podían haberse realizado de forma externa, siempre que el paciente no requiera medicación intravenosa ni ventilación asistida.

El 94% ($N = 15$) de los ingresos inadecuados correspondía a TVP, solo en un caso de TEP el ingreso fue inadecuado.

Conclusión: El grado de adecuación de los ingresos en la ETEV al aplicar los criterios ha sido elevado en el caso de TEP (99%) pero mejorable en el caso de TVP (55%), lo que podría justificar en esta última patología la posibilidad de plantear su estudio de forma ambulatoria.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN 6 MESES

C. Millan Cachinero, R. Rosendo Martínez, X. Bouillon Agrelo y X. Sánchez
Hospital do Meixoeiro.

P-062

Palabra clave: ISO, Esterilización.

Metodología: La Dirección del Hospital determinó que la Central de Esterilización del Hospital do Meixoeiro era el servicio más idóneo para implantar un sistema de gestión de la calidad. Se acordó basarse en las normas ISO 9001:2000 y la norma ISO 14937.

La central cuenta con 4 autoclaves de vapor y un esterilizador de gas plasma. Por diferentes motivos existía una premura de tiempo y se pretendía implantar el sistema en un plazo de seis meses.

Se contaba para ello con la dirección del Responsable de Calidad del Centro, con el apoyo de una consultoría externa especializada en servicios hospitalarios, y con el personal de la central, en total 17 personas.

Los principales problemas encontrados fueron la inexistencia de una cultura de la calidad en la central; la rotación del personal del servicio y los requisitos que planteaba la norma en la relación con otros servicios del hospital.

Resultados: En tan sólo seis meses se consiguió dotar a la central con un conjunto de indicadores mensuales eficaz y que permiten calibrar tanto la calidad como la eficacia de la central; con un sistema de registros funcional, e implantar una cultura de la calidad que dio lugar a la consecución de la certificación ISO.

Conclusiones: El positivo resultado de la experiencia ilustra el valor de la sinergia establecida entre Dirección del Centro, Miembros de la Central, Consultoría Especializada y Responsable de Calidad.

Nuestra experiencia permite pensar en disminuir los plazos previstos para la implantación de Sistemas de Calidad.

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ISO 9001:2000 EN TRES HOSPITALES H.12 OCTUBRE. H. PTA. HIERRO. H. DE GETAFE

M.T. Sayalero-Martín, A. Sáinz-Mozos, P. Ruiz-López, M.A. Sánchez-Serrano, V. Ramos-Rodríguez y J. Domínguez
Unidad de Calidad.

Palabra clave: Sistemas de Gestión de Calidad, Certificación ISO 9001:2000.

Objetivos: Dentro del proceso de implantación de un sistema de calidad según la norma ISO 9001:2000 y tras llevar a cabo un programa de formación se realiza un análisis de situación de las unidades participantes en el proyecto para llevar a cabo un plan sistematizado de actuación que cumpla con las exigencias de dicha norma.

Metodología: El Proyecto comienza en el último trimestre del 2001. Con la referencia de los puntos de la norma ISO9001: 2000 se ha llevado a cabo una valoración detallada mediante registro normalizado de las unidades de los tres hospitales participantes en el proyecto (Laboratorios de Bioquímica, Monitorización de Fármacos, Bancos de Sangre y Tejidos, Farmacia y Almacén). Para ello se realizaron entrevistas con los responsables de las diferentes unidades. Una vez analizada la información recogida se realizaron unas Jornadas de Puesta en Común con los tres hospitales. A este proceso ha continuado un Plan de Actuación secuencial adaptado a cada unidad y centro, que está en marcha.

Resultados: Aspectos generales a Mejorar para el cumplimiento de la Norma:

Definición de perfiles de puestos de trabajo/cualificación del personal. Control documental (normalización). Proveedores y Compras. Gestión de equipos y Mantenimiento (sistematización). Análisis de la satisfacción de los clientes. Diseño nuevos servicios o productos. Control y sistematización de calibraciones. Despliegue de Objetivos. Requisitos legales. Monitorización. Indicadores.

Aspectos a resaltar en algunas Unidades. Existencia de procedimientos normalizados de trabajo. Flujogramas. Catálogos de Pruebas. Cálculo de Unidades Relativas de Valor. Registro de incidencias. Pactos de consumo con los servicios. Sistema de tratamiento de quejas. Plan de aumento del índice de donación intrahospitalaria.

Conclusiones: 1) El sistema de entrevista y utilización de formulario normalizado ha sido de gran utilidad para detectar puntos a resaltar y áreas para cumplir la norma. 2) Se han detectado muchas oportunidades de mejora que se están abordando con un plan organizado. 3) Se están aprovechando puntos fuertes detectados en acciones de intercambio entre los centros.

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN LABORATORIOS

L. Larriba, C. Miráz, S. Jorge, C. Remón, S. Grela, M.T. Fernández y P. Farjas
Hospital Juan Canalejo.

P-064

Palabra clave: Gestión medioambiental, calidad, químicos, residuos.

Introducción: La implantación de un sistema de gestión de medioambiente contemplado en un sistema integrado de gestión apoya la tesis de la dependencia entre el riesgo de una actividad, los accidentes y los aspectos medioambientales. Al abordar la puesta en marcha del plan de gestión MA en los laboratorios del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, se identificó como aspecto medioambiental de especial importancia el manejo de las sustancias y preparados químicos, sus repercusiones sobre la salud de los trabajadores, las características que presentan y los mecanismos de gestión que requieren los residuos que generan.

Objetivo: Proporcionar a todos los trabajadores una guía de actuación.

Elaborar una *Guía de gestión de sustancias y preparados químicos* para su integración en el Plan de Calidad en los laboratorios del el Complejo Hospitalario.

Metodología: Se creó un grupo de trabajo multidisciplinar constituido por personal del Laboratorio Central, Servicio de Anatomía Patológica, Unidad de Medioambiente-Calidad, Prevención de Riesgos Laborales, Unidad de Calidad y Servicio de Medicina Preventiva, cuya misión se define en: elaborar un documento que describa los procedimientos a seguir para asegurar la seguridad y el control de los todos procesos en los que se utilizan sustancias y preparados químicos, y en establecer el procedimiento de verificación: Auditoría. Se realiza el inventario de sustancias y preparados químicos que intervienen en cada uno de los procesos, incluyendo la recopilación de la ficha técnica de seguridad de cada uno de ellos.

Resultados: Se elabora un documento de gestión de sustancias y preparados químicos en el que se contempla: inventario, gestión de compras almacenamiento, condiciones de seguridad y manipulación, Sistemas de información al usuario, etiquetado, fichas de seguridad, información en puesto de trabajo, Guía de gestión de residuos, responsabilidades documentación y registros de formación

Conclusion: La implantación de la *Guía de gestión de sustancias y preparados químicos* se considera un elemento clave para afrontar paralelamente los procesos de certificación de la calidad, de medioambiente, de seguridad y de las unidades funcionales de este Complejo Hospitalario.

MANEJO DEL PACIENTE CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

B. Ferrer Pinar, E. Sevilla Hernández, J. Alcaraz Martínez y P. Bustillo Busalacchi

P-065

Palabras clave: Traumatismo Craneoencefálico. Urgencias. Tomografía axial computerizada.

Objetivos: 1) Conocer la situación actual del manejo del paciente con TCE en el Servicio de Urgencias del Hospital Morales Meseguer. 2) Determinar aquellos datos clínicos a considerar para llevar a cabo la solicitud de un escáner. 3) Iniciar actividades para mejorar la calidad de la atención.

Material y método: Se estudiaron los casos de TCE atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital Morales Meseguer durante el mes de Noviembre del 2001. En total 112 pacientes obtenidos del Archivo de Historias Clínicas. Se analizaron datos sobre características del traumatismo, evaluación inicial, gravedad, petición de pruebas complementarias y destino del paciente. Se ha realizado una revisión de la bibliografía para fijar los criterios de calidad de la atención del paciente con traumatismo craneoencefálico. En una segunda fase se pondrán medidas correctoras para mejorar la atención. Como test estadístico se utilizó el de la Chi cuadrado, tomando como nivel de significación el 95%.

Resultados: Entre los antecedentes relacionados con el traumatismo en 7 casos (6,2 %) constaba el consumo de alcohol. 14 casos presentaban amnesia (12,5%) y heridas locales en 34 casos (30,4%). Las constantes vitales no figuran en el 80,4 % de los casos; el grado de traumatismo no constaba en el 89,3 %. Se realizó scanner en el 17 % de los pacientes; de los que el 11 % fue patológico. Al 53,3 % de los pacientes se les solicitó una radiografía simple de cráneo y ninguna fue patológica. Del total de los pacientes estudiados solo hubo un ingreso y 4 trasladados. Se ha encontrado relación significativa entre la presencia de amnesia y TAC patológico.

Conclusiones: Faltan datos clínicos importantes en la mayoría de los casos observados. Se ha encontrado relación significativa entre la presencia de amnesia y TAC patológico. Hay que iniciar actividades de mejora de la calidad asistencial.

LOS CRITERIOS DE CALIDAD EN LA AUTORIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS

A. Flores Sarrión, F.D. Almenar Roig, M.J. Borras Moliner y G. Goméz Soriano
Hospital de Sagunto.

P-066

Palabra clave: Calidad; Laboratorios clínicos; Autorización de Servicios; Criterios técnicos para autorización sanitaria.

Resumen: El avance en metodologías diagnósticas y el aumento de su demanda asistencial han hecho del laboratorio clínico un elemento imprescindible de la práctica en medicina. Por ello garantizar su calidad pasa a ser una prioridad de primer orden. Diversos modelos de certificación y acreditación han sido introducidos en nuestro país, pero el medio con el que cuenta la Administración Pública para garantizar a la población la calidad de los productos y servicios sanitarios, es reglamentar el sector. Clásicamente la reglamentación ha girado en torno a requisitos de carácter estructural y con niveles de exigencia mínimos. Sin embargo, este planteamiento parece insuficiente, por lo que se ha considerado que una forma de promover un nivel básico de calidad en todos los centros sería introduciendo criterios técnicos que, sin llegar necesariamente a la excelencia, sean suficientes para garantizar la calidad y seguridad de la asistencia prestada. Por todo ello, la Dirección General de la Agencia para la Calidad, Evaluación y Modernización de los Servicios Asistenciales (Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana) ha establecido unos criterios de autorización de los laboratorios clínicos entre los que incluye un programa de calidad basado en los criterios de la llamada "Buena Práctica de Laboratorio", generando al mismo tiempo, una estrategia de implantación y desarrollo de la citada normativa, en la que la colaboración de las Sociedades Científicas y la participación de los profesionales ha sido fundamental. Asimismo, se ha tratado de sentar las bases para facilitar a todos los centros, públicos y, especialmente, privados, modelos y formatos para la elaboración e implantación de los programas de calidad. El método y la dinámica de elaboración de la normativa, y la estrategia de su implantación son el objeto de la presente comunicación.

MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN EL ÁREA DE ELABORACIÓN DEL SERVICIO DE FARMACIA

M.T. Moreno Díaz, M.J. Gimeno Jordá, P. Acosta Robles y J. Cabeza Barrera

P-067

Palabra clave: Procedimientos, elaboración.

Objetivos: 1) Redactar un procedimiento para la elaboración de medicamentos, ajustando la nueva normativa legal y la actividad profesional a pautas procedimentales reproducibles (RD 175/2001 Consejo de ministros de 23 Febrero 2001). 2) Garantizar la calidad de las fórmulas magistrales y preparados oficiales que se elaboran en el servicio de Farmacia.

Métodos: Con el fin de ir transformando el área de elaboración de medicamentos, confeccionamos un sistema de garantía de calidad en el que se desarrollan algunos aspectos del RD antes mencionado. Todos los procedimientos presentan el mismo formato y contienen los apartados siguientes: objetivo, responsabilidad de aplicación y alcance, definiciones, descripciones, registros, control de cambios y anexos.

Se atiende al siguiente esquema: a) Procedimientos generales (procedimientos normalizados de limpieza, mantenimiento y calibración de aparatos, etc.). b) Procedimientos sobre materias primas y material de acondicionamiento. c) Procedimientos en la elaboración y control de medicamentos según la agencia europea del medicamento. d) Procedimientos normalizados de elaboración, control y registro de medicamentos elaborados.

Resultados: Los procedimientos arriba citados se plasman en la siguiente documentación; 1) Registro con todos los datos que identifican las materias primas, especificaciones y control de calidad de materias primas. 2) Material de acondicionamiento: Hoja de registro para cada producto empleado que nos permite su correcta identificación y control de stocks. 3) Formulas magistrales y preparados oficiales: modelo único de Guía de elaboración, control y registro de fórmulas magistrales.

Además la dispensación de medicamentos se acompaña de suficiente información para el paciente que garantece una correcta identificación, conservación y utilización de medicamentos (hoja informativa).

Conclusiones: Consideramos que estas normas constituyen una sólida base para garantizar la calidad de nuestras formulas magistrales y preparados oficiales de nuestros usuarios, a pesar de que el seguimiento y adaptación del Servicio de Farmacia a esta normativa supone un gran esfuerzo de recursos.

APLICACIÓN DEL QFD (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) PARA LA MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA

J. Castrodeza Sanz, E. García Puente, J.S. García de San, I. González Solana, F. Mata Fuentes y F. Piniella García
Hospital Ntra. Sra. Alarcos.

P-068

Palabras clave: QFD, Gestión, Calidad.

Objetivos: a) Analizar los requisitos marcados en el contrato de gestión. b) Establecer y priorizar las actividades más efectivas para alcanzar los objetivos del hospital, siguiendo los principios de la calidad total. c) Identificar los indicadores claves para el seguimiento del Plan de Gestión del hospital.

Metodología: Aplicamos la herramienta QFD al Hospital Santos Reyes. Esta técnica identifica los requerimientos del cliente y asegura que estén presentes en el diseño del servicio y en la fase de planificación. Identificamos los objetivos del Contrato de Gestión como requisitos del cliente. Establecemos los procesos según el modelo del Hospital de Zumáraga. Salvo los datos objetivos del hospital el análisis se realizó en grupo.

Fases: 1) Identificación y relación de Requisitos y Procesos. 2) Análisis de la situación competitiva del hospital con la media de su grupo. 3) Análisis de la situación del hospital relacionado con el comportamiento de sus procesos. 4) *Evaluación competitiva:* se definió lo que era necesario promocionar, oportunidad de mejora y lo que había que mejorar imprescindiblemente. 1) Desarrollo de matriz de planificación. 2) Para requisitos del cliente imprescindibles de mejorar, se analizaron los procesos con alta correlación. 3) Aquellos con dificultad de actuación baja, se definieron directamente acciones de mejora. 4) Análisis de correlaciones para procesos con alta dificultad de actuación. 5) Prioridad acciones de mejora.

Resultados: Áreas priorizadas: 1) Proceso de derivación primaria especializada. 2) Plan de comunicación intrahospitalaria y con primaria. 3) Gestión por procesos. *Acciones a priorizar:* 1) Rediseñar procesos de derivación primaria-especializada. 2) Realizar plan de comunicación intrahospitalaria y con primaria. 3) Implantar gestión por procesos. 4) Crear consultas de alta resolución. 5) Implantar unidad en farmacia. 6) Crear programa de cuidados paliativos. 7) Implantar sistema analítico de urgencias. 8) Incluir en el pacto de incentivos el cumplimiento de protocolos. 9) Establecer criterios de indicación de pruebas diagnósticas. 10) Realizar estudios de adecuación de estancias. 11) Pactos de protocolos primaria-especializada en comisión paritaria. *Áreas a promocionar:* Gestión del área quirúrgica

Conclusiones: La herramienta QFD, puede servir para planificar y definir las rutas más idóneas para alcanzar los objetivos del Contrato de Gestión, definido como el compromiso que contraen los hospitales con el financiador/planificador.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD IMPLANTADO EN LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA TRAS UN AÑO DE CERTIFICACIÓN

J.L. Jiménez Molina, I. Pérez Pérez, M. Albaracín Marín -Blázquez, A. Tomás Lizcano y C. Miranda López

P-069

Palabra clave: Sistema de calidad, ISO 9002, revisión.

Objetivo: La dirección revisa el Sistema de Calidad implantado en el Hospital según las Normas ISO 9002, TRAS UN AÑO DE OBTENCIÓN DEL Certificado de empresa registrada por AENOR, con el fin de comprobar que el sistema es adecuado para el fin que se pretende, que es conseguir la mejora de la calidad de los procesos y por lo tanto de los servicios prestados.

Metodología: Se revisan los siguientes puntos:

1. Informes de Auditorías
2. No Conformidades
3. Acciones correctoras y preventivas
4. Reclamaciones
5. Grado de cumplimiento de objetivos
6. Conclusiones

Resultados: De las auditorías realizadas en el año 2001, a día de la revisión, quedaban dos No Conformidades pendientes de cerrar. De las 29 No Conformidades generadas en la actividad del centro a lo largo del año, se derivaron 18 acciones correctoras, de las cuales 16 fueron satisfactorias y 2 no satisfactorias. De las reclamaciones recibidas de pacientes y familiares, todas tuvieron respuesta por parte de la dirección del Centro y ninguna ha dado lugar a una acción correctora ó preventiva. El grado de cumplimiento de los objetivos pactados para ese año fue evaluado en todos los servicios, de manera, que los no cumplidos, se contemplarán para el próximo año ó serán reconsiderados por la dirección.

Conclusiones: El Sistema de Calidad implantado es útil para conseguir la mejora de la Calidad asistencial, siendo necesaria una mayor difusión entre el personal del Hospital para poder emplear con mayor eficacia todas las herramientas que nos proporciona el sistema.

P-071**ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES ORIENTACIONES INTERNACIONALES EN EL ASEGURAMIENTO Y LA ACREDITACIÓN SANITARIA.**

J. Vitaller Burillo, J.J. Mira Solves, J.M. Aranaz Andrés, J.A. Buil Aína, V. Pérez Jover y M.T. Gea Velazquez

Palabra clave: Acreditación, Aseguramiento, Calidad.

Objetivo: Revisión y análisis de los sistemas de acreditación sanitaria más representativos que se están aplicando a nivel mundial.

Metodología: Búsqueda bibliográfica y análisis de las publicaciones que aportan información de los sistemas de acreditación a nivel internacional y consulta con expertos.

Resultados: 1) Las estructuras susceptibles de Acreditación son diferentes entre países. Para EE.UU. el objetivo es la acreditación de toda la estructura de cuidados de salud, en Canadá han ido ampliando los servicios a acreditar. En Francia han sido los establecimientos sanitarios y redes de cuidados; prioritario es el hospital. 2) En los casos del Reino Unido, EE.UU., Canadá se adhieren los centros **voluntariamente**. En Canadá, se exige para autorizar al hospital a impartir docencia. Algunas regiones o países como Francia la hacen obligatoria y en el caso de Cataluña se exige para tener concierto de servicios con la administración pública. 3) El **procedimiento**, en EE.UU., Canadá, Australia y el Reino Unido, existe un organismo independiente que elabora las normas y realiza el proceso. En Australia recibe ayudas del gobierno y de las fundaciones. Los **organismos** que marcan los objetivos, en los Estados Unidos (JCAHO), es un órgano independiente con profesionales sanitarios; en Francia se dispone de un organismo público administrativo, con expertos profesionales (ANAES). Canadá dispone de un organismo independiente con representantes de usuarios. 4) Las **normas** siguen unas guías de evaluación previamente diseñadas y homogéneas para todos, es decir, un **Manual** que normalmente se va actualizando. La base suele estar en la experiencia adquirida por la JCAHO y la CCASS (Canadá), en Reino Unido que las toma del modelo australiano. 5) **Contenido del Manual:** King's Fund articula sus capítulos en torno a los derechos de los pacientes y sus necesidades. ANAES hace referencia a buenas prácticas clínicas, consultas y referencias médicas. La JCAHO habla de estándares centrados en el paciente y estándares de gestión de la organización sanitaria. 6) La composición del **equipo auditor** suele ser multidisciplinar, integrado por expertos en gestión sanitaria y/o clínica así como en cuidados (enfermería) y en servicios generales, contabilidad, gestores, etc. 7) El **impacto** en el hospital produce la dinamización de equipos, la mentalización pensando con criterios de calidad, la mejora del servicio y del clima laboral, y efectos más concretos en programas definidos. En el contexto internacional identificamos tres modelos explícitos, estructurados, validados, reconocidos, con amplia experiencia en su aplicación práctica y con prestigio y vigencia a nivel internacional: JCAHO que acredita (EE.UU.), ISO que certifica (Reino Unido) y EFQM que autoevalúa (Europa). Los sistemas de acreditación están evolucionando para hacer accesibles al público los resultados sobre la calidad de la asistencia sanitaria prestada, incluyendo indicadores clínicos para una mayor implicación de los profesionales en calidad e intentar buscar formas satisfactorias de comparación entre hospitales.

IMPLANTACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA GUÍA DE EVALUACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS GANT

M. Subirana Casacuberta, I. Gich Saladic, J. Calaf Alsina, N. Lluís Ramírez, X. Bonfill Cosp, Comisión de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

P-070

Palabra clave: Nuevas tecnologías, gestión de recursos, valoración de la calidad.

Objetivos: La incorporación de nuevas tecnologías implica un proceso complejo de toma de decisiones que se ve influenciado por diversos factores. Con la finalidad de valorar de forma objetiva las solicitudes de adquisición o utilización de tecnología no disponible en el hospital, se implanta esta Guía que facilita y acelera la respuesta a los servicios solicitantes, mejorando así la calidad asistencial que se dispensa a los pacientes.

Metodología: Desde la Comisión de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos del Programa para la Promoción y Evaluación de la Calidad Asistencial (ProAQUA) del Hospital, se valoró y adaptó a las necesidades de nuestro centro la Guía para la toma de decisiones en la incorporación y adquisición de Nuevas Tecnologías a los Centros Sanitarios de Andalucía (GANT) de la Consejería de Salud, dando lugar a un documento de uso interno denominado Guía de Evaluación de Noves Tecnologies (GANT) y a una hoja de solicitud de evaluación.

Círculo de solicitud de evaluación: El servicio solicitante rellena la hoja de solicitud de evaluación y la remite a la secretaría del ProAQUA. Posteriormente, la Comisión evalúa la solicitud y envía la valoración a la Dirección Médica, la cual aprobará o no la viabilidad de la solicitud. Finalmente, la Dirección Médica informa al Servicio solicitante y a la Comisión de la decisión tomada.

Resultados: Desde octubre del 2001 hasta mayo del 2002, la Comisión de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos ha valorado 9 solicitudes para la adquisición de nuevas tecnologías, de diferentes servicios del hospital utilizando la Guía GANT: Tilt-Test, PET, Neuronavegador, Cápsula endoscópica, Marcapasos biventricular, Sistema CARTO, Ecoendoscopio lineal o sectorial, Cirugía aórtica mínimamente invasiva video-asistida y PICCO. La Comisión ha emitido informes favorables en 5 casos, en 3 ha aconsejado otras fuentes de financiación o un tiempo de espera y 1 está pendiente de evaluación definitiva.

Conclusiones: La implantación de la GANT garantiza una valoración más objetiva de las solicitudes de adquisición o de utilización de nuevas tecnologías y facilita a la Dirección la toma de decisiones. El análisis de las solicitudes permitirá conocer el volumen de la demanda de nuevas tecnologías y, por tanto, planificar mejor la utilización de los recursos disponibles.

ANÁLISIS DAFO DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN SANITARIA EN ESPAÑA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE EXPERTOS DEL SECTOR.

L. Aguirre Alberdi, O. Moracho del Río, J.J. Mira Solves, S. Lorenzo, M.D. Blanco Pompeyo y M.J. Arceno Ciganda

P-072

Palabra clave: Calidad. Encuestas. Proveedores. Servicios Generales. Servicios Sanitarios.

Objetivo: Explorar las opiniones que sobre la acreditación sanitaria tienen los directivos de los centros sanitarios españoles.

Metodología: Realizamos una encuesta de opinión, a través del correo electrónico, dirigida a directivos de Asistencia Especializada y Atención Primaria. La población quedó conformada por 195 directivos de hospital y 50 directivos de Atención Primaria. El cuestionario, semiestructurado para autocomplimentación, fue elaborado ad hoc. Consta de una serie de preguntas de filiación, otra parte con una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), y un espacio abierto para sugerencias.

Resultados: La población a que en principio se tuvo acceso fue de 245 sujetos. La tasa de respuesta alcanzada fue de 23,7% para el conjunto de los sujetos a estudio, y de 28,2% para el grupo de directivos de hospital, con una representación desigual por organizaciones. Entre las **debilidades** de la acreditación los directivos sanitarios encuestados destacaron la rigidez del sistema; los costes económicos del proceso; la escasa cultura de calidad de nuestro sistema sanitario; la poca implicación de los propios directivos; la posible delegación de responsabilidades en empresas auditadoras externas y la heterogeneidad de la actividad sanitaria. Entre las **amenazas** destacaron la pérdida de prestigio o de cuotas "de mercado" si no se logra la acreditación; la desmotivación ante el incumplimiento de objetivos; la pérdida de confianza de la sociedad si los resultados fueran adversos al centro. Se interrogan sobre ¿qué hacer con el servicio, hospital o centro de salud que no consiga la acreditación? Entre las **fortalezas** destacan el efecto positivo en profesionales y pacientes; el reconocimiento público de capacidades; la mejora de la capacidad de elección consciente por parte del ciudadano al tener la posibilidad real de conocer la capacidad de los centros para elegirlos; la posibilidad de comparación intercentros y realización de *benchmarking*. Respecto a las **oportunidades** de la acreditación destacaron el interés de organizaciones privadas por introducirse en el sector sanitario con perspectivas de negocio; la posibilidad de generar un modelo único que sirva de referencia; la mejor separación de funciones entre financiador y proveedor; el avance hacia la homologación europea.

Conclusión: Sería útil, según el grupo de expertos, iniciar la acreditación de forma piloto en un número representativo de centros, y con implicación de los propios directivos para, posteriormente, sacar experiencias y personal formado para equipos evaluadores y para motivar a los propios profesionales de los centros, estimulando la formación en metodología de la calidad. La posibilidad de generar un modelo único de acreditación que sirva de referencia, con la mirada puesta en el marco europeo; la posibilidad de conocer los centros por parte de los ciudadanos y proveer de un mayor nivel de cultura de calidad a nuestro sistema sanitario.

¿OFREZCO UN SERVICIO DE CALIDAD?: EL COLOR DEL CRYSTAL CON QUE SE MIRA

J.J. Lopez-Picazo Ferrer, F. Agulló Roca, M. Villaescusa Pedemonte y J.M. Cerezo Corbalán
GAP Murcia.

Palabras clave: Calidad, Atención Primaria.

Objetivo: La calidad de los servicios que ofrecemos se objetiva comprobando el cumplimiento de los criterios de calidad que los conforman. Pretendemos conocer la influencia que diferentes métodos de medición pueden tener sobre la estimación del nivel de calidad de estos servicios.

Metodología: Se estima la calidad del servicio de atención a diabéticos en una Gerencia de Atención Primaria mediante evaluación retrospectiva, de iniciativa externa y obtención cruzada de datos. Para ello utilizamos una muestra aleatoria, estratificada por centro, de historias clínicas de diabéticos (HC).

Empleamos como criterios de calidad las 10 Normas Técnicas (NTM) del servicio de atención a diabéticos de INSALUD (que engloban 31 subcriterios, 1-7 subcriterios/NTM):

Aplicamos 3 métodos para estimar el cumplimiento de estos criterios: 1. Ponderado: Según instrucciones oficiales, el cumplimiento de cada NTM se obtiene ponderando el cumplimiento de los subcriterios que la conforman. 2. Globalizado: Consideramos cumplida la NTM sólo si se cumplen todos sus subcriterios. 3. Independiente: Analizamos independientemente el cumplimiento de los 31 subcriterios básicos. Finalmente, comparamos los resultados obtenidos mediante análisis numérico (z -2 colas-, regresión) y gráfico (radar).

Resultados: Evaluamos 618 HC, resultando:

Método ponderado vs Globalizado (%± IC95% ponderado/globalizado):

1. Diagnóstico: $91,10 \pm 0,92$; 2. Antecedentes: $69,74 \pm 1,49$; 44,80 ± 1,61; 3. Historia diabetes: $78,72 \pm 1,33$; 62,70 ± 1,57; 4. Complicaciones: $29,99 \pm 1,49$; 20,20 ± 1,30; 5. Exploración: $49,97 \pm 1,62$; 21,50 ± 1,33; 6. Analítica: $51,48 \pm 1,62$; 30,00 ± 1,49; 7. Funduscopia: $31,92 \pm 1,51$; 31,92 ± 1,51; 8. ECG: $62,14 \pm 1,57$; 62,14 ± 1,57; 9. Controles: $57,07 \pm 1,61$; 11,60 ± 1,04; 10. Eps: $70,13 \pm 1,49$; 44,20 ± 1,61.

Hay diferencias significativas en la estimación del cumplimiento de todas las NTM que cuentan con más de un subcriterio. La diferencia obtenida entre evaluaciones depende del número de subcriterios que conforman cada NTM ($r = 0,824$, $p < 0,01$).

Evaluación independiente de subcriterios: Obtenemos 31 estimaciones, que comparamos con los otros métodos mediante gráficos de radar.

Conclusiones: El método de estimación del cumplimiento de los criterios determina el nivel de calidad global del servicio obtenido. Usar criterios ponderados favorece la aparición de "espejismos de calidad" (sobreestimaciones), mayores cuanto mayor es el número de ítems que se ponderan simultáneamente. El análisis detallado de subcriterios permite acotar dónde se producen los defectos y actuar en consecuencia, pero exige la comprobación de excesivos ítems y quizás deba reservarse para analizar secundariamente causas de no-calidad. Para el análisis de calidad de un servicio de salud es preferible el uso de pocos criterios, válidos, fiables, y univalentes.

P-073

FASE INICIAL DE UN PLAN DE CALIDAD EN UNA ONG SANITARIA

J. Fernández Martín, L. Chamorro Ramos, L. Martín Hernando, R. Fernández y J. Coll Verd
Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca.

Palabras clave: Plan de Calidad, Organización No Gubernamental sanitaria.

Objeto: Médicos del Mundo (MdM) es una ONG internacional, de acción humanitaria en el sector salud, independiente y de carácter asociativo. Su misión consiste en asistir en el ámbito de la salud a las poblaciones más vulnerables en situaciones de crisis humanitarias y de pobreza. Los objetivos del Plan de Calidad de MdM son: incorporar la cultura de la calidad y la mejora continua, mejorar la satisfacción del cliente interno y externo, mejorar la eficiencia de los procesos y aumentar la legitimidad y el reconocimiento de la organización por parte de la sociedad.

Metodología: Análisis de la documentación de la organización, métodos cualitativos (dinámica de grupos, entrevistas a informadores clave, reuniones departamentales, diagnósticos participativos), métodos cuantitativos (encuestas).

Resultados:

	Puntos débiles	Puntos fuertes
Compromiso y Liderazgo de la Junta Directiva	Falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones	Adaptación de la Junta a la nueva realidad
Política y estrategia	Excesiva compartmentalización de los Departamentos	Misión: principios claros
Personal	Marcada desmotivación personal en amplios sectores del operativo	Creación de voluntario responsable de proyecto
Formación	Necesidad de un programa de formación	
Comunicación	Importante problema de comunicación formal interna	Relación voluntario–asalariado en cuarto mundo
Alianzas y Recursos	Incertidumbre financiera	ONG de referencia para los medios de comunicación
Procesos	Práctica inexistencia de diseño de los procesos de la organización	
Resultados	Falta de sostenibilidad de los proyectos de desarrollo	Reconocimiento de las ONGs por parte de la sociedad

Conclusiones: Las etapas siguientes del Plan de Calidad serán: formación en herramientas de calidad, creación de equipos de mejora, análisis de causas y búsqueda de soluciones, implantación y monitorización de los planes de mejora formulados, reevaluación y análisis de resultados con la consiguiente redisección de actividades. El desarrollo de un Plan de Calidad en una ONG es una experiencia novedosa y de interés para otras ONGs y organizaciones sanitarias que afrontan problemas similares.

P-075

DISEÑO DE UN NUEVO DISPOSITIVO DE EMERGENCIAS EN EL SUMMA-061: VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA (VIR)

C. Jiménez Domínguez, M. Garrido Martín, P. Carrasco Garijo, C. Buey Mayoral, A. Pérez Hernando y M.A. Martín Alonso

Palabras clave: Diseño de Servicios. Emergencia extrahospitalaria. VIR.

Objetivo: Presentar diseño del VIR del SUMMA-061.

Metodología y resultados: Descripción del procedimiento POC-SER/01 (Diseño de Servicios) del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el diseño del VIR. 1. Datos de partida del diseño: 1.1. Necesidad dispositivo VIR. Variables básicas: existencia patología límite entre Unidad Móvil Emergencias (UME) y Equipo Atención Primaria; necesidad decisión estratificada en la regulación médica y mejora de tiempos de respuesta en una ciudad del tráfico, estructura y dimensiones de Madrid. 1.2. Recursos humanos y materiales. Responsable del Área Asistencial (RAA) elabora documento estableciendo dotación Recursos Humanos (médico y enfermero/a de emergencias y conductor) y recursos materiales (vehículo con equipamiento UME, excepto capacidad de transporte) que garantizan prestación del servicio. 1.3. Valoración científico-técnica y económico-financiera. Documentos Área Asistencial y de Gestión revisados en Comité de Dirección. 1.4. La Directora Gerente (DG) define y registra requisitos de partida mínimos, aprobada realización del diseño, y constituye un grupo de trabajo para fijar especificaciones y características y planificar etapas del diseño.

2. Planificación del diseño. DG, responsable de planificación, establece principales etapas, cronograma, recursos materiales, humanos y documentales y servicios piloto necesarios para la verificación y validación del VIR, asignando responsables de etapa.

3. Especificaciones finales del diseño. DG aprueba requisitos y especificaciones finales.

4. Revisión del diseño. DG realiza revisión de etapas planificadas, quedando registradas (firma del responsable de su realización).

5. Verificación del diseño. RAA realiza verificaciones planificadas y comprueba cumplimiento de especificaciones.

6. Validación del diseño. Servicio verificado y validado por RAA, comprobando que satisface necesidades del diseño, sobre un servicio piloto realizado en julio y agosto 2001. DG fue informada para su puesta en marcha.

7. Modificaciones al diseño. Si apareciese necesidad de modificar diseño y documentación descriptiva del mismo, se procedería como si fuese un nuevo diseño.

Conclusiones: 1) Nuestro SGC aportó método de trabajo adecuado para realización y control del diseño del VIR. 2) El nuevo servicio implantado reúne propiedades y características que satisfacen las necesidades expresadas. 3) SGC permitiría modificación del diseño actual si se constatase necesidad de ello como resultado del constante seguimiento y monitorización.

INDICADORES DE CALIDAD DE LA INFECCIÓN URINARIA NOSOCOMIAL EN PACIENTES PORTADORES DE CATETERISMO VESICAL

M. Calsina Alarcón, M. Vaqué Franco, M. Sierra Soler y J. Martínez Montauti

Palabras clave: Infección nosocomial, Cateterismo vesical, Tracto urinario.

Introducción: Las infecciones urinarias son una de las principales causas de infección nosocomial hospitalaria, estando directamente relacionadas con el cateterismo vesical. Su elevado coste y morbilidad, junto a la limitada comparabilidad de los estudios publicados, obligan a buscar indicadores más precisos para conocer el alcance real de estas infecciones. La densidad de infección podría ser uno de estos indicadores.

Objetivos: Determinar la incidencia y la densidad de la infección urinaria nosocomial en pacientes adultos portadores de catéter vesical permanente.

Materia y métodos: Estudio prospectivo. Criterios de inclusión: edad > 15 años, sondaje vesical realizado durante el ingreso hospitalario, duración del sondaje un mínimo de 24 horas, circuito cerrado, consentimiento informado. Criterios de exclusión: necesidad de realizar lavados vesicales, sondaje previo al ingreso, negativa a entrar en el estudio. Inclusión de pacientes tres semanas. Seguimiento de los pacientes durante 7 días. Criterios de infección urinaria: CDC de Atlanta (1992).

Resultados: Se incluyeron 95 pacientes (36,8% hombres y 63,6% mujeres). Edad media de $68,1 \pm 15,1$ años. Se excluyeron 40 pacientes por pérdida durante el seguimiento (11 éxitus y 29 alta hospitalaria). Grupo estudio definitivo constituido por 55 pacientes de $72,3 \pm 11,4$ años (36,4% hombres y 63,6% mujeres). La indicación del cateterismo fue en un 54,5% para realizar un control hemodinámico y en un 50,9% como consecuencia de una intervención quirúrgica. La duración media del cateterismo fue de $7,5 \pm 8,1$ días. Se realizó cambio del catéter vesical en 4 pacientes (7,3%). Cuatro pacientes presentaron una infección del tracto urinario. En total los pacientes fueron portadores del cateterismo durante 414 días. La tasa de incidencia de infección del tracto urinario fue del 7,3% y la densidad de incidencia fue del 9,7 por mil días de sondaje.

Conclusiones: La densidad de infección, al relacionarnos las tasas de infección con los días de sondaje, nos permite conocer de forma más precisa las cifras de infección nosocomial en estos pacientes.

PÓSTER IV

Aprendiendo de los errores: aspectos evaluados, mejorados, etc., aspectos relacionados con la no calidad

Sala Navarra
Miércoles 9

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL DE UN HOSPITAL TERCIARIO

J. Vidán Alli, I. Lanzeta Vicente, E. Martínez Ochoa, J. Chamorro Camazón, M.J. Espatolero Esparza y P. Artajo Hualde
Hospital Virgen del Camino, M. Preventiva y Gestión.

Palabras clave: Infección Nosomial, Vigilancia.

Introducción: El principal objetivo de la vigilancia de las infecciones nosocomiales es disminuir las tasas de infección nosocomial. Existen diversas técnicas de vigilancia, y el que se utilice una u otra depende fundamentalmente de los recursos humanos, económicos y de la estructura física del hospital.

Objetivos: Evaluar las infecciones nosocomiales no detectadas mediante el sistema de vigilancia basado en el laboratorio de microbiología. Valorar la importancia de otros sistemas de vigilancia.

Metodología: Se comparan dos técnicas diferentes de vigilancia de infección nosocomial: la propia del Servicio de Medicina Preventiva y Gestión de Calidad Hospitalarias (activa, prospectiva y retrospectiva) con la técnica basada en cultivos microbiológicos. Se describen las diferencias encontradas entre los dos sistemas para las distintas localizaciones de infección y servicios hospitalarios.

Resultados: Sobre un total de 711 infecciones nosocomiales diagnosticadas en el año 2001 en un 24,05% (171) no se solicita cultivo. Dentro de éstas las localizaciones más afectadas son: respiratoria; tejidos blandos, piel y mucosas; y sitio quirúrgico. En las respiratorias, el porcentaje de cultivos no realizados es significativamente mayor en la infección de vías altas. En las de tejidos blandos, piel y mucosas, el porcentaje de cultivos no realizados es significativamente mayor en cavidad oral. En las de sitio quirúrgico no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre infección superficial, profunda o de órgano-espacio. El mayor porcentaje de cultivos no realizados por servicio lo encontramos de mayor a menor en Obstetricia, Cirugía Pediátrica, Neumología, Digestivo y Cirugía (sin tener en cuenta los servicios con poco volumen de infección nosocomial: Cirugía Maxilofacial y Traumatología Infantil).

Conclusiones: La vigilancia basada en el laboratorio es rápida, sencilla, eficiente, y es muy válida para infecciones en las que el diagnóstico es fundamentalmente microbiológico (infecciones urinarias y bacteriemias), pero no para infecciones en las que el diagnóstico es fundamentalmente clínico o clínico-radiológico (como las neumonías y las infecciones de sitio quirúrgico). Si el hospital no contara con el sistema de vigilancia activo actual, un 24,05% de las infecciones nosocomiales no se habrían detectado.

P-077
ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE MANEJO DE UN BROTE DE ACINETOBACTER EN UCI

A. Criado Fernández, D. Cobo Montoro, M.C. Melero Ramos, J.I. Castillo Lorente, A.M. Soria Albacete, J.M. Martínez Jiménez e Y. Capel Bonachera
Hospital De Poniente, Servicio Cuidados Críticos.

Palabra clave: Protocolo, adhesión a protocolos.

Introducción: Mediante el programa de vigilancia epidemiológica que llevamos a cabo en la UCI del hospital de Poniente detectamos en Septiembre del 2001 un caso centinela de Acinetobacter Bahumannii Complex. Debido a la dificultad para superar brotes de acinetobacter en UCIs según la bibliografía consultada, y la repercusión sobre los distintos servicios del hospital, se constituyeron un equipo de mejora interdisciplinario, que proponía líneas de actuación, y un círculo de calidad, formado mayoritariamente por Auxiliares de Enfermería de la unidad de UCI, que difundía y evaluaba la adhesión a las medidas propuestas o la dificultad para llevarlas a cabo.

Objetivos: Valorar la adhesión a las medidas de contención de brote (protocolo de acinetobacter) del personal de UCI.

Método: Estudio observacional descriptivo realizado entre 22 de noviembre del 2001 al 22 de enero del 2002. Tras definir 21 criterios de calidad de seguimiento al protocolo, considerados puntos clave de los distintos aspectos (calidad de aislamiento, screening de portadores, limpieza y lavado de manos), se procedió a realizar evaluaciones sistemáticas en un periodo de tiempo determinado (30 minutos) o bien tras algún acontecimiento determinado (adecuación de una habitación tras el alta de un paciente, realización de alguna técnica aséptica). En el citado periodo se realizaron 44 valoraciones.

Resultados: La adhesión de las 4 líneas principales del protocolo fue:

- Calidad de aislamiento: 97,76%.
- Screening de portadores: 91,65%.
- Limpieza: 66,05%.
- Lavado de Manos: 74,25%

Conclusiones: La adhesión al protocolo fue buena en líneas generales. La creación de un círculo de calidad con el personal de la misma unidad garantiza la difusión y mejora el cumplimiento de las medidas propuestas para el control del brote. Facilita la coordinación con elementos relacionados con la unidad (familiares de pacientes ingresados y personal de limpieza).

INDICADORES Y VIGILANCIA DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN UN HOSPITAL COMARCAL

C. Adell Aparicio, J. Peñarrocha Nebot, C. Bel Panisello, C. Gombau Baldrich, C. Vinuesa Vilella y J.M. Puig Vela
Hospital Comarcal de Vinaros.

P-080

Palabra clave: Infección Nosocomial, Vigilancia Epidemiológica, Indicadores, Hospital de tamaño pequeño.

Objetivos: Las tasas de Infección Nosocomial (IN) se pueden utilizar como indicador de calidad asistencial para comparar hospitales o para realizar el seguimiento de un hospital en el tiempo. Los estudios de incidencia son más eficaces que los estudios de prevalencia, porque permiten monitorizar mejor el proceso y son más sensibles. El objetivo del presente trabajo es presentar los indicadores de infección nosocomial y evaluar el sistema de vigilancia implantado en un Hospital de pequeño tamaño después de dos años de funcionamiento (2000-2001).

Metodología: Personal de enfermería entrenado (con criterios definidos) ha realizado la vigilancia diaria en planta, con revisión después del alta. Fuente de información: historia clínica, observación directa y servicio de microbiología. Se han utilizado como medida de frecuencia de la IN la incidencia acumulada y la densidad de incidencia (esta última elimina las distorsiones ocasionadas por las diferencias entre la estancia media). Se han utilizado indicadores mensuales según servicios y según localización e indicadores anuales para observar tendencias.

Resultados: La Incidencia Acumulada (IA) de IN anual ha sido de 2,88% en el año 2000 y de 1,95% en el 2001. La Densidad de Incidencia (DI) por cada 1000 enfermos ha evolucionado de 6,72 a 5,59 en los años 2000-01 respectivamente. La IN más frecuente en el año 2000 ha sido en igual proporción las postquirúrgicas y las respiratorias, siendo en el año 2001 las I. Urinarias las que ocupan el primer lugar. Entre los servicios UCI es el de mayor incidencia (6,48%), y la DI/1000 de la UCI varía de 22,40 a 26,83 en los dos años. Todos los resultados se han incluido dentro de un cuadro de mandos como indicadores de calidad, comparándose entre servicios.

Conclusiones: Las tasas de IN de nuestro Hospital están por debajo de los estándares (otros hospitales). La implantación de un sistema de vigilancia y la difusión de información ha contribuido a reducir las tasas de infección nosocomial global. El proceso de vigilancia diario es muy sensible para detectar la infección y asumible en los hospitales pequeños.

TASA DE REINGRESOS GLOBAL Y POR INFECCIÓN EN ÁREAS QUIRÚRGICAS EN UN HOSPITAL COMARCAL

L. Ballesteros García y A. Moro Hidalgo
Unidad de M. Preventiva y Unidad de Documentación Clínica del Hospital Alto Guadalquivir.

P-081

Palabra clave: Reingresos, reingresos por infección nosocomial, procesos médicos, procesos quirúrgicos.

Objetivos: 1) Describir la tasa de reingresos global y por especialidad en nuestro hospital. 2) Conocer la tasa de reingresos por CMBD que corresponde a los servicios quirúrgicos y compararla con la tasa de reingresos debida a infección nosocomial.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se han estudiado los episodios de alta, a partir del CMBDH para el 1º objetivo desde el 1 enero del 2000 hasta el 31 de marzo del 2002, analizándose un total de 10.527 episodios de alta. El reingreso ha sido definido como todo ingreso con idéntico diagnóstico principal en los 30 días siguientes al alta. Para el 2º objetivo se han comparado los episodios de reingresos procedentes del CMBD de las especialidades quirúrgicas con aquellos episodios que han reingresado y cuya causa ha sido la infección nosocomial.

Resultados: La tasa global de reingresos a los 30 días ha sido de 4,4% situándose en 4,35% en el caso de los urgentes siendo significativamente superior que en los programados. La proporción de reingresos en el sexo masculino fue de 4,8% y en el sexo femenino 3,4% ($p<0,000$). Con relación a los meses del año aparece febrero con la proporción de reingresos más alta, 3,3%, esta tasa se eleva a costa de los procesos médicos siendo de 5,7% frente al 2,0% del resto ($p=0,03$). Al comparar las tasas de reingreso entre los procesos médicos y los procesos quirúrgicos, traumatológicos y de Cuidados Críticos se observan diferencias significativas en todas las comparaciones a favor de los procesos médicos. Las especialidades que presenta mayor porcentaje de reingresos son digestivo, neurología, cardiología, M. Interna, Cirugía general y Ginecología. Las tasas de reingresos según diagnóstico principal más relevantes son la enfermedad hepática y cirrosis crónica, la epilepsia, otras complicaciones del embarazo, la insuficiencia cardíaca, la bronquitis crónica y los trastornos del metabolismo hidroelectrolítico. La tasa de reingreso por infección del periodo jun-2001 hasta 31 de marzo de 2002, ha sido para Cirugía 4,8%, 2,4% para Traumatología y 2% para Urología. En el caso de Cirugía y Urología no existe correlación entre los episodios de reingreso a través del CMBD y los episodios de reingreso por infección nosocomial. En Traumatología el 40% de los episodios de reingreso extrafósiles por CMBD coincidieron con los episodios de reingreso por infección.

Conclusiones: Los reingresos hospitalarios pueden ser un indicador indirecto útil de la calidad asistencial, sin embargo con la definición utilizada en este estudio habría que establecer diferencias entre los procesos de tipo médico y de tipo quirúrgico. Destaca que los episodios de reingreso de las especialidades quirúrgicas por infección nosocomial no aparecen en los seleccionados por el criterio anteriormente expuesto en el caso de Cirugía General y Urología.

CONTROL DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE UN HOSPITAL COMARCAL

E. Tarazona, C. Adell Aparicio, J. Peñarrocha Nebot, C. Bel Panisello, C. Gombau Baldrich y A. Gómez
Hospital Comarcal de Vinaros.

Palabra clave: Infección Nosocomial, Programa de Vigilancia, Unidad Cuidados Intensivos. Política de antibióticos.

Objetos: La transcendencia de las infecciones nosocomiales (IN) se puede abordar desde la vertiente sanitaria, social-humana, económica y legal. El control de la IN en los servicios de Medicina Intensiva tiene una importancia extraordinaria, ya que por sí sola representa más de un 20% del conjunto de la IN de un hospital. El objetivo de este estudio es evaluar el programa de vigilancia y describir la evolución de la infección nosocomial en la UCI de un hospital de pequeño tamaño.

Metodología: Se trata de un estudio prospectivo descriptivo y analítico de todos los pacientes ingresados desde la puesta en marcha de la UCI (1997-2001). Se basa en un sistema de vigilancia diario y por objetivos. Se complementa con el estudio del uso antibiótico y las resistencias antibióticas en esta Unidad.

Resultados: La incidencia acumulada de IN en el último año fue de un 26%. En el periodo estudiado, la localización más frecuente fue la respiratoria asociada a ventilación (46%), y el germe, la *Pseudomonas aeruginosa*. La segunda en frecuencia ha sido la infección urinaria asociado a sondaje (22%), y *Escherichia coli* como principal microorganismo aislado. El 71,46% de los pacientes recibieron tratamiento antibiótico y el 10% se tuvo que cambiar por antibiograma. La evolución de las incidencias varían según el tipo de UCI y estos resultados se muestran en la tabla.

Pacientes con al menos una infección nosocomial

Patología de base	1997	1998	1999	2000	2001
Coronaria	1,56	4,92	1,72	2,53	1,11
Médica	1,22	9,86	10,00	4,17	9,30
Traumatológica	14,29	33,33	0,00	30,00	14,29
Quirúrgica	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Conclusiones: Además de la frecuencia, estas infecciones tienen gran transcendencia clínica e incrementan la mortalidad. Estos resultados motivaron a revisar las medidas de prevención, como el lavado de manos antes y después de cada contacto con un paciente y la formación del personal; así como la necesidad de implantar una política antibiótica. Resulta evidente que el control de la infección hospitalaria en los Servicios de UCI debe ser un objetivo prioritario en todos los hospitales.

P-082**EVOLUCIÓN DE LA INFECCIÓN QUIRÚRGICA DESPUÉS DE 2 AÑOS DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EN UN HOSPITAL DE PEQUEÑO TAMAÑO**

C. Adell Aparicio, E. Marcote Valdivieso, J. Peñarrocha Nebot, C. Gombau Baldrich, C. Bel Panisello y J. Nebot Cabedo
Hospital Comarcal de Vinaros.

Palabra clave: Infección Nosocomial, Programa de Vigilancia, área quirúrgica, Prevención.

Objetivos: La Infección de Herida Quirúrgica (IHQ) constituye la causa más frecuente de infección en los servicios quirúrgicos. Se produce un aumento de incidencia en función del grado de contaminación de la cirugía. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el programa de vigilancia epidemiológica en el Servicio de Cirugía de un hospital comarcal después de dos años de evolución.

Metodología: La vigilancia ha sido diaria por revisión historias clínicas y observación directa. Para mejorar la vigilancia, ya que en los 28 días tras la intervención emergen el 98% de las infecciones, el servicio de microbiología nos ha aportado el resultado de los cultivos de herida diagnosticados en Consultas externas del Hospital. Se han estudiado la incidencia de infección de localización quirúrgica según cirugía limpia y limpia-contaminada de los enfermos intervenidos, comparando con el estándar. Se han utilizado como indicadores la incidencia acumulada y la Densidad de Incidencia, que elimina las distorsiones ocasionadas por las diferencias de la estancia media.

Resultados: La incidencia de infección de localización quirúrgica global ha sido de 4,62 en el año 2000 y de 2,77 en el año 2001, (siendo el estándar de < del 5% de los enfermos intervenidos). La densidad de Incidencia o numero de infecciones nosocomiales que han desarrollado los enfermos intervenidos/días de estancia totales ha sido de 10,6/1000 enfermos-día en el año 2000 y de 7,4 en el año 2001 (Estándar: 5 a 8 episodios por 1000 enfermos-día). Estos datos se han presentado también de forma mensual y se ha difundido con el objeto de aumentar los esfuerzos para mejorar los cuidados.

Conclusiones: Después de los resultados del primer año, se han incorporado una serie de medidas de prevención de la IHQ preoperatorias (eliminación del vello lo más cerca posible de la intervención, adecuación antibióticos preoperatorios), así como medidas intraoperatorias (disciplina del quirófano). La mejora es objetivable con los resultados de un año después. El feed-back de esta información es a menudo eficaz para persuadir al hospital de adoptar las prácticas de prevención recomendadas.

INFECCIONES NOSOCOMIALES Y PANCREATITIS AGUDA GRAVE EN UCI ESPAÑOLAS

E. Maraví-Poma, J.M. Martínez Segura, I. Jiménez, I. Susperregui, B. Bermejo, P. Oláechea, F. Álvarez-Lerma y Grupo Estudio PAG-GTEI-SEMICYUC. UCI y ENVIN
Hospital Virgen del Camino Coordinación Transplante.

P-084

Palabra clave: pancreatitis aguda grave; infecciones nosocomiales; antibióticos, guías.

Introducción: El objetivo de la comunicación es conocer el estado actual de la PAG en las UCIs españolas.

Método: PAG se identificaron de acuerdo a los criterios de UCI (criterios de Ranson, Imrie, PCR y CT-Dinámico). Se seleccionó la PAG de la base de datos del Estudio Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial (ENVIN) de España. El periodo analizado abarca los años 1997 a 2001. El ENVIN es un estudio observacional, prospectivo, y multicéntrico. Se han controlado las infecciones secundarias. La gravedad se cuantifica mediante el APACHE II. Se describe las infecciones, mortalidad, datos epidemiológicos y antibióticos utilizados como preventivos. El análisis estadístico que se utilizó fue, el Test de χ^2 para la asociación de variables cualitativas, la t de Student en la comparación de medias y el nivel de significancia estadística del 5%.

Resultados: La PAG supone el 1,18%. El APACHE II medio fue de 14,9, la estancia media de 12,2 días. El 30,7% fue sometido a cirugía urgente. La incidencia acumulada de IN fue 48,7% y la densidad de incidencia el 40/1000 días de estancia. La mortalidad cruda 31%, y la mortalidad relacionada a IN del 45%. Se han detectado 97 infecciones, 27 de origen Abdominal (27,8%), 17 neumonías (18,5%), 12 bacteriemias secundarias a infección abdominal (12,4%), 12 infecciones urinarias 12,4%; bacteriemias primarias (10,3%); 3 bacteriemias asociadas a catéter (1,5%). Se aisieron un total de 66 patógenos. BGN 58,5%, CGP 24,5% (MRSA 4,2%), Hongos 17% (principalmente Candidas), Enterococos 15% y anaerobios en el 3,7%. El 85,4% de PAG recibían tratamiento con antibióticos. El antibiótico más utilizado en profilaxis fue el Imipenem-cilastatina (70%) y Piperacilina-tazobactam (10%). Los utilizados en indicación absoluta: Imipenem 70%, Piperacilina/tazobactam 19,4%, Metronidazol 14%, Vancomicina 13,5%, Ciprofloxacin 13%, Amikacina en el 13% y Fluconazol 7,6%.

Conclusión: La PAG en las UCIs españolas representan poco más del 1%, con elevada gravedad, morbilidad y mortalidad. La mortalidad relacionada a complicaciones sépticas de la PAG en UCIs españolas son muy superiores a la media registrada en la literatura (29,7% y 14,9%). El imipenem es el antibiótico más utilizado en profilaxis. Se constata la irrupción de Candidas.

ERRORES DE MEDICACIÓN: IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE DECLARACIÓN VOLUNTARIA

E. Pérez Trueba, M.D. Santos Rubio, I. Pérez Cisneros, A. Vicioso Sebastián, J.M. Martín Bejarano y F. Poveda Gómez
Hospital Costa del Sol.

P-085

Palabras clave: Errores medicación; declaración voluntaria.

Objetivo: Detectar y corregir errores de medicación mediante un sistema de declaración voluntaria.

Métodos: El ámbito de aplicación fueron los pacientes ingresados en un hospital de 200 camas y con Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria. El plan de acción se compuso de una fase previa, fase inicial, fase de implantación y fase de análisis. **Fase previa:** Sensibilización de la magnitud del problema con información específica. Realización de una encuesta de intención y detección de problemas. Publicación de resultados. Diseño de procedimiento de comunicación.

Fase inicial: Implantación del procedimiento: pilotaje con una unidad de hospitalización. Refuerzo y monitorización aportando estrategia de gestión del cambio.

Fase de implantación: Gradualmente por unidades de hospitalización.

Fase de análisis: Recogida de información. Análisis de datos. Tabulación y análisis estadístico. Publicación de los datos. Propuestas de mejora. Reevaluaciones periódicas y sistemáticas del registro de errores. Evaluaciones aleatorias por unidades y comprobación de errores.

Resultados: La sensibilización se realizó mediante sesiones clínicas por áreas de hospitalización. En la encuesta realizada se obtuvo que el 96,8% de los encuestados participaría en el proceso de mejora y el 87% contestaron que la notificación voluntaria contribuiría a un uso más seguro de medicación. El 75% opinan que el temor a repercusiones negativas podría ser la causa de la no comunicación de errores, mientras que el 63,1% no comunican errores por falta de respuesta positiva de la organización. Para el proceso de comunicación se adaptó la hoja de comunicación de errores publicada por Lacasa et al. El pilotaje se realizó en una unidad de Medicina Interna con 30 camas durante 40 días. Se detectaron en esta fase 58 errores que se corresponden con 37 pacientes. La clasificación de los errores según el punto de error donde comenzó fue: Dispensación 33; Transcripción 21; Administración 3 y Prescripción 1. El tipo de error detectado fue: Omisión 33; Dosis exceso 8; Dosis defecto 5; No prescrito 4; Dosis extra 3; Vía de administración 2; Otros 1 y Blanco 2. La causas de los errores fueron: Dispensación 31; Transcripción 18; Administración 3; Orden ilegible 1 y Otros 5. La severidad alcanzada fue: A (Circunstancias con capacidad de causar error) en 3 ocasiones, B (No llegó al paciente) en 54 ocasiones y D (Llegó al paciente sin lesionarlo pero precisó observación) en 1 ocasión. Los errores comunicados se produjeron 49 en Farmacia y 9 en la planta.

Conclusiones: La implantación de un sistema de declaración voluntaria es un proceso factible y con un coste - beneficio favorable, sin embargo la comunicación de errores debe enfrentarse a modificaciones en los hábitos sociológicos y culturales que superen el temor a repercusiones negativas, para ello se debe incidir en que el objetivo de detectar un error debe ser optimizar procesos y nunca buscar culpables. Dentro del circuito de prescripción-transcripción- dispensación y administración el Servicio de Farmacia detecta principalmente errores de medicación en el cual está directamente implicado (Dispensación 56,9% y Transcripción 36,2%), pudiendo deberse esto a la capacidad de resolución que se nos exige cuando los detecta otro punto del circuito. La Omisión de dosis fue el tipo de error más comunicado (57%) coincidiendo esto con lo anterior, ya que al comunicar este tipo de error y ante la necesidad de obtener el medicamento por parte de enfermería implica una comunicación al Área de Farmacia con el objetivo de su corrección. El 98% de los errores recogidos corresponden con severidad A ó B lo que indica que el circuito permite detectar los errores antes de su administración al paciente.

MEJORA DE LA CALIDAD A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA INFORMATIZADA

M.I. Beltrán Gárate, M.E. Carrasco del Amo, M. Iraburu Elizondo*, R. Astiz Lizarra, T. Ciancas Rubio y C. Nagore Indurain
Hospital Virgen del Camino, Medicina Preventiva.

P-086

Palabra clave: Farmacia hospitalaria. Prescripción médica informatizada. Historia clínica informática.

Objetivo: Describir las ventajas de la prescripción médica informatizada y de la posterior intervención farmacéutica en un contexto de Historia Clínica en red local.

Material: Soporte informático que gestiona la Historia Clínica del paciente de una forma integral e interactiva entre los distintos servicios clínicos del hospital. La Historia está ordenada de acuerdo a la coherencia y homogeneidad de los datos en siete grupos de archivos: Antecedentes, Historia General, Radiología, Anatomía Patológica-Laboratorio, Exploraciones, Farmacia y Enfermería.

Métodos: El médico prescribe utilizando la Guía del Hospital o la Base de Datos del Ministerio de Sanidad y Consumo accediendo por nombre comercial o genérico y debiendo cumplimentar los campos: dosis, frecuencia, vía y observaciones si las hubiera. El farmacéutico verifica la prescripción y la valida en el caso de que la considere correcta, quedando un registro de su intervención. Si hubiera un problema relacionado con el medicamento, la prescripción médica quedaría sin validar, se indicaría el motivo y se sugerirían soluciones o alternativas. El médico o la enfermera pueden acceder al contenido de la intervención farmacéutica desde el momento en que ésta se realiza.

Resultados: Se ha conseguido un sistema de intervención farmacéutica interactivo con la prescripción médica en el que todas las actuaciones quedan registradas. La intervención farmacéutica se puede llevar a cabo de forma adecuada y gratificante para el farmacéutico porque dispone de un acceso directo y rápido a todos los datos del paciente, permitiéndole una actuación muy eficaz que a su vez supone un apoyo técnico y científico para el médico. Se dispone de un instrumento de medida de la actividad farmacéutica y de los resultados obtenidos gracias a ella.

Conclusiones: La relación entre paciente y medicamento lo constituye la prescripción médica, punto de arranque del proceso farmacoterapéutico. La garantía de calidad de este proceso debe incluir la validación farmacoterapéutica por parte del Servicio de Farmacia, responsable final del buen uso de los medicamentos. La inclusión, en nuestro caso, de la validación en la Historia Clínica informatizada permite optimizar al máximo este proceso.

PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA EN MAYORES DE 65 AÑOS, ¿RIESGO O BENEFICIO?

M.A. Nadal Bonet y C. Aguilar Martín
ABS L'Ametlla-Perello. SAP Terres de l'Ebre.

P-087

Palabra clave: Prescripción farmacéutica, interacciones, mayores de 65 años.

Objetivo: Analizar el perfil de prescripción farmacológica para patologías crónicas en pacientes mayores de 65 años y las posibles interacciones existentes entre ellos.

Metodología: *Diseño:* Estudio descriptivo transversal. *Población:* Personas mayores de 65 años atendidas en un centro de atención primaria durante el año 2001 en tratamiento farmacológico por patología crónica. Se estudia una muestra de 254 personas (confianza 95%, precisión 6%). Muestreo aleatorio simple.

Resultados: El número de fármacos consumidos oscila en un rango de 1 a 10, siendo 4 de media. Los motivos de consumo de fármacos más frecuentes son por patología cardiovascular (83,9%). El gasto medio es de 55,12 euros (IC 95% 50,20-60,04 euros). El gasto más elevado corresponde a los fármacos para patología del sistema nervioso central (38,41 euros). A más edad más fármacos se consumen, pero menos gasto consume. Las mujeres son más consumidoras de fármacos que los hombres, pero los consumen más caros. El 44,1% presenta interacciones farmacológicas, 1 el 35%, 2 el 8% y 3 el 1%. Un 33,7% consumen al menos un fármaco que no tiene un valor intrínseco farmacológico elevado encontrándose diferencias significativas por sexo (mujeres 38,5% y hombres 26,9%) y por edad (> 74 años 39,7% y 27,5% entre 65-74).

Conclusiones: Elevado consumo de fármacos en la población mayor de 65 años, sobre todo de fármacos para patología cardiovascular, psiquiátrica, de aparato locomotor y digestivo. El número de interacciones medicamentosas es elevado con el riesgo que esto comporta. Además se evidencia un coste económico importante que va aumentando teniendo en cuenta la tendencia al envejecimiento de la población. La prescripción farmacológica actual se puede mejorar en calidad, utilizando principios activos que tengan evidencia científica de su beneficio en la salud de la gente mayor, haciendo además hincapié en la minimización de las interacciones.

CICLO DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN EN UN HOSPITAL TERCARIO

A.B. Jiménez, M. Cantero, T. Hernández, I. Izquierdo, M. Lacalle, A. Asúnsolo, R. Plá y P. Rodríguez
Comisión de Farmacia.

P-088

Palabra clave: Errores de medicación, prescripción, transcripción, farmacia, ciclo de mejora.

Objetivos: 1) Estimar la prevalencia de errores de transcripción, ambigüedades y omisiones en las órdenes de tratamiento de pacientes ingresados en 2 plantas de hospitalización convencional. 2) Describir las características de los errores detectados.

Material y método: Se realizó un corte transversal, para estimar la prevalencia de errores de medicación en dos servicios: uno médico y otro quirúrgico. Se analizaron en las órdenes de tratamiento médico, no la indicación de la prescripción si no la forma de la misma (legibilidad, empleo de abreviaturas, uso de genérico, vía, dosis y horario), y en la hoja de administración de medicación de enfermería (Kardex) la transcripción literal de las órdenes médicas. En el servicio médico, se revisó la documentación del primer día de estancia formalizada en planta de todos los pacientes ingresados y en el servicio quirúrgico, se estudió el día posterior a la cirugía.

Resultado: Se revisaron en el servicio médico, 32 historias en las que se encontraron un total de 242 órdenes prescritas, con una media de 7,56 órdenes por paciente (DS 4,38). En el servicio quirúrgico en las 29 historias revisadas se hallaron 259 órdenes prescritas (Media 8,93 DS 3,02).

Los errores de prescripción más frecuentes fueron:

- Uso de nombres comerciales: Medicina 60,7% (IC 95% 42-76,9); Cirugía 59,57% (IC 95% 40-76,6)
- Ausencia/ambigüedad de vía: Medicina 48,76% (IC 95% 31-66,6); Cirugía 26,06% (IC 95% 12,3-45,9)
- Ausencia/ambigüedad de dosis: Medicina 45,86% (IC 95% 28,6-64); Cirugía 37,76% (IC 95% 21,1-57,4)

Los errores de transcripción más frecuentes fueron transcripción errónea de dosis en ambos servicios.

Conclusiones: 1) Los resultados encontrados son un reflejo de los descritos en la bibliografía general. 2) Parece necesario la implementación de intervenciones dirigidas a la prevención de estos errores.

P-090

CARRO DE EMERGENCIAS LIBRE DE LÁTEX

M. Urruela Oliván, E. Bilbao Ayo, M.J. Ulloa Iglesias y B. Zalabarria Landa
Hospital de Basurto Unidad de Calidad.

Palabra clave: Látex. Carro emergencia.

Objetivo: 1) Disponer de un carro de emergencia libre de látex, dado el aumento de prevalencia de esta alergia en la población. 2) Actuar ante una situación de riesgo vital para el paciente con total garantía de no añadir más complicaciones.

Metodología: Creación de un grupo de trabajo formado por una farmacéutica, un intensivista y cuatro enfermeras, en el año 2001. Se contactó con todas las casas comerciales que nos suministran materiales para el carro de emergencias, solicitándoles certificado de garantía de ausencia de látex entre sus componentes. Se elaboró el nuevo modelo de carro sin látex así como una guía en la que figuraseen todos los materiales junto con el nombre de la casa que nos suministra el producto sin látex. Se elaboraron unos Kits con una mayor diversidad y volumen de materiales para las siguientes áreas: Bloque Quirúrgico, Partos y Urgencias. Asimismo se definió un área en el Almacén General para ubicar este tipo de material, con el fin de evitar errores. Se informó a todo el personal del porqué de esta necesidad y de la utilización de criterios de seguridad y eficiencia.

Resultados: En el hospital el 100% (62) de los carros están libres de látex. En los casos en los que no existen en el mercado productos sin látex se han definido las pautas de actuación:

Sustituir la goma de las mascarillas por venda o hiladillo.

En los viales de medicación retirar el tapón, siempre utilizando guantes de vinilo.

Cubrir los manguitos del fonendoscopio, esfígnomanómetro con venda o similar.

El carro ha sido sometido a dos ciclos PDCA. En estas dos evaluaciones realizadas, años 2001 y 2002, el 100% de los componentes estaban exentos de látex.

Conclusiones: 1) Hemos asegurado y facilitado el uso de materiales libres de látex ante una emergencia, garantizando la seguridad de nuestros pacientes. 2) Las enfermeras no tienen dudas sobre qué materiales están exentos de látex y cuáles no. 3) Concienciación por parte del personal.

ANÁLISIS DE PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA Y RIESGOS DE INTERACCIONES EN POBLACIÓN ANCIANA QUE VIVE EN RESIDENCIAS

R.M. Latorre Santos, M.P. Novella Abril, T. García Ruiz y E.P. Salazar González
C.S. ACTURSUR.

P-089

Palabras clave: Prescripción farmacológica, ancianos, residencias de ancianos, interacciones.

Resumen: Los ancianos en residencias se encuentran entre los grupos de población más polimedicados, con alto riesgo de yatrogenia por interacciones farmacológicas debido al uso poco racional de los medicamentos, generando costes directos e indirectos potencialmente evitables.

Se realiza un estudio descriptivo transversal sobre 119 ancianos de 5 residencias privadas de nuestra zona de salud entre noviembre del 2001 y junio del 2002. Recogida de datos (edad, sexo, médico responsable, antecedentes, fármacos consumidos actualmente, interacciones farmacológicas detectadas, UTB y fármacos inadecuados) de las historias clínicas mediante formulario. La base de datos y el análisis estadístico se realiza con el programa Access 2000.

En una segunda fase nos planteamos realizar este estudio en ancianos domiciliarios y residencias públicas.

Nos encontramos con 25 hombres y 94 mujeres de $83,6 \pm 8,04$ años de edad, el 78,1% de ellos polimedicados (3 o más fármacos), con un consumo medio de $5,6 \pm 2,4$ fármacos y 24 UTB.

Se detectan 203 interacciones (rango 0-17) y destaca el elevado porcentaje de ancianos que consumen al menos un psicofármaco (60,5%) si bien no consta motivo en un 47,2% de los ancianos, habiendo marcada variabilidad según residencia. Posteriormente realizamos un perfil individual de cada residencia y se entregan resultados a cada responsable médico en el centro.

Conclusión: A la vista de estos datos, los profesionales del centro de salud deberían reevaluar el tratamiento individual de cada anciano adecuándolo a su edad, antecedentes y calidad de vida para disminuir el riesgo de yatrogenia y conseguir un uso más racional del medicamento. Además sería conveniente potenciar la colaboración entre el equipo de atención primaria y el personal sanitario de las residencias pues repercutiría muy favorablemente en la calidad asistencial y bienestar de nuestros ancianos.

P-091

FACTORES INFUYENTES EN LA APARICIÓN DE FLEBITIS POSPUNCIÓN

E. Díaz Sampedro, R. Fuentevilla Montes, Y. Herrera Marcos, I. Suero Villegas, M. Robles García y T. Dierssen Sotos
Hospital Sierrallana, Servicio Medicina Preventiva.

Palabra clave: Flebitis, catéter periférico.

Objetivo: Conocer los factores que influyen en la aparición de flebitis pospuñición en vías periféricas.

Método: Estudio de cohortes prospectivo realizado sobre los pacientes ingresados en Medicina Interna, Cirugía General y Ginecología, con vía venosa periférica entre el 01-02-02 y 15-04-02. Criterios de inclusión: primera vía venosa periférica. Criterios exclusión: vía canalizada fuera del Hospital, vía central, inmunodepresión. Se consideró como flebitis a la encontrada en el momento de retirada del catéter y reflejada en la hoja de registro (signos de Celso y temperatura). El análisis estadístico consistió en el cálculo de χ^2 para la comparación de proporciones.

Resultados: De los 376 pacientes estudiados, con una mediana de edad de 73,5 años y un rango entre 15 y 96, el 51% fueron mujeres. La incidencia de flebitis detectada fue del 20,5%, presentando eritema en el 85,7% de las ocasiones, dolor en el 74,0%, calor en 31,2%, induración en 66,2% y Temperatura $\geq 37,5$ °C en 7,8%. En cuanto a la gravedad, el 13% corresponden a flebitis de grado I, el 31,2% grado II, el 33,8% grado III, y 22,1% IV. La vida del catéter fue 13,3 horas menor en los casos con flebitis. Como asociaciones estadísticamente significativas destacaron la existente entre flebitis y el sexo (62,3% en hombre frente a 37,7% en mujeres $p = 0,008$), la localización (61,5% en brazo $p = 0,00005$) y la perfusión de antibióticos (69% frente a 31% $p = 0,03$). No se encontró asociación significativa con el nº de catéter, fijación, suero terapia, ringer lactato, anestésicos, hemoderivados y vía salinizada, analgésicos, furosemida, corticoides, antieméticos, cloruro potásico, ranitidina y omeprazol, diabetes, cirrosis e hipertensión arterial, así como con parámetros bioquímicos.

Conclusiones: La localización de la vía, el sexo y la administración de antibióticos fueron factores significativamente asociados al desarrollo de flebitis. Identificar estos factores nos ayudará a implantar acciones correctoras que aumenten la calidad de nuestros cuidados.

AUTOPSIA COMO CONTROL DE CALIDAD. ANÁLISIS DE CORRELACION CLÍNICO-PATOLÓGICA

F. Alameda Quillet, M. Andreu García, A. Vázquez Sánchez, L. Iglesias Lepine, J. Carles Galcerán, M. Cladellas Capdevila, S. Navarro Soto, J. Herraiz Rocamora, J. Tuyet Huch y C. Sanjuas Benito
Hospital del Mar.

P-092

Palabra clave: Autopsia, Correlación clínica, Calidad.

Objetivos: Validación de la autopsia como elemento de control de calidad de la actividad clínica. Estudio de la correlación clínico-patológica en el diagnóstico principal, causa de muerte y diagnósticos secundarios.

Material y método: Estudio comparativo de los datos de solicitud de autopsia clínica de 170 autopsias de adultos atendidos en los Servicios de Urgencias y Hospitalización en un hospital general (el diagnóstico principal y secundarios) y los diagnósticos finales anatómico-patológicos. Se analizan también los resultados por Servicios y días de estancia.

Resultados: Globalmente el porcentaje de concordancia del primer diagnóstico es del 78,8%, en la causa de muerte del 70,6% y en los segundos diagnósticos del 57,1%. Respecto al primer diagnóstico, los Servicios Quirúrgicos muestran el porcentaje más alto de concordancia y Urgencias el menor. Respecto a los segundos diagnósticos, la Unidad de Cuidados Intensivos y los Servicios Médicos muestran los porcentajes más altos de concordancia. Respecto a la causa de muerte, Cuidados Intensivos muestra una concordancia del 100%. Con relación a los días de estancia para el primer diagnóstico, el porcentaje de concordancia es mayor en el grupo de 3-5 días y en el grupo de más de 50 días. Respecto a los segundos diagnósticos y causa de muerte el mayor porcentaje de concordancia se da a los 6-9 días. Por servicios los porcentajes de concordancia varían entre el 57% y el 78,8%. Se han hallado discrepancias que pueden ser inherentes a su idiosincrasia. Por días de estancia, los porcentajes más altos de concordancia del primer diagnóstico son a los 3-5 días, para los segundos diagnósticos y la causa de muerte, a los 6-9.

Conclusiones: Nuestros porcentajes, si bien los resultados son preliminares, son menores a los reportados en otras series. La práctica de autopsias clínicas puede poner de manifiesto las discordancias clínico-patológicas y ayudar a mejorar la calidad asistencial de una institución. En este sentido reafirmamos el valor de control de calidad y docente de las autopsias clínicas.

PÓSTER V**Sistemas de información**

Sala Navarra
Miércoles 9

AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA EN LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ASISTENCIALES DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA

C. Aguilar Martín, M.R. Dalmau Llorca, J. Blasco Alvaredo, I. Ferré Jornet, I. Bardaji Martínez y J. Daniel i Díez
CAP Baix Ebre.

P-093

Palabra clave: Control de calidad, auditoria, concordancia.

Introducción: La evaluación de los indicadores de buena calidad asistencial pertenecientes al contrato de dirección clínica de nuestro servicio de atención primaria (SAP) se realiza por medio de un auditoria de historias clínicas (HC). Esta auditoria se realiza cada año de forma que se revisa una muestra de HC estratificada por área básica de salud (ABS), y dentro de esta por equipo, medicina general y pediatría, grupo de edad y factor de riesgo (dislipemia, diabetes, MPOC, HTA, riesgo coronario $\geq 20\%$, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular). El muestreo es aleatorio o sistemático en los consultorios no informatizados. La SAP está formada por 9 ABS, en 6 la auditoria fue interna (revisión de HC por los propios profesionales) y en tres externa (realizada por 3 sanitarios ajenos al equipo auditado, formados previamente). Se revisaron 3.231 HC, se introducen en una base de datos y se realiza el análisis y elaboración de los informes de los resultados.

Objetivo: Valorar la validez de los resultados obtenidos a través de los dos métodos de auditoria.

Metodología: Se realiza un control de calidad de una muestra aleatoria de HC de 2 ABS, una de cada tipo de auditoría. La revisión de las HC la realizaron dos médicos con experiencia en la realización de auditorias y conocimiento de las dos ABS (aunque no pertenecientes a las mismas). Para el análisis de la concordancia de los resultados entre audit-readudit se utiliza el índice de kappa.

Resultados: Se presentan los resultados de concordancia de los 25 ítem valorados en cada ABS. El ABS con audit interno presentan niveles de Kappa $< 0,6$ en 1 indicador: "Hoja del PAPPS actualizada". El ABS con audit externo tiene 4 indicadores con kappa $< 0,6$: "HTA con creatinina medida", fumadores con espirometría", "registro de glucemia" y "MPOC con espirometría".

Conclusiones: Ambos métodos han resultado fiables con niveles de concordancia buenos o muy buenos en la mayoría de los ítem evaluados, de forma que desde el punto de vista metodológico no nos podemos decantar por uno de ellos. Pensamos que sería útil la realización de auditorias externas alternas en años sucesivos.

CAMBIOS EN LA CODIFICACIÓN DE UN SERVICIO DE UROLOGÍA DEBIDO A LA HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADAM. Diaz Calvet, M. Saldaña Lusarreta, M. Iraburu Elizondo
y J. Vidán Allí**P-094****Palabra clave:** Codificación. Historia Clínica Informatizada.**Objetivo:** Describir los cambios introducidos por la Historia Clínica Informatizada (HCI) desde su implantación en enero de 2001 en la codificación de las altas del Servicio de Urología del Hospital Virgen del Camino.**Metodología:** Se describe el actual sistema de codificación y se miden resultados, recogiendo número de diagnósticos y procedimientos codificados al alta del paciente ingresado o sometido a cirugía mayor ambulatoria desde enero de 1999 hasta abril de 2002. Se estudia el Índice de Case Mix y el número de informes no emitidos.**Resultados:** Cambios en el proceso de codificación:

- La Unidad de Codificación (UC) accede on-line a todos los datos legibles, ordenados y actualizados de la HCI del paciente, puede comprobar fechas de exploraciones realizadas, su resultado y consultar datos de episodios anteriores.
- Se elimina el envío de los informes de alta desde el Servicio a la UC.
- Se elimina la necesidad de solicitar historias clínicas (HC) al Archivo (63 HC en el 2000, 21 en el 2001 y ninguna en el 2002)
- Desaparece la demora entre el alta del paciente y la disponibilidad de la información de ese episodio.

Resultados de la codificación:

	1999	2000	2001	2002*
Diagnósticos	4,33	3,74	4,73	5,48
Procedimientos	2,74	2,98	2,79	2,25
Índice Case Mix	1,249	1,406	1,502	1,483

*: Enero-Abril

Conclusiones: La HCI ha introducido innegables mejoras en el proceso de codificación, mejorando el acceso a una información más completa y sistematizada y eliminando la mayoría de las tareas administrativas del antiguo circuito en papel. Los resultados de la codificación a través de la HCI son más exhaustivos, permitiendo la recuperación de un mayor número de diagnósticos y procedimientos por alta, lo que contribuye al aumento progresivo del Case Mix. La supresión de la demora entre el alta del paciente y la disponibilidad de la información haría posible la codificación al día.**EVOLUCIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA CLÍNICO-ASISTENCIAL EN EL SUMMA-061 EN LOS AÑOS 2000-2001**

A. Cabañas Martínez, M.J. Fernández Campos, A. Curieles Asensio, L. Trujillo Rodríguez, V. Hernández Jaras y M.A. Pérez Cuevas

P-095**Palabra clave:** Historia Clínica. Calidad asistencial. Urgencias extrahospitalarias.**Objetivos:** Analizar la evolución de la cumplimentación de la Hoja Clínico-asistencial por las Unidades Móviles de Emergencias (UME) del SUMMA-061 durante los años 2000-2001.**Metodología:** Se realiza estudio retrospectivo en el que se compara el porcentaje global ponderado de actuaciones con hoja de asistencia cumplimentada correctamente así como los porcentajes parciales correspondiente a ocho criterios: Identificación del paciente, identificación de UME y aviso, antecedentes, situación actual de la enfermedad, juicio clínico codificado, tratamiento y técnicas, derivación y destino, identificación del facultativo. El análisis estadístico se realiza mediante tests de diferencia de proporciones. El nivel de significación fijado es del 5%.**Resultados:** La evaluación de la cumplimentación aporta los siguientes resultados: El porcentaje global ponderado de actuaciones con hoja de asistencia cumplimentada correctamente fue 80,8 en 2000 y 84,7 en 2001 (diferencia significativa con nivel de significación de 5%). Atendiendo a la cumplimentación de cada criterio los porcentajes obtenidos fueron: Identificación del paciente, 35,76 en 2000 y 41,03 en 2001 (diferencia significativa con nivel de significación de 5%); identificación del UMA y aviso, 94,11 en 2000 y 98,45 en 2001 (diferencia significativa con nivel de significación de 5% e incluso de 1%); antecedentes, 81,38 en 2000 y 88,6 en 2001 (diferencia significativa con nivel de significación de 5% e incluso 1%); situación actual de la enfermedad, 86,28 en 2000 y 86,78 en 2001 (diferencia no significativa); juicio clínico codificado, 88,87 en 2000 y 86,2 en 2001 (diferencia no significativa); tratamiento y técnicas, 64,83 en 2000 y 77,5 en 2001 (diferencia significativa con nivel de significación de 5% e incluso 1%); derivación y destino, 86,45 en 2000 y 90,15 en 2001 (diferencia significativa con nivel de significación de 5%); identificación del facultativo, 82,02 en 2000 y 96,7 en 2001 (diferencia significativa con nivel de significación de 5% e incluso 1%).**Conclusiones:** La cumplimentación de la Hoja Clínico-asistencial ha mejorado en 2001 respecto a 2000, tanto de forma global como en seis de los ocho criterios evaluados, con la excepción de los criterios "situación actual de la enfermedad" y "juicio clínico codificado", cuyos porcentajes de cumplimentación no han prestado variaciones significativas.**¿SON ATENDIDAS LAS PECULIARIDADES SOCIOCULTURALES DE LOS INMIGRANTES?**A.M. Soria Albacete, J.I. Castillo Lorente, Y. Capel Bonachera, I. Urrea Gilabert y A.M. Contreras Rodríguez
*Hospital de Poniente, Servicio Cuidados Críticos.***P-096****Palabra clave:** Inmigración, atención integral, peculiaridades socioculturales, problemas de salud en inmigrantes.**Introducción:** La E.P. Hospital de Poniente de Almería se ubica en una comarca cuya actividad económica predominante es la Agricultura Intensiva, que se nutre de mano de obra extranjera. Se seleccionó un conjunto mínimo de datos que han de estar presentes en la historia clínica de los pacientes inmigrantes orientado a identificar situaciones de riesgo para la salud y peculiaridades socioculturales que puedan afectar a la atención de salud. No existe una hoja de recogida de datos específica sino que se emplean documentos idénticos al resto de la población.**Objetivos:** Revisión de las historias clínicas para valorar la presencia de los ítems seleccionados.**Metodología:** Estudio descriptivo retrospectivo, muestra seleccionada: todos los pacientes inmigrantes africanos ingresados en UCI, período: enero 2000 a diciembre 2001.**Datos analizados de la Historia Clínica:** 1) situación legal. 2) conocimientos del idioma. 3) nacionalidad. 4) profesión/trabajo. 5) características del entorno familiar. 6) existencia de domicilio habitual. 7) relaciones con los servicios sanitarios. Los ítems se corresponden con los que refleja la literatura científica como condicionantes para la salud.**Resultados:** Se obtienen 19 pacientes inmigrantes africanos ingresados en UCI, siendo el 84,21% hombres, con una edad media de 33 años, con diagnósticos principales muy heterogéneos, y cuya estancia oscila desde un día hasta 18 días. 8 pacientes presentan un problema de salud que está influenciado por las condiciones laborales, por las condiciones higiénicas deficiencias de la vivienda y por los valores/ conductas orientadas a la salud.**Items evaluados: cumplimentación:**

1) situación legal: 100%. 2) conocimientos del idioma: 89,48%. 3) nacionalidad: 68,43%. 4) profesión/trabajo: 36,85%. 5) características del entorno familiar: 47,37%. 6) existencia de domicilio habitual: 78,94%. 7) relaciones con los servicios sanitarios: a) existencia de contactos previos con el hospital reflejada en el 100%; b) existencia de contactos con Atención Primaria: 47,37%; c) seguimiento por Consultas Externas E.P.H.P.: 52,64%.

Conclusiones: Se observa que están recogidos en la historia clínica datos relevantes para la atención de la población inmigrante. Los problemas de salud que ocasionan su ingreso en UCI no son diferentes al resto de la población de la comarca.**CREACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA TÉCNICA DE HISTORIAS Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA**M.P. Jiménez Carnicer, T. de Pedro Montalbán y F.J. Sada Gonñi
*Centro de Consultas Príncipe de Viana, Sección Documentación.***P-097****Palabras clave:** Historia clínica, Comisión de Historias.**Objetivo:** Describir el proceso de formación e implantación de la Comisión Asesora Técnica de Historias y Documentación Clínica.**Metodología:** Fase 1: a) Desde la Subdirección de Asistencia Especializada se realiza un informe de propuesta de creación de la comisión que se traslada a la Dirección de Asistencia Especializada para su visto bueno. b) Se prepara un borrador de orden foral que se tramita a la asesoría jurídica. c) Se solicitan a las direcciones implicadas el nombre de las personas que integrarán la Comisión. d) Aparece la orden foral 133/1999, de 11 de mayo, del Consejero de Salud, por la que se crea la Comisión Asesora Técnica de Historias y Documentación Clínica. e) Se informa a las direcciones y a los profesionales de su creación.

Fase 2: Se realizan las primeras reuniones, elaborándose el reglamento de régimen interno con el visto bueno de la asesoría jurídica.

Resultados: Tras la creación de la Comisión, las funciones de la misma son las siguientes:

- Mantener una historia clínica única, integrada y acumulativa.
- Desarrollar sistemas de preservación y garantía de la confidencialidad de la información.
- Normalizar la documentación clínica y autorizar la incorporación o modificación de documentos en la historia clínica.
- Determinar criterios y sistemas de conservación y depuración de documentos.
- Dictar y realizar el seguimiento de las normas sobre el uso, acceso y circuitos de la historia clínica.
- Regular las normas de funcionamiento del archivo de historias clínicas.
- Estudiar la evaluación de la calidad de la historia clínica mediante la realización de los estudios oportunos sobre la misma.
- Estudiar el futuro de la historia clínica ante los avances informáticos.
- Introducir medidas correctoras y evolución de las mismas para el buen funcionamiento del archivo.

Conclusiones: Esta Comisión ha sido un buen elemento moderador del cambio organizativo y cultural, al permitir encauzar y armonizar los intereses de todas las partes, lo que a su vez ha hecho posible la mejora de la historia clínica a través del aprovechamiento de las sugerencias que los profesionales han hecho llegar a la Comisión en la que estaban representados todos los Hospitales.

CONCORDANCIA DIAGNOSTICA DE DIABETES MELLITUS EN LOS REGISTROS CLÍNICOS DE UN ÁREA SANITARIA

R. Sánchez-Garrido Escudero

P-098

Palabra clave: Diabetes Mellitus, Registros Médicos, Prevalencia.

Objetivos: 1) Verificar la existencia del diagnóstico de diabetes en los registros de atención primaria y especializada, de los pacientes diabéticos de un Área Sanitaria. 2) Relacionar el diagnóstico con el conocimiento de su proceso por los pacientes.

Diseño: Estudio transversal basado en una muestra de sujetos que se obtienen tras realizarle una determinación de glucemia 126 mg/dl. por el laboratorio de referencia.

Ámbito de Estudio: Población diabética estimada en un área sanitaria. 6% de la población.

Sujetos: Muestra de 525 sujetos distribuidos ponderadamente por cada zona de salud, en función a su densidad poblacional.

Mediciones: Se estudian los registros existentes en la historia clínica del hospital y en atención primaria, para verificar la existencia del diagnóstico de diabetes. Se comprueba el conocimiento de su proceso diabético mediante un cuestionario al paciente.

Resultados:

- Del 87,4% de los sujetos del estudio podemos confirmar la certeza del diagnóstico diabético.
- El 22,4% tiene recogido el diagnóstico en uno de los registros, el 41,1% en dos y el 36,3% en los tres registros.
- El 12% de los pacientes no tiene registrado el diagnóstico de diabetes.

Conclusiones: 1) La concordancia en los registros clínicos (primaria y especializada) alcanza el 42%. 2) Existe una discordancia entre los registros y el conocimiento de su condición de enfermos por los pacientes, entre los propios registros y entre cada uno de ellos y la encuesta. 3) Hay mayor concordancia entre los registros de primaria y la encuesta que entre los de especializada y la encuesta.

INFORMATIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ANESTESIA DE UN HOSPITAL COMARCAL

L. Martínez Jerez, D. Sintes Matheu y A. Galobart Roca

P-099

Palabra clave: Informática. Anestesia. Calidad.

Introducción: La aplicación de nuevas tecnologías de la información en el ámbito sanitario es una práctica cada vez más extendida y un gran reto que nos permitirá en un corto período de tiempo eliminar el soporte en papel. El objetivo que nos planteamos es el de informatizar la documentación de nuestro servicio de anestesia para poder analizar, valorar, evaluar y mejorar la calidad de todos nuestros procesos.

Metodología: Mediante la utilización del paquete informático Gestión Documental de la Historia Clínica (GesDoHc) hemos confeccionado una serie de plantillas de menús desplegables que cubren gran parte de las necesidades del servicio. Estas plantillas son: Visita Preanestésica, Hoja de Tratamiento. Documento del Consentimiento Informado, Alta de Reanimación, Alta de la unidad de Cirugía Ambulatoria, Gráfica de Anestesia y Historia de la Clínica del Dolor.

Resultados: Se presentan los modelos de plantillas.

La utilización por parte del personal médico de estas plantillas se efectúa de una manera progresiva. Actualmente disponemos de los datos de utilización siguientes: Plantilla de Alta de Reanimación: 97%. Plantilla de Alta de la unidad de Cirugía Ambulatoria: 68%. Actualmente estamos evaluando la utilización del resto de las plantillas.

Conclusiones: El sistema permite una optimización y homogeneización de criterios lo que mejora la calidad de los informes. Facilita la revisión de la documentación e información médica. Permite prescindir de la historia clínica en su formato antiguo por lo que se optimizan circuitos.

Disminuyen las pérdidas de documentos en el momento de la visita.

En un futuro próximo desaparecerá el formato papel de todos los documentos del Servicio de Anestesia.

ANÁLISIS DE CALIDAD EN HOSPITALIZACIÓN DE UN SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

M.A. Imizcoz Zubigaray, F.J. Abad Vicente, S. Alcasena Juango, J. Berjón Reyero, T. Basurte Elorza y E. Uribe Echeverría
Hospital de Navarra, Área Clínica del Corazón.

P-100

Palabra clave: Calidad, Historia Clínica, Cardiología.

Objetivo: Estudio preliminar del grado de información existente en la Historia clínica (HC) que permita diseñar un modelo útil para el análisis continuado de calidad en el Servicio de Cardiología. En un primer apartado se valoran aquellos datos que deben estar cumplimentados en todos los pacientes ingresados, estudiando en segundo lugar aspectos concretos referidos a los tres procesos más relevantes.

Material y método: Se ha analizado la HC de una muestra de 57 pacientes obtenida de las altas del Servicio de Cardiología (año 2001). Los parámetros analizados se divide en dos grupos. Por una parte los que con carácter general y básico deben tener todas las historias clínicas, independientemente de la patología del paciente y en segundo lugar aspectos concretos del manejo individualizado en función de las patologías más relevantes en el Servicio de Cardiología: infarto agudo de miocardio (IAM), angina de pecho e insuficiencia cardiaca (ICC). Se estudian aspectos de manejo o terapéuticos al alta que han demostrado ser útiles para reducir la mortalidad en dichos procesos.

Resultados: Las historias estudiadas han correspondido a: IAM: 14 (24,6%), angina: 21 (36,8%), ICC: 4 (7%) y a otros diagnósticos 15 (31,6%). Los aspectos generales sobre el contenido de la historia, e informe de alta estaba presentes en las 57 historias (100%). La información escrita sobre las exploraciones complementarias realizadas y consentimiento informado de las mismas estaban en todos los pacientes en que se realizó. En el análisis para las tres patologías seleccionadas se observó que en un alto porcentaje de casos se había realizado las pruebas correspondientes para cada proceso estudiado, comprobándose que existía justificación en aquellos casos en los que estas no se realizaron. Igualmente se observa una alta congruencia entre el proceso diagnosticado y el tratamiento prescrito.

Conclusiones: El análisis del contenido de la HC es útil para evaluar un Servicio Clínico. En nuestro caso existe un alto nivel de cumplimiento de los parámetros estudiados. Este trabajo debe entenderse como el punto de partida de un método continuado de calidad que refleje aquellos parámetros significativos.

INFORMATIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ANESTESIA DE UN HOSPITAL COMARCAL

L. Martínez Jerez, D. Sintes Matheu y A. Galobart Roca

P-099

Palabra clave: Informática. Anestesia. Calidad.

Introducción: La aplicación de nuevas tecnologías de la información en el ámbito sanitario es una práctica cada vez más extendida y un gran reto que nos permitirá en un corto período de tiempo eliminar el soporte en papel. El objetivo que nos planteamos es el de informatizar la documentación de nuestro servicio de anestesia para poder analizar, valorar, evaluar y mejorar la calidad de todos nuestros procesos.

Metodología: Mediante la utilización del paquete informático Gestión Documental de la Historia Clínica (GesDoHc) hemos confeccionado una serie de plantillas de menús desplegables que cubren gran parte de las necesidades del servicio. Estas plantillas son: Visita Preanestésica, Hoja de Tratamiento. Documento del Consentimiento Informado, Alta de Reanimación, Alta de la unidad de Cirugía Ambulatoria, Gráfica de Anestesia y Historia de la Clínica del Dolor.

Resultados: Se presentan los modelos de plantillas.

La utilización por parte del personal médico de estas plantillas se efectúa de una manera progresiva. Actualmente disponemos de los datos de utilización siguientes: Plantilla de Alta de Reanimación: 97%. Plantilla de Alta de la unidad de Cirugía Ambulatoria: 68%. Actualmente estamos evaluando la utilización del resto de las plantillas.

Conclusiones: El sistema permite una optimización y homogeneización de criterios lo que mejora la calidad de los informes. Facilita la revisión de la documentación e información médica. Permite prescindir de la historia clínica en su formato antiguo por lo que se optimizan circuitos.

Disminuyen las pérdidas de documentos en el momento de la visita.

En un futuro próximo desaparecerá el formato papel de todos los documentos del Servicio de Anestesia.

PROCESO DE MEJORA DE ELABORACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL HOSPITAL LA PAZ

O. Monteagado Piquerás, C. Navarro Royo, P. Alonso Vigil, V. Pérez Blanco, N. Fernández de Larrea y J. García Caballero

P-101

Palabra clave: Estandarización, implantación, evaluación, legibilidad.

Objetivos: Enumeración del total de consentimientos informados estandarizados, implantados y evaluados por el comité de ética de nuestro hospital, así como de aquellos que están en fase de borrador. Evaluación de la legibilidad y comprensibilidad de los documentos.

Metodología: Diseño de un documento estándar con los siguientes apartados: servicio, procedimiento, descripción del procedimiento, riesgos, beneficios, alternativas, autorización, declaraciones y firmas.

Diseñado de un formulario en formato Access 97, para introducción y visualización de datos.

Trabajo en equipo con los jefes de servicio y coordinadores de calidad de cada servicio del hospital para:

Mejorar la calidad de la información de los consentimientos informados ya existentes.

Creación de nuevos documentos para aquellos procesos en los que no había, o que eran genéricos.

Elaboración, implantación y distribución de documentos mejorados.

Evaluación de comprensibilidad real del enfermo, mediante encuesta.

Evaluación de legibilidad mediante cálculo de índices de legibilidad: Índice de Flesch.

Índice de SMOG.

Resultados: El número total de consentimientos informados definitivos e implantados: traumatología: 16, anestesia: 4, nefrología: 13, neurocirugía: 8, medicina nuclear: 5, radiodiagnóstico: 26, genética: 2, radioterapia: 8, cirugía vascular: 8, dermatología: 4, hematología analítica: 1, maxilofacial: 9, neumología: 2, quimioterapia: 2, nutrición: 1, cirugía general: 38, urología: 59, oftalmología: 10, nefrología pediátrica: 2, neurología pediátrica: 10, cardiología pediátrica: 10, cirugía pediátrica: 1, cirugía cardiaca (h. infantil): 1, cardiología adultos: 1. El número de consentimientos en fase de borrador es de 28. Legibilidad: índice de Flesch-Kincaid (mayor de 10) y el índice de SMOG (menor de 20). Comprensibilidad real del enfermo mediante encuesta.

Conclusiones: La línea estratégica en el ámbito del consentimiento informado es compatibilizar calidad con cantidad. Para ello se ha verificado la legibilidad de éstos mediante el índice de Flesch y el índice de SMOG. Actualmente estamos valorando la comprensibilidad real del enfermo con mediante encuesta.

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE INTERCONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA (AP) A NEUROLOGÍA

M.A. Nuin, P. Quesada, T. Ayuso, J. Arana, A. Galíndez y E. Martínez

P-102

Palabra clave: Derivaciones, continuidad de cuidados, áreas de mejora.
Objetivos: En el contexto del Plan de Coordinación Atención Especializada-Atención Especializada, el Comité de Mejora de Neurología ha realizado este estudio para: a) Ver la calidad de la cumplimentación de los documentos de interconsulta de AP a Neurología en el área de Pamplona. b) Detectar áreas de mejora en la calidad del documento que faciliten la continuidad en la asistencia al paciente.

Métodos: Estudio descriptivo transversal. En tres meses (1/1/02-31/3/02) se ha completado la muestra calculada de 384 documentos (precisión: 5%, error alfa: 5%, p=q=0,5). Ninguno de los médicos/as participantes conocía el estudio. Los documentos fueron fotocopiados a la llegada del paciente a la consulta especializada. Se establecieron los siguientes criterios de calidad: legibilidad, datos de filiación (estos dos criterios se valoraron solo en centros no informatizados), antecedentes personales y/o medicación habitual, síntomas, exploración física, pruebas complementarias y medidas terapéuticas en el proceso actual si las hubiera, diagnóstico de presunción o motivo de consulta, justificación de la petición de consulta preferente en los documentos con este carácter y calidad global subjetiva del documento. Dos neurólogos y un médico de familia del comité estudiaron los documentos, previa realización de estudio piloto para valorar la fiabilidad de los criterios. Los datos se introdujeron en Access mediante formulario y se analizaron con SPSS.10

Resultados: Se han valorado 393 documentos. El 91,4% de los volantes son legibles (IC95%: 88-95). Las variables mejor cumplimentadas son: datos de filiación (96,6%; IC95%: 94-99), síntomas (93,4%; IC95%: 91-96) y antecedentes personales (60,3%; IC95%: 55-65). El diagnóstico de presunción aparece en el 37,2% de los documentos (IC95%: 32-42) y la exploración física en el 32,8% (IC95%: 28-37). Las medidas terapéuticas, las pruebas complementarias y la justificación de la preferencia aparecen en un 21,1% (IC95%: 17-25), 13% (IC95%: 10-16) y en 17,2% (IC95%: 9,4-25) respectivamente. Los documentos han sido valorados como de buena calidad en un 24,7% (IC95%: 20-29), de aceptable en 46,3% (IC95%: 41-51) y de mala en 29% (IC95%: 25-34%).

Conclusiones: Las principales áreas de mejora detectadas son: la exploración física, el diagnóstico de presunción o motivo de consulta y la justificación de la demanda de consulta preferente. El análisis de las causas de esta baja cumplimentación es el siguiente paso para optimizar la información sobre el paciente.

EXPERIENCIA DE ENFERMERÍA EN EL TRIAGE INFORMATIZADO. CALIDAD DE REGISTRO.

D. Agós Romeo, R. Lizarraga Díez, A. Ezquieta Ozcoide, I. Gómez Muñoz, M. Armendariz Ibarrola y F. Olabarrieta Zaro

P-103

Palabra clave: Historia Clínica Informatizada. Triage. Urgencias.

Objetivo: Valorar la calidad del Registro Informatizado recientemente incorporado en el triage del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Camino.

Material y método:

Tipo estudio: descriptivo transversal.

Período: 5 de Noviembre del 2001 hasta el 31 de Mayo del 2002, Análisis fichas de triage de Urgencias cumplimentadas por la enfermera coordinadora utilizando Historia Clínica Informatizada (HCI).

Variables: Motivo Consulta, Gravedad, Ubicación espera., Asignación atención, Alergias, Procede de, Medio de llegada, Autonomía, Acompañamiento, Aviso previo SOS y si Volante/Informe médico.

Base de datos: Excel (Office,97) de Microsoft y Explotación del propio Soporte de HCI.

Resultados: Pacientes admitidos: 35.963 en Urgencias adultos Fichas realizadas: 38.245 (incluyen derivaciones desde Urgencias de Pediatría)

Fichas mal identificadas: 62 (0,17%) sin nº de caso.

Cumplimentación: Motivo de Consulta 99,08%; Gravedad 96,40%; Ubicación de Espera 96,95% y Asignación de Atención 100,47%. En el apartado Alergias se registraron el 87,05% de casos (dato no siempre disponible), Procedencia el 98,51%, Medio de llegada el 92,20%, Autonomía 91,34% y Acompañamiento el 82,03%. Los apartados Aviso de SOS (65,97%) y Volante Médico (73,55%) registrados en ocasiones solo si la respuesta es afirmativa.

No existen grandes variaciones a lo largo de este período y desde el segundo mes se alcanzan las cifras que hoy mantenemos. Estos resultados mejoran de manera importante los registros manuales.

Dificultades del sistema: cortes del suministro eléctrico, caídas del sistema informático; no implantación en área de Pediatría y Toco-Ginecología.

Conclusiones: La calidad, grado de cumplimentación, accesibilidad y explotación de los datos es alta.

A pesar de las dificultades existentes y de las posibles mejoras, es un sistema de información muy válido.

INFORME DE ALTA DE ENFERMERÍA EN LA VÍA CLÍNICA DE LA HERNIA DISCAL LUMBAR

M.J. Ruano Santa Engracia, I. Izquierdo Membrilla y A.B. Jiménez Muñoz

P-104

Palabras clave: Hernia Discal. Vía Clínica. Informe de alta. Formato Semicerrado. Encuesta de Opinión.

Introducción: La patología clínica de la hernia discal lumbar (H.D.L.) al ser predecible y muy prevalente, la hace ideal para realizar una vía clínica. Dentro de la documentación de la vía clínica se ha diseñado un formato para la cumplimentación del informe de enfermería al alta en estos pacientes.

Objetivo: Estudiar la opinión y la utilidad del informe de enfermería estándar a través de un cuestionario a todos los profesionales de enfermería del servicio de neurocirugía de un hospital terciario.

Método: Estudio transversal descriptivo de la opinión. Evaluación a través de un cuestionario sobre el informe de enfermería al alta. El cual ha sido elaborado con un formato semicerrado. Se han medido variables sociodemográficas y estadísticas. La encuesta ha sido pasada a todos los profesionales de enfermería de los turnos de mañana y tarde del servicio de neurocirugía y la tasa de respuesta ha sido del 100%. La explotación de datos se ha realizado a través del Programa SPSS.

Resultados: La población diana está constituida por 80% de mujeres y 20% de hombres, cuya edad media es de 36,3 (D.S.8,1). La media de antigüedad en el hospital es de 11,1 años (DS 7,47). El 53% de los profesionales opinan que hay que hacer informe de enfermería al alta a los pacientes que precisan continuidad de cuidados, y el 46,7% a todos aunque no precisen continuidad de cuidados. El 100% de los informes se realiza en el turno de mañana. El 57% de los profesionales utiliza medios informáticos para su realización y el 77% tarda una media de 13,56 minutos (DS 4,19) en la cumplimentación del mismo. El 60% tiene constancia de que una de las copias del informe queda en la historia clínica. De los que contestan que hacen el informe el 84,6% entrega personalmente siempre una copia de este informe también al paciente y el 7,7% lo hace en ocasiones. El 64,3% de los profesionales opina que es útil el informe utilizado en la actualidad y que no debería cambiarse. Del 21,4% que si cree que debería cambiarse el 28,6% se inclina por un formato totalmente abierto y el 71,4% por uno semicerrado. Por último el 66,7% opina que el modelo actual recoge todas las necesidades de los pacientes de la vía clínica.

Conclusiones: 1) Casi la totalidad de los profesionales de la unidad neuroquirúrgica opina que hay que hacer informe de enfermería de alta a los pacientes de la vía clínica de la H.D. L. 2) La mayoría está de acuerdo en que el formato estandarizado es útil porque es fácil de llenar, cumple su finalidad de continuidad de cuidados en el alta hospitalaria y cubre las necesidades de los pacientes a los que va dirigido. 3) A la vista de estos resultados podemos deducir que puede ser útil la elaboración de formatos estándares en otras patologías.

VALIDEZ DE LA ESCALA NORTON PARA VALORAR EL RIESGO DE PRESENTAR ÚLCERAS POR PRESIÓN EN UN HOSPITAL TERCIARIO

A. Sánchez Linares, M. Subirana Casacuberta, C. Valls Guallar, R. Cadena Caballero e I. Gich Saladich

P-105

Palabra clave: Úlceras por presión, Norton, EMINA, cuidados de enfermería, registros.

Objetivo: Las úlceras por presión (UPP) representan un gran problema sanitario, con una prevalencia entre el 5-9%. A menudo la aparición de UPP se atribuye a unos cuidados de enfermería de poca calidad, pero la mayoría de veces están relacionadas con la inmovilización por patología y son debidas a potenciales complicaciones que pueden ser prevenidas. Uno de los aspectos de la prevención, es la valoración del riesgo de aparición de UPP. El objetivo del estudio es validar la utilidad la escala Norton en nuestro ámbito y en función de los resultados plantear el cambio a una nueva escala de medida de riesgo.

Metodología: Se diseña un estudio observacional, transversal y retrospectivo. Se incluyen todos los pacientes hospitalizados y se excluyen los pediátricos, psiquiátricos, obstetricia y los que en el momento del ingreso presentan UPP. Para obtener una muestra representativa analizamos los datos de tres cortes transversales (G1, G2, y G3). Las variables del estudio fueron: 1) la evaluación del riesgo con la escala Norton y 2) la presencia o no de UPP aparecidas durante el período de ingreso hospitalario que se valoró a la semana de realizar la evaluación del riesgo.

Resultados: Se han estudiado un total de 865 pacientes distribuidos en G1 (277), G2 (288) y G3 (300). La distribución de úlceras fue, G1: 6 pacientes (2,1%), G2: 14 (4,8%) y G3: 12 (4%) y la puntuación media de la escala Norton: G1: 17 ± 3,2, G2: 16,7 ± 3,4, y G: 16,8 ± 3,2. La prueba del Chi cuadrado no muestra diferencias significativas entre los tres grupos ni en el número de pacientes ni en el número de UPP. Tampoco existen diferencias significativas en la ANOVA al comparar la puntuación de la escala Norton en los tres grupos. La regresión logística de la escala Norton versus la presencia o no de úlceras por presión a los 7 días muestra una clara significación estadística ($p < 0,0005$). El valor de la OR fue de 0,707, (IC del 95% 0,647-0,772) indicando este valor que el incremento del valor de la escala Norton es un factor protector. El mejor punto de corte del valor de Norton para predecir el riesgo de aparición de úlcera es de 14, coincidiendo con lo descrito en la literatura.

Discusión: Se objetiva que la escala Norton, es una herramienta eficaz en un hospital terciario. En los tres grupos existe una tendencia a la disminución de la prevalencia de UPP a pesar de que no son significativas. Estas mejoras las atribuimos a la realización de medidas de formación entre los cortes 2 y 3. Si comparamos los resultados del estudio con los datos publicados referentes a una nueva escala de medición de riesgo (EMINA), no parece que este indicado plantearse el cambio de escala en nuestro medio ya que los resultados obtenidos son similares en términos de capacidad de predicción.

LOS PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO: UN ASPECTO BÁSICO DE LA ASISTENCIA QUE DEBE SER EVALUADO

C. Caamaño Vaz, E. Jara González, A. Hernández Rivas, N. Quiñónez Higuero, R. García Martín y A. Sainz Rojo
Hospital Puerta de Hierro.

Palabras clave: Documentación en Enfermería. Planes de Cuidados.

Objetivos: 1) Evaluar la calidad de la cumplimentación del registro de Valoración de Enfermería al Ingreso del paciente. 2) Definir e implantar el registro de los Planes de Cuidados para el Paciente con Problemas Médicos, el Paciente Quirúrgico y los Problemas de Colaboración.

Metodología: Registro de Valoración de Ingreso: 1) Audit prospectivo de cumplimentación en abril de 2002. 2) Población: Ocho pacientes por Unidad elegidos al azar que suman un número total de 136 pacientes, el 27% de los paciente ingresados en las 17 Unidades de hospitalización. 3) El instrumento de medida fue un cuestionario con diez ítems, uno por cada Patrón Funcional de Salud. Se excluye el de Sexualidad y Reproducción por diseño incompleto.

Registro de Planificación de Cuidados, elaboración de los registros: 1) Grupo de Trabajo Comisión de Cuidados. 2) Selección de Metodología: Taxonomía NANDA para Diagnósticos Enfermeros y Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 3) Consulta bibliográfica. 4) Elaboración de tres registros. 5) Presentación a las Supervisoras de las Unidades. 6) Distribución por las Unidades para su análisis y sugerencias. 7) Presentación a todas las enfermeras (asisten un total de 210) en ocho sesiones, donde se expone el fundamento, la metodología y las normas de cumplimentación del registro. 8) Implantación del Registro en las 17 Unidades de Hospitalización en el mes de junio.

Resultados: 1. Audit de Cumplimentación del Registro de Valoración: Registros evaluados: 136, el 27% de los pacientes ingresados. Índices de cumplimentación por Patrones Funcionales de Salud:

La valoración de los cumplimientos ha sido: a) Percepción y Mantenimiento de la Salud: 76,71%. b) Nutrición y Metabolismo: 69,85%. c) Eliminación: 79,04%. d) Actividad/ejercicio: 74,56%. e) Descanso/sueño: 76,83%. f) Cognitivo perceptual: 83,08%. g) Autoconcepto/autocapta: 83,08%. h) Rol/relaciones: 77,57%. i) Adaptación y tolerancia al estrés: 68,75%. j) Valores y creencias: 74,26%.

2. Plan de Cuidados: Elaboración e implantación de los registros en las 17 Unidades de Hospitalización de: a) Plan de Cuidados del Paciente con Problemas Médicos: adulto, crónico y anciano con cinco diagnósticos enfermeros y del Paciente Quirúrgico con cuatro diagnósticos enfermeros. b) Problemas de Colaboración, con ocho complicaciones potenciales, común para los dos Planes de Cuidados.

Conclusiones: Consideramos que los registros de enfermería son herramientas imprescindibles para dar unos cuidados de calidad. Los resultados globales de la valoración al ingreso se consideran bastante adecuados, aunque algunas unidades presentan unos datos bastante inferiores a la media, siendo estas unidades donde debemos centrar las acciones para mejorar la calidad. Está pendiente la evaluación de los planes de cuidados que se acaban de implantar.

P-106

CUMPLIMENTACIÓN DEL REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE ULCERAS POR PRESIÓN

J.I. Castillo Lorente, A.M. Soria Albacete, Y. Capel Bonachera, I. Urrea Gilabert y J.D. Martínez Díaz
Hospital de Poniente, Servicio Cuidados Críticos.

Palabra clave: Úlceras por presión, cumplimentación de registros, adhesión a protocolos.

Introducción: Todo protocolo debe de llevar implícito un registro de actividades que manifiesten su seguimiento y sirva como base para posteriores estudios y evaluaciones del mismo protocolo. La cumplimentación del mismo no asegura la calidad de las aplicaciones, refleja la aceptación de su contenido, dificultades para la aplicabilidad y puede ayudar a detectar puntos de mejora para posteriores modificaciones.

Objetivos: Valorar el grado de cumplimentación del registro de seguimiento de UPP. Detectar puntos de mejora del registro de seguimiento de UPP.

Método: Estudio descriptivo retrospectivo que evalúa los registros de UPP, período: 01/01/2001 al 31/12/2001. Se determinaron una serie de criterios de cumplimentación del registro. También incluimos la revisión de historias clínicas de aquellos pacientes que no constaban en la base de datos de incidencia de UPP de UCI para evitar posibles pérdidas de información (ya que no teníamos datos sobre el desarrollo o no de UPP durante su estancia en UCI ni sobre el empleo de registro).

Resultados: El total de la población incluida en el protocolo fue de 20 pacientes (es decir, que desarrollaron UPP) sobre 473 ingresos anuales. Se evaluó el 100% de los registros.

El índice de cumplimentación global fue del 91,91%, resultando por criterios:

- Cumplimentación de los datos del paciente: 100%
- Identificación del enfermero: 27,27%
- Localización de la UPP: 100%
- Análisis de los factores de riesgo para desarrollar upp: 100%
- Determinación de medidas de prevención: 100%
- Descripción del grado de la upp: 100%
- Tamaño de la upp: 100%
- Explicación del tratamiento a seguir: 100%
- Evolución de la upp: 100%

Conclusiones: Destacar el alto grado de cumplimentación obtenido favorecido por la existencia de un registro específico. Preocupa la incorrecta identificación del enfermero, punto que consideramos de especial importancia y que se tratará de solventar añadiendo un lugar específico del registro para firmar las anotaciones que se realicen.

P-108

HOJA DE MONITORIZACIÓN DEL PIE DIABÉTICO. ESTUDIO DE LOS PRIMEROS 6 MESES DE APLICACIÓN

F. Gallart Company, C. Aguilar Martín, G. Cid Espuny, R. Lluís Gavalda y J.E. Vidal Ruiz

P-107

Palabra clave: Pie diabético, registros enfermeros, monitorización, evaluación.

Objetivos: Valorar los 6 primeros meses de aplicación de una hoja de registro y monitorización del pie diabético, evaluando los datos recogidos y la relación de la intervención en el control general del paciente diabético.

Metodología: Población: muestreo consecutivo de los diabéticos tipos 1 y 2, en la consulta programada de enfermería, de una población rural de 800 habitantes (64 diabéticos diagnosticados, de los cuales en el presente estudio se valoran 34).

Material: Hoja de control del Pie Diabético diseñada a partir de las recomendaciones del GedapS (Grupo de Estudio de la Diabetes en la Atención Primaria de Salud).

Método: Recogida de información de la hoja y de la historia clínica en una base de datos.

Resultados: De los 34 diabéticos estudiados los resultados más relevantes son: el 52,9% presenta algún tipo de alteración cutánea y un 26,5% presenta deformidades en el pie. Un 5,9% presenta algún tipo de lesión y un 23,5% hiperqueratosis. Se observa también un 26,5% de personas sin sensibilidad vibratoria y un 11,8% sin sensibilidad térmica. Un 29,4% presenta ausencia de pulsos tibiales y pedios y se les realiza oscilometría, mientras un 79,4% presenta unos valores de 6 puntos en la prueba del monofilamento 5,07.

Según la valoración de: monofilamento, presencia de deformidades y de lesiones cutáneas se aplica el protocolo de prevención de pie diabético del GedapS, según el cual un 70,6% de la muestra presenta un riesgo bajo y el resto un 29,4 un riesgo moderado/alto, este índice es usado también para valorar la derivación y los nuevos controles a realizar.

En todos los casos se ha realizado educación sobre el cuidado y autocontrol de los pies.

El porcentaje de diabéticos con una HbA1c < 7 en nuestro estudio es de 85,7%, mientras que en una muestra de diabéticos del resto de la SAP (n: 714) es del 67,4%, con una diferencia porcentual del 17,9% (I.C 95% 5,5%-30,3%)

Conclusiones: Los resultados obtenidos parecen confirmar la utilidad de la hoja de registro en la estandarización del control que posibilitará la evaluación de las intervenciones realizadas, y la consecución de mejores niveles en la calidad asistencial del paciente diabético.

ANÁLISIS DE REGISTROS DE ENFERMEROS EN VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI)

M.A. Muñoz Caballero, J.J. García Morales, I. Puertas Vázquez, A. Moya García, C. Muñoz Caballero y A. García Salas

P-109

Palabra clave: Registros, VMNI.

Objetivo: a) Conocer si está registrada la tolerancia a la VMNI.

b) Si en caso de que exista registro este se recoge como la intervención enfermera DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD.

c) Si las actividades que ejecutamos para aumentar la tolerancia se recogen.

Material y método: Análisis descriptivo retrospectivo de historias de pacientes (se obtienen de la base de datos de la unidad) que entre julio 1997 a septiembre 2001 fueron sometidos a VMNI. Se revisa la gráfica buscando los comentarios de enfermería donde se haga alguna alusión de la tolerancia o intolerancia a la VMNI relacionando esta con la ansiedad.

Resultados: De los 229 pacientes estudiados 81 (35,37%) tienen recogido en el relevo de enfermería algún dato relativo a la ansiedad o a la tolerancia de los pacientes a la VMNI.

En ninguno de los casos se recoge como DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD.

De los 81 pacientes en los que se recogen la tolerancia, 15 (18,57) contemplan alguna actividad que fomente la disminución de la ansiedad o aumente la tolerancia tales como:

Explicar detenidamente

No retirarse en los primeros minutos.

Proporcionar un ambiente los más relajado posible.

Conclusiones: Aunque la práctica nos dice que es fundamental nuestra intervención para la tolerancia de la VMNI, existen pocos registros sobre la misma. Aunque algunas actividades coinciden con las descritas en la intervención "DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD", estas se realizan sin mencionar la misma.

Hemos propuesto un registro específico para pacientes con VMNI en el que se incluye esta intervención, marcando los resultados esperados, y las actividades que debemos ejecutar. Sus resultados se mostrarán posteriormente.

CUMPLIMENTACIÓN DEL REGISTRO DE ALTA DE ENFERMERÍA

J.I. Castillo Lorente, A.M. Soria Albacete, Y. Capel Bonachera, I. Urrea Gilabert y J.M. Martínez Giménez
Hospital de Poniente-Servicio Cuidados Críticos.

P-110

Palabra clave: Continuidad de cuidados, alta de enfermería, cumplimentación de registros.

Introducción: La continuidad de los cuidados es piedra angular y talón de Aquiles de la atención que presta la Enfermería a sus pacientes, tanto en atención especializada como en el ámbito de primaria. Entre los instrumentos de los que disponemos para evitar la discontinuidad de cuidados en los pacientes al pasar de un elemento a otro del hospital (paso de la Unidad de Cuidados Intensivos a Hospitalización) se encuentra el documento de Alta de Enfermería, cuya correcta cumplimentación ayuda a prestar una atención sin omisiones, interrupciones o continuas repeticiones de información.

Objetivos: Determinar el grado de cumplimentación del registro de Alta de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Método: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en el período comprendido entre 01/01/2001 al 31/12/2001. La muestra de registros analizada fue elegida aleatoriamente del total de pacientes ingresados en el citado período (473), para un nivel de confianza del 90%, constituyendo un total de 55 registros.

Se determinaron una serie de criterios de cumplimentación que consideramos de especial importancia según la bibliografía consultada. Se evaluó la presencia o ausencia de los criterios en el registro.

Resultados: El 100% de la muestra fue dada de alta de la unidad a otro servicio con su correspondiente registro de Alta de Enfermería.

El índice de cumplimentación total es de 98,13%, siendo los criterios analizados los siguientes:

- Datos de filiación: 100%.
- Legibilidad: 100%.
- Identificación del enfermero que realiza las anotaciones: 90,69%.
- Transcripción del tratamiento médico con fecha y hora de última dosis v administrada y anotación de cuidados: 100%.
- Determinación de la dieta tolerada: 100%.

Conclusiones: La cumplimentación del registro de Alta de Enfermería es muy satisfactoria.

Cabe señalar la falta de cumplimentación del Alta de Enfermería en los casos de alta por éxito, quizás porque en estos casos nuestro registro no aporta información que no contenga la gráfica de seguimiento de la unidad o por la ausencia de continuidad de cuidados en estos casos.

EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA

M. Rodríguez Díez, P. Fernández Arias, P. García Rodríguez, C. Pendás Álvarez y H. Lara Sánchez
Hospital de León, Dirección de Enfermería.

P-112

Palabra clave: Registros de Enfermería.

Objetivo: Homogeneizar los Registros de Enfermería en el Hospital de León estableciendo comunicación escrita entre los miembros del grupo, facilitar la realización de Cuidados de Calidad, garantizar un mecanismo de evaluación de los Cuidados Individuales del paciente.

Metodología: Dimensión Calidad Científico-Técnica

Población a estudio: Todas las H.C. de los enfermos ingresados en el Hospital de León.

Período de Estudio: Año 2001

Tipo de Estudio: Retrospectivo

Tipo de muestra: Aleatoria

Tamaño de la Muestra: 1.045 Historias Clínicas

Estándar: 81%

Fórmula del Indicador: nº de H.C. que cumplen el Estándar/nº de H.C. evaluadas

Resultado: 99,80%

Conclusiones: Como se demuestra en el Estudio, la Enfermería del Hospital de León registra todos los datos de la Hoja de Valoración de Enfermería, en la que se reflejan las necesidades del paciente según el Modelo de Virginia Henderson.

MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA

L. Arantón Areosa, M.C. Carballal Balsa, A. Rodeño Abelleira, M. Varela López, M. Quintián Méndez y M. Tenreiro Rodríguez
C. H. Arquitecto Mardice.

P-111

Palabra clave: Calidad, Registros, Enfermería, Cuidados.

Introducción: Los registros de enfermería representan uno de los principales indicadores de calidad del trabajo enfermero y constituyen el instrumento básico de desarrollo de nuestra labor profesional, (permiten recoger la información del estado del paciente, detectar los problemas que presenta, planificar y registrar los cuidados que precisa, así como evaluar y modificar si es preciso, los cuidados dispensados). También suponen una base de datos importante para la actividad investigadora de enfermería y un respaldo legal frente a posibles demandas. Muchos datos, sin embargo, podrían estar perdiéndose y/o duplicando, lo que podría alterar la transmisión de información en el equipo y poner en peligro la continuidad de los cuidados enfermeros.

Objetivo: Evaluar los registros de enfermería en nuestro Centro, para determinar y desarrollar, si cabe, las medidas correctoras necesarias, que garanticen la adecuación a nuestra realidad profesional.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo. análisis cuanti-cualitativo de las variables, documentación, identificación, monitorización, técnicas, medicación, cuidados y registros documentales, en 54 historias clínicas de pacientes hospitalizados. en función de la análisis bibliográfico realizado, se identifican las áreas de mejora y se establece su abordaje mediante la técnica cualitativa de consenso dentro del equipo investigador.

Resultados: Los parámetros con mayor índice de cumplimentación corresponden a monitorización y medicación administrada. Los cuidados de enfermería no aparecen registrados con frecuencia, aunque es obvio que se han aplicado; La evolución e incidencias de enfermería no siguen una estructura uniforme y con frecuencia duplican información ya reseñada. Tras el análisis de las áreas de mejora evidenciadas, se comunican los resultados a los responsables de unidad, proponiendo para su abordaje la realización de sesiones clínicas de enfermería, en cada planta, como forma de individualizar las acciones correctoras.

Conclusiones: Enfermería tiende a registrar más aquellos parámetros o técnicas relacionados directamente con intervenciones interdependientes, relegando sus observaciones y cuidados a un segundo plano; posiblemente minusvaloran su actividad o simplemente encuentran dificultades ("falta de tiempo", "carencia de metodología"). El abordaje de las áreas de mejora de forma específica en cada unidad, permite que las medidas a adoptar sean más específicas, lo que sin duda incrementa las posibilidades de éxito.

PROPUESTAS DE MEJORA EN CURSOS DE SOPORTE VITAL (SV) BASADAS EN ENCUESTAS DE CALIDAD

M.A. Muñoz Caballero, J.J. García Morales, I. Puertas Vázquez, A. Moya García, I. García Morales y A. García Salas

P-113

Palabra clave: SVA.

Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción del personal sanitario participante en un programa de formación continua en paciente crítico, y con ello establecer vías de mejora.

Material y método: Se revisan encuestas de calidad de cursos de SV, que se cumplimentan por los alumnos de manera anónima, buscando las puntuaciones máximas y mínimas.

Esta encuesta, diseñada por el director de docencia del hospital, consta de tres partes bien diferenciadas, como son: 1. Evaluación global del curso, 2. Evaluación nominal del profesorado, 3. Encuesta abierta.

Resultados: Se revisaron 271 encuestas divididas en: 3 cursos de SVA para FE, 3 cursos de SVA para DUE, 2 cursos de monitores en SVB para DUE, 4 cursos de SVB para AE y celadores.

En una escala de 1-10, todas las puntuaciones fueron por encima de 9. De todos los encuestados, independientemente de su categoría profesional, destaca una valoración muy alta para la definición de objetivos y el cumplimiento de horarios (10 en toda las encuestas), siendo más críticos para la duración del curso (menores de 9,2).

En los FE, las puntuaciones > 9,8, son para el modelo del curso; < 9,5 para el horario y la duración del curso.

En los DE, puntuaciones > 9,6 para la organización del curso; < 9,1 para la adecuación del material al nivel del alumno.

En los monitores de SVB, lo mencionado para todas las categorías

En los AE y celadores, puntuaciones > 9,6 para el horario; < 9,3 para el material y la organización del mismo.

Todos los docentes son puntuados por encima de 9, siendo mejor puntuadas las clases prácticas que las teóricas, y teniendo puntuaciones de 10 para los megacodes.

Conclusiones: Atendiendo a los resultados, las vías de mejora son:

- Aumento de la duración de los cursos de SVAC, una jornada más.
- Entrega de la documentación del curso con 15 días de antelación.
- Establecer mejoras en las vías de comunicación entre la organización y los futuros alumnos.

- Dadas las características de nuestro centro, por el momento no se pueden realizar actuaciones sobre los horarios.

CALIDAD DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA GRAFICA DE ENFERMERÍA

J.I. Castillo Lorente, A.M. Soria Albacete, Y. Capel Bonachera, I. Urrea Gilabert y J.F. Cara Martín
Hospital de Poniente- Servicio Cuidados Críticos.

P-114

Palabra clave: Continuidad de cuidados, gráficas de enfermería, cumplimentación de registros.

Introducción: Las gráficas de enfermería son un documento importante para el control de la situación clínica del paciente, para garantizar la continuidad de cuidados de enfermería así como un documento legal de la asistencia prestada al usuario.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de la cumplimentación de las gráficas de enfermería de UCI en base a criterios de calidad científico-técnica, de tipo normativo-explicativos, analizando datos de proceso; fuente de datos: listado de pacientes ingresados en UCI, muestra evaluada: gráficas de enfermería correspondientes a 54 pacientes obtenidos de forma aleatoria sobre un total de 473 ingresos para un nivel de confianza del 90%, período: 01/01/01 a 31/12/01, no excluyéndose ninguna de las historias valoradas.

Resultados: El índice de cumplimentación general resultante es de 95,66%, desglosándose de la siguiente forma:

- Incidencias individualizadas: 88,8%. Hemos considerado aceptable no llenar este apartado en casos de alta a planta con incidencias correctamente cumplimentadas en el documento de alta de enfermería. El principal motivo de no-consecución de este criterio es no escribir incidencias en caso de éxitus.
- Firma o identificación escrita del enfermero responsable del paciente: 96,29%.
- Anotación de constantes: 96,29%.
- Anotación de parámetros: 96,29%.
- Anotación de medicación administrada: 96,29%.
- Datos de filiación: 100%. Hemos aceptado la no-inclusión del teléfono de los familiares en la gráfica como válida pues esta información se encuentra disponible en la hoja estadística clínica del paciente.

Conclusiones: Aunque el grado de cumplimentación obtenido resulta satisfactorio, es preocupante el hecho de que se suela dejar sin llenar algunos datos de la gráfica en caso de éxitus del paciente, por lo que creemos conveniente sensibilizar al personal al respecto debido a lo serio del error y las repercusiones legales que puede acarrear.

CONSOLIDANDO LA CALIDAD: ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA Y UTILIZACIÓN DEL PROCESO DE CUIDADOS

C. Llamas Urrutia Grupo Referentes Proyecto Profesionalización SAP Sant Martí.

P-116

Objetivo: Conocer la utilización del Proceso de Cuidados (PC) y su posible relación con otras actividades de enfermería.

Diseño: Descriptivo transversal.

Ámbito: Atención Primaria (AP) urbana.

Sujetos: 116 enfermeras de medicina general de 10 equipos AP (EAP).

Medidas: Utilización PC con sus cinco etapas mediante auditoria de las visitas de atención domiciliaria (ATDOM). Con el Sistema Informático de AP (SIAP) se han obtenido las actividades/enfermera/año. Sólo hemos considerado las visitas programadas, los domicilios y las extracciones sanguíneas. Los datos se han agrupado según EAP y fecha apertura de éstos.

Resultados: Se realizaron un total de 517 auditorias (89,1%). Utilización del PC: No se utiliza completo, las etapas aparecen registradas de forma desigual (valoración 52,5%, diagnóstico 33,4%, planificación 23,2%, ejecución 69,6% y evaluación 3,5%). Por EAP observamos que se utiliza más el PC en los 5 más antiguos (excepto en un caso atribuible a la falta de potenciación por parte de la dirección del EAP) que en los 4 que llevan menos de 5 años funcionando. Actividades: No hay diferencias estadísticamente significativas en las extracciones ni en los domicilios. Si las hay en la programada del centro entre los 6 EAP más antiguos (promedio: 1111 programadas/enfermera/año) y los 4 de reciente apertura (1870 programada/enfermera/año).

Conclusión: No se utiliza de forma correcta el PC.

Aparece una relación significativa según antigüedad de los centros (excepto en un caso):

Los más antiguos realizan menos programada pero utilizan más el PC, en los EAP nuevos ocurre a la inversa.

ANÁLISIS DE CALIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA

J. Ródenas Checa, R. Murillo Murillo, J. Contreras Gil, M.I. Argemí Campuzano y A. López Gálvez

P-115

Palabra clave: Registros de enfermería, Calidad, Documentación clínica.

Objetivos: 1) Analizar el nivel de cumplimentación de la hoja de valoración de necesidades en las unidades de medicina interna del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 2) Determinar las causas que intervienen en la no-cumplimentación de dicha hoja. 3) Diseñar medidas que permitan mejorar el nivel de cumplimentación.

Metodología: Para el primer objetivo se realizó un análisis descriptivo de la hoja de valoración de necesidades en las unidades de medicina interna, seleccionando una muestra aleatoria de las historias de enfermos ingresados en dichas unidades durante el primer trimestre del año. Los parámetros a valorar son aquellos que la institución incluye en su manual de procedimientos. En dicho impreso se incluyen siete de las catorce necesidades propuestas por Virginia Henderson, esto se debe a que son las que con mayor frecuencia se encuentran alteradas, el resto de necesidades se recogerá si se produce una manifestación expresa por parte del enfermo o es detectada por la enfermera/o.

Las variables estudiadas son las siguientes: letra clara, fecha, motivo de ingreso, alergias, entorno familiar, necesidad de respiración, de alimentación, de eliminación, de higiene y estado de la piel, de reposo, de comunicación y seguridad; nombre, firma legible y turno del enfermero/a.

Para el segundo objetivo se elaboró un cuestionario destinado a los profesionales de enfermería de dichas unidades, pendiente de obtener los resultados.

Resultados: De una muestra de 81 episodios de hospitalización en Medicina Interna sobre un total de 830 pacientes, accedimos a 67 (82,71%), se han cumplimentado 51 hojas de valoración de necesidades básicas (76,12%) y 16 no (23,88%).

Las variables de mayor a menor oportunidad de mejora son: nombre y firma legible del enfermero, seguridad, turno, motivo de ingreso y entorno familiar, que acumulan el 56,8% del total de incumplimientos.

Conclusiones: Hay más de un 38% de no-cumplimentación de las variables que recoge la hoja de valoración de necesidades básicas de enfermería. Considerando muy conveniente una intervención precisa que garante la calidad de los datos, en base a la trascendencia que esta información tiene, para el desempeño de la función propia de este colectivo.

SISTEMA DE INFORMACIÓN CUALITATIVA - CUANTITATIVA DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA, PARA LA MEJORA DE LAS DECISIONES

P. Pérez Company y D. Cosials Pueyo
Hospital Vall d'Hebron, Pabellón Docente (1^a Plta.)

P-117

Palabra clave: Información, gestión, cuidados.

Objetos: Estructurar la información sobre los cuidados, sus resultados y los recursos, de tal manera que permita avanzar en el conocimiento del producto enfermero y de la calidad de su prestación al mismo tiempo que ayude a mejorar los problemas que se observan.

Metodología: Se reúne la información cualitativa y cuantitativa del producto, describiendo sus distintos elementos para ofrecer una lectura global y a la vez específica. Se identifica el mínimo común múltiplo informativo que permite ofrecer elementos de gestión.

La propuesta se desarrolla teniendo como eje central la aplicación de la función de cuidar concretada en planes de cuidados estándares y su uso como instrumento de información. La información se obtiene del proceso de atención: la situación previa del paciente, la inicial del proceso, el perfil diagnóstico; los diagnósticos, los problemas interdependientes y las complicaciones, la planificación; resultados esperados y tratamiento, el perfil al alta.

Mediante la casuística se fijan poblaciones de tipo homogéneo y excepciones a esa línea, incidentes, errores, complicaciones ocurridas durante el proceso, los medios que se habían previsto y los que se han utilizado, el tiempo y los costes.

Resultados: 1) Elaboración del contenido de la información en dos niveles diferenciados; la clínica y de gestión. Por epígrafes: Actividad, Calidad, Personas, Coste, etc. Conteniendo los siguientes elementos: concepto, fuente, cifras básicas para el cálculo, indicadores intermedios, indicadores finales. 2) Cuadros de mando también diferenciados, construidos de forma que señalan los puntos fuertes y débiles, las comparaciones estándar - real, la posición relativa, tendencias.

Conclusiones: La elaboración de un único bloque de información que interrelacione todos los elementos imprescindibles para la toma de decisiones puede ayudar a conocer y a mejorar luego, la calidad de los cuidados.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA INFORMATIZADOS EN PLANTAS DE HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS

S. García Velasco Sánchez Morago, E. García Puente y A. Fernández Simancas

P-118

Palabras clave: Cuidados de enfermería, planes de cuidados, Enfermería, registros informátizados.

Objetivo: Valorar los cuidados de enfermería reflejados mediante una herramienta informática como es el programa GACELA de Tecnogest en dos plantas de hospitalización del área quirúrgica. Este programa nos ha permitido introducir en el Hospital la metodología de planes de cuidados (PC), tan necesaria en nuestros días, además de permitirnos sustituir los registros clásicos de papel de la historia de enfermería (gráfica, valoración y comentarios de enfermería, control de pruebas).

Método: El Complejo Hospitalario de Ciudad Real es un hospital del Grupo II formado por dos Hospitales (Hospital Ntra. Sra. de Alarcos y Hospital Ntra. Sra. del Carmen) separados apenas por un kilómetro entre sí, con una dotación de unas 500 camas. En abril de 2001 se inicio la instauración de metodología de PC en las unidades de hospitalización, mediante el programa GACELA, basado en el modelo de enfermería de Virginia Henderson, en 5 unidades del Complejo, 4 del Hospital de Alarcos (Cirugía General, Nefrología, Oncología-Hematología y Cardiología) y una del Hospital del Carmen (Especialidades Quirúrgicas). Se describen los PC realizados en las plantas quirúrgicas (Especialidades Quirúrgicas del Hospital del Carmen y Cirugía General del Hospital de Alarcos), debido a ser las dos primeras unidades que comenzaron a funcionar con esta metodología así como a las características similares de los pacientes que reciben.

Resultados: Despues de un año de funcionamiento con PC a través del programa Gacela (desde el 21 de mayo de 2001 hasta el 21 de mayo de 2002), los ingresos que ha habido en las plantas han sido de 3295, realizándose 2251 PC: 768 PC directos (34,12%), 1214 PC estándar (53,93%) y 269 PC individualizados (11,95%). El porcentaje de pacientes a los que se les hace un PC es de 68,32% y la media de paciente con PC es de 1.

Conclusiones: La incorporación de la metodología de PC mediante una nueva tecnología como es los registro informáticos nos han demostrado ser una herramienta válida para su aplicación en los pacientes quirúrgicos de nuestro centro.

Fuente de financiación y conflicto de intereses: (si los hubiese).

DERIVACIONES EXTERNAS POR GRD: UN PROMETEDOR INDICADOR DE EFICIENCIA

R. Díez Caballero, R.M. Tomàs Cedó, Ll. Colomés Figuera y Ll. Nuñalart Berbel

Grup SAGESSA. Epidemiología, Evaluación.

P-119

Palabra clave: Derivación, GRD, hospital, productos intermedios.

Introducción: La puesta en marcha de un nuevo sistema informático el 1/8/01, nos brindó la oportunidad de explotar los datos de las derivaciones externas (a otros centros) de pacientes para pruebas, visitas y tratamientos no disponibles en nuestro hospital. La posibilidad de relacionar derivaciones con el GRD del paciente permitiría conocer el perfil por patología.

Objetivos: a) Determinar la factibilidad de relacionar los GRD y las derivaciones de hospitalización. b) Conocer la distribución por tipo y GRD.

Método: Derivación de hospitalización se ha definido como aquella solicitada durante el ingreso y los 7 días posteriores al alta. Para un hospital comarcal (con mayor frecuencia de derivación externa) se han seleccionado las derivaciones y altas (CMBDAH) desde el 1/8/01 al 30/4/02. Se han relacionado por el número de asistencia, separadamente para visitas y pruebas o tratamientos. Se han utilizado: el paquete Clínico (versión GRD: HCFA 16.0), consultas MSAccess y MSExcel.

Resultados: En 9 meses se han solicitado un total de 174 derivaciones en 1.191 episodios de hospitalización, distribuidos en 77 GRD diferentes. El 25% de las derivaciones se concentraban en sólo 7 GRD y el 75% en 36 GRD. El GRD que acumulaba mayor número de derivaciones fue el 243 (patología columna): un 6,3%. El GRD 239 (neoplasia músculo-esquelética) tenía el mayor índice de derivaciones por alta (88/100 altas), seguido del GRD 206, hepatopatía excepto cirrosis (83/100 altas). Las pruebas o tratamientos (154) se observaban en 68 GRD; en 6 GRD se acumulaban el 25%, y en 30 GRD el 75%. Las visitas derivadas (20) se distribuyeron en 17 GRD (el 25% en 3). El tipo de derivación presentó buena correspondencia clínica con la patología de ingreso.

Conclusiones: La explotación de derivaciones externas por patología (GRD) se ha mostrado factible. Los tipos de derivación solicitados son clínicamente coherentes con la patología; esto apunta a un sistema de información prometedor para evaluar la aplicación de las guías clínicas y para la gestión clínica de los recursos de derivación. Esto último es especialmente relevante en Cataluña donde los hospitales tienen transferido el riesgo financiero de una parte de las derivaciones (productos intermedios).

INFORMATIZACIÓN DE LOS INFORMES DE ALTA DE CIRUGÍA AMBULATORIA EN UN SERVICIO DE UROLOGÍA

M. Iraburu Elizondo, A. Santiago González de Garibay, M. Montesino Semper, J. Jiménez Calvo, A. Muruzábal Martínez y J. Jiménez Aristu

Hospital Virgen del Camino, Medicina Preventiva.

P-120

Palabras clave: Cirugía mayor ambulatoria, Historia Clínica Informatizada.

Resumen: A la hora de iniciar la cirugía mayor ambulatoria (CMA) en nuestro hospital y hacer el análisis de campos de fuerza, una de las fuerzas en contra era la falta de protocolos de alta hospitalaria. La implantación de la Historia Clínica Informatizada (HCI) en los quirófanos permitió diseñar un plan de informatización de los informes de alta de CMA que por extensión incluiría también la cirugía menor ambulatoria.

Objetivos: Cumplimentar la hoja quirúrgica informatizada de cada paciente en el propio quirófano. Confeccionar un informe de alta informatizado que se entregaría en mano a todos los pacientes sometidos a cirugía urológica ambulatoria.

Metodología: Se protocolizaron los informes de los procedimientos quirúrgicos ambulatorios (PQA) más frecuentes y las recomendaciones para el paciente derivadas de éstos. Los médicos del Servicio se comprometieron a cumplimentar en el quirófano las fichas quirúrgica y de recomendaciones para el paciente, estuvieran éstas protocolizadas o no, confeccionando con ellas el informe completo y definitivo que entregarían al paciente en mano.

Resultados: Se protocolizaron los 4 procedimientos principales: cirugía de la incontinencia, vasectomía, circuncisión y elongación de frenillo. De los 580 PQA realizados entre enero de 2001 y mayo de 2002, el 82% tenían protocolizado el informe del procedimiento y el 79% las recomendaciones. En el 100% de los casos se realizó en tiempo real el informe definitivo que fue entregado al paciente en mano quedando toda la información registrada en la HCI. Se logró un registro diferenciado de los PQA mayores (113) y menores (467).

Conclusiones: El nivel de protocolización alcanzado ha sido óptimo. La cumplimentación de la ficha quirúrgica y de la de recomendaciones por el cirujano directamente en la HCI evita retrasos, errores de transcripción y conlleva una mejor gestión de la información. Ha supuesto una mejora en la calidad asistencial conseguir que todos los pacientes sometidos a cirugía urológica ambulatoria recibieran en mano un informe completo, definitivo y reglado que a su vez queda registrado como documento en la HCI. Se han logrado dos registros diferenciados de la cirugía ambulatoria mayor y menor.

ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LA PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

L. Mendarte Barrenechea

P-121

Palabra clave: Error de medicación, dispensación de medicamentos, prescripción preimpresa, bombas de perfusión intravenosa, normas de administración de medicamentos.

Introducción: El Hospital Universitario Vall d'Hebron que cuenta con 1350 camas de hospitalización especializada dispone del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria en el 50% del hospital. En el resto del hospital dispone de un sistema de dispensación individualizada para medicamentos especiales o de alto riesgo y el resto de medicación por el sistema tradicional de reposición de botiquines en planta.

Objetivos: 1) Implantación de un sistema de notificación, registro y análisis de errores de prescripción, transcripción y dispensación para establecer estrategias de prevención de errores y mejora de los sistemas. 2) Disminuir el riesgo de errores de medicación mediante la implantación de un sistema prescripciones y gráficos de administración de medicamentos preimpresos. 3) Disminución de variabilidad en los sistemas de administración de medicamentos en perfusión intravenosa y medicación de alto riesgo de error.

Metodología: Se formó un grupo de trabajo formado por farmacéuticos que elaboró una hoja para la recogida de datos sobre errores de medicación que se dio a conocer a los farmacéuticos del servicio. Los farmacéuticos del servicio notificaron voluntariamente los errores detectados en la prescripción médica en el sistema de dosis unitaria y en las prescripciones de medicación especial. Las enfermeras y médicos de las unidades piloto notificaron errores de dispensación, transcripción y errores inducidos por dificultades en la interpretación de las gráficas de administración impresas informáticamente. También se recogieron errores o potenciales errores de administración notificados espontáneamente por médicos y enfermeras del hospital fuera de las áreas que disponen sistema de distribución en dosis unitaria. Se utilizó la base de datos de la fundación Ruiz-Jarabo 2000 para la recopilación y análisis de los errores y errores potenciales detectados.

Resultados: Se estudiaron un total de 167 errores. 0,59% de los errores que contribuyeron a la muerte del paciente; 1,19% de errores que requirieron la administración de otros medicamentos y/o prolongado la estancia del paciente; 10,07% de errores que requirieron la monitorización del paciente y el 87,52% entre errores que no produjeron lesión y/o circunstancias capaces de producir error. De los errores potenciales un 66% se trataba de errores de sobredosisificación u omisión y un 8,3% de errores por medicamento erróneo ya fuera en la prescripción o la transcripción. Con el objetivo de reducir la repetición de estos errores se han realizado diversas mejoras en el programa de dosis unitaria que permiten la detección de sobredosisificaciones y mejoras en las gráficas de administración de fármacos que ayudan a la interpretación de los fármacos a administrar y evitan omisiones. Además se ha disminuido la variabilidad de la prescripción de bombas de perfusión intravenosa.

Conclusión: La monitorización de los errores de medicación permite el establecimiento de estrategias que ayudan a la disminución de errores con los medicamentos y una mejora de la calidad asistencial.

OPTIMACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN UNA UNIDAD DE CODIFICACIÓN

L. Peña Martínez, B. Salcedo Muñoz, A. Nieve Olasagarré, M. Díaz Calvet, A. Vidan Astiz y M. Iraburu Elizondo
Hospital Virgen del Camino, Medicina Preventiva.

P-122

Palabra clave: Codificación. Sistemas informáticos.

Objetivo: Describir la relación entre un programa de codificación y la Historia Clínica Informatizada (HCl).

Metodología: Se diseña una aplicación informática a partir de enero de 2001 adaptada a las necesidades de la Unidad de Codificación. Posteriormente se relaciona con la HCl en proceso de implantación en el hospital. Se permite así acceder directamente desde la aplicación de codificación al informe de alta de la HCl y a su vez desde ésta a los datos de codificación de las altas hospitalarias.

Resultados: 1) Conocimiento automático de la carga de trabajo. La aplicación muestra el total de altas discriminando las codificadas de las no codificadas. 2) La codificadora emplea más tiempo en cada informe al asumir todo el proceso de codificación: selección, lectura, codificación y grabado del informe. 3) Control de las altas cuyo GRD corresponde a un procedimiento quirúrgico no relacionado con el diagnóstico principal (GRD 468, 477). 4) Disminución de las solicitudes de historias en papel por acceder a todos los datos clínicos de la HCl. 5) Reducción mensual de las altas no codificadas (GRD 470) al no depender de los circuitos de envío. 6) Los servicios médicos acceden a la codificación de los informes elaborados en la HCl. 7) La evolución del trabajo está mediatisada por las incidencias del programa informático.

Conclusiones: 1) La nueva aplicación y su relación con la HCl satisfacen las necesidades de información necesarias para el trabajo en la Unidad. 2) Dejamos de ser dependientes de varios circuitos administrativos e informáticos para serlo de las incidencias de la aplicación actual. 3) El Case Mix mensual se aproxima más al anual del hospital al quedar menos informes sin codificar. 4) La calidad de codificación mejora por la normalización del informe de alta, la aportación de datos de la HCl, la detección automática de errores que ofrece el programa y la disminución de errores de transcripción. 5) La relación entre ambas aplicaciones permite mejorar la calidad de codificación y las bases de datos, por el control que pueden ejercer sobre el circuito los distintos servicios implicados, para beneficio mutuo.

EVOLUCIÓN Y VARIABILIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE IECA Y ARAII EN 5 ZONAS BÁSICAS DE SALUD

N. Nieto Fumanal, R.M. Tomàs Cedó, A. Collado Cucó, L. Ríos Vallés, L.I. Colomés Figuera y L.I. Nualart Berbel
SAGESSA Epidemiología, evaluación e información.

P-124

Palabra clave: Prescripción de fármacos, Atención Primaria de Salud, IECA, ARAII.

Introducción: En Cataluña, el riesgo de desviación presupuestaria de prescripción farmacéutica ha sido transferido total o parcialmente a las Zonas Básicas de Salud (ZBS). Nuestro Grupo gestiona 5 ZBS y monitoriza sus indicadores de prescripción. Los antihipertensivos IECA+ARAI son de interés porque constituyen medicación crónica, de considerable volumen y son un binomio terapéutico: los ARAII, más caros, sustituyen a los IECA solo en indicaciones limitadas. Además, en enero 2001 se introdujeron los precios de referencia (PR) para IECA.

Objetivos: Del conjunto de productos puros de los grupos IECA y ARAII: a) Determinar el efecto de la introducción de los PR sobre los hábitos de prescripción y el gasto. b) Conocer la variabilidad de los hábitos de prescripción entre ZBS.

Material y método: Período: 2000-2001 (3 ZBS) y 2001 (2 nuevas ZBS). Ficheros remitidos por CatSalut de: a) Prescripción mensual por ZBS, facultativo y producto; b) Vademécum de productos (uno por actualización). Se analiza por trimestres, por ZBS y subgrupo (IECA y ARAII): gasto total, PVP medio/envase y % envases ARAII/IECA+ARAI. Programas utilizados: MSAccess, MSExcel.

Resultados: En 3 ZBS (2000-2001): El gasto conjunto de ARAII+IECA no ha disminuido en ninguna ZBS, a pesar de los PR. Para los IECA, el PVP medio ha disminuido. El gasto total IECA ha disminuido, excepto en una ZBS donde ha sido estable por aumento del nº envases. Para los ARAII, han ido aumentando el nº envases y el gasto total. Además, en 2/3 ha aumentado también el PVP medio/envase (a pesar de PVP inviables).

En las 5 ZBS (2001): Los % de ARAII varían ampliamente (de 22% a 42%) entre ZBS, pero a nivel ZBS la variación (al alza) es mucho menor.

Conclusiones: Los PR no han incidido en disminuir el gasto conjunto. El decremento de gasto IECA ha sido compensado por el incremento de gasto ARAII (aumento de nº envases y PVP medio), resultando un gasto total conjunto estable o incluso algo superior. Se observa gran variabilidad en la distribución ARAII+IECA entre ZBS. Un análisis detallado y un proceso de Benchmarking interno contribuiría al conocimiento y reducción de dicha variabilidad.

EL REGISTRO DE TUMORES HOSPITALARIO: UN INSTRUMENTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL ONCOLÓGICA

F. Macià Guià, M. Casamitjana Abella, I. Collet Diví, I. López Tolosa y M. García Carasús
Hospital del Mar, Unitat de Prevenció i Registre.

P-123

Palabra clave: Registro de cáncer; cáncer; indicadores; sistemas de información.

Objetivo: Mostrar la capacidad de un registro de tumores hospitalario para la evaluación y monitorización de la calidad de la atención oncológica hospitalaria, a partir de una serie de indicadores de proceso obtenidos de forma estandarizada y sistemática.

Metodología: El Registro de Tumores del Hospital del Mar (RTHMar) constituye un sistema de información integrado a la red hospitalaria. Se nutre básicamente de dos fuentes de identificación de casos: los informes de anatomía patológica (codificación SNOMED) y los de alta hospitalaria (CIE-9). Cada registro comprende unos 60 ítems, relativos a la identificación y seguimiento del paciente, características del tumor, diagnóstico y tratamiento. Una parte sustancial de dicha información es incorporada automáticamente, por captación de datos ya existentes en el sistema. El resto se obtiene principalmente a través de la Estación Médica de Trabajo, aplicación que permite acceder al historial clínico informatizado de cada paciente. Se utilizan también fuentes de información complementarias como Hematología, Radioterapia, Cuidados paliativos y Comités de Tumores. El seguimiento de los casos, una de las tareas fundamentales de todo registro, se efectúa de forma automatizada. El RTHMar dispone de un programa propio de control de calidad de los datos que garantiza la fiabilidad de los indicadores obtenidos.

Resultados: El total de cánceres registrados en el año 2001 fue de 1.267, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior. En el 93,4% de los casos se trataba de pacientes diagnosticados y tratados en nuestro hospital. El 61,7% procedían de los distritos municipales de referencia. En el 32,4% la vía de entrada fue el servicio de urgencias. Se obtuvo confirmación anatopatológica en el 94,1% de los tumores (85,5% mediante histología). El 43,7% se diagnosticaron en estadio local y el 87,4% recibieron tratamiento oncológico. El intervalo de tiempo transcurrido entre la primera consulta al hospital y el tratamiento fue de 28 días de mediana.

Conclusiones: El RTHMar desempeña un notable papel en la medida, evaluación y monitorización de la calidad asistencial a los pacientes oncológicos. Sería deseable la generalización de dichos instrumentos y el desarrollo y estandarización de los indicadores proporcionados, para posibilitar la comparación interhospitalaria.

COMO INCREMENTAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN CON LA EXPLOTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

M. Cruz Román, M. Boqué Cavallé, F. Oliver Robres, A. Palau Galindo, J. San Miguel San Martín y D. Villarreal Benítez

P-125

Palabra clave: Atención.

Objetivo: En el Área Básica de Salud Reus-V pretendemos mejorar de forma continuada la calidad en la atención a nuestros usuarios, por lo que hemos puesto en práctica, con los recursos y avances tecnológicos que disponemos, diversas acciones encaminadas a conseguir este objetivo.

Metodología: Nuestro centro posee un programa informático de gestión de historias clínicas OMI-AP (Atención Primaria), que permite el registro de los datos de forma sencilla y homogénea y su posterior explotación. Entre las aplicaciones que posee este programa existe OMI-AD que ayuda a estructurar toda la información almacenada. Esta información se exporta a Microsoft Access y se tratan los datos para crear y extraer la información que se necesita.

Resultados: Antes de la entrada en vigor de la Orden del 23 de julio de 2001 sobre recogida de datos del fichero de Prestación Farmacéutica del Servei Català de la Salut, todos los pacientes tenían introducido el Código de Identificación Personal para que así en todas las recetas emitidas informáticamente conste dicho código, indispensable para la dispensación del medicamento. Todos los pacientes de Pediatría cuando cumplen 15 años, se les informa personalmente del cambio a Médico de Familia. Cuando un médico de cabecera se jubila, todos sus pacientes son informados personalmente. Cuando la Agencia Española del Medicamento advierte sobre un tratamiento, se avisa a todos los pacientes con ese tratamiento y se les cita para su revisión. En la Atención Primaria del Grup Sagessa, existe una herramienta para analizar y evaluar a través de unos indicadores diferentes aspectos como los datos de actividad, el nivel de resolución, el consumo de recursos,... La mayoría de estos indicadores se extraen a través de las consultas informáticas.

Conclusiones: Al poseer una base de datos muy depurada, en la que se puede extraer información fiable y comprensible de una forma rápida, esto repercute positivamente en la atención al usuario. Por lo que, en nuestro centro, apostamos por una actitud constante hacia la continua utilización de estos recursos, incrementando así la calidad en la asistencia ofrecida al usuario.

EVALUACIÓN DE MEJORA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EPOC TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS

M.R. Hernández Vera, M.A. Mota Segura, M.E. Gutiérrez Peralta y M. Contreras Oliveros
Centro de Salud Lorca Centro.

Palabra clave: EPOC, Criterios.

Objetivos: Mejorar el diagnóstico de EPOC en el Centro de Salud.

Metodología: Realizamos un ciclo de mejora con evaluación inicial en Mayo de 2001, basada en el cumplimiento de criterios referentes a normas técnicas mínimas de EPOC en los pacientes incluidos en Programa del Centro de Salud Lorca Centro, correspondiendo el presente estudio a la reevaluación tras la implementación de las medidas correctoras. Escogemos una muestra de 70 casos de forma aleatoria. Nuestra evaluación es de carácter interno, retrospectiva y con relación a las personas responsables de extraer los datos es cruzada.

Resultados: Tras la primera evaluación hicimos una reunión de equipo para mostrar los resultados obtenidos y proponer actividades que mejoraran nuestra atención al paciente con EPOC. Accordamos todo el equipo hacer un esfuerzo por depurar el registro del programa ya que en el estudio de causas vimos que esta era una de las principales (no está actualizado e incluimos a enfermos respiratorios que no son EPOC). Otra medida fue una sesión monográfica sobre la realización e interpretación de espirometrías y un recordatorio sobre las normas técnicas mínimas referentes a este programa. En la reevaluación, obtenemos una mejora global de un 30%. Los criterios con mayor mejora hacen referencia a anamnesis sobre infecciones respiratorias previas (mejora relativa de 71,4%), hábito tabáquico (mejora relativa de 66,37%); exploración física: auscultación cardiaca (mejora relativa de 51,83%) y coloración de piel y mucosas (mejora relativa de 27,62%). No se obtiene mejora significativa en realización de espirometría, recogida de datos sobre riesgos laborales ni en presencia de edemas, así como en la realización de exploraciones complementarias (ECG y Rx de Tórax).

Conclusiones: Obtenemos cierto grado de mejora, a pesar de lo cual es insuficiente. La mejora obtenida es a expensas de criterios que evalúan actividades de anamnesis y exploración física. Dado que el criterio diagnóstico para EPOC es espirométrico pensamos que debemos seguir haciendo esfuerzos en dos sentidos: 1) Formación continuada con respecto a EPOC y en la realización e interpretación de espirometría. 2) Actualización del registro de programas de forma que sólo los pacientes con criterios espirométricos aparezcan en el mismo.

P-126**AUMENTAR LA FACTURACIÓN A TERCEROS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TOTANA**

M. Navas Pleguezuelos, J.A. Martínez Castillo, C. Cano Rodríguez, P. Martínez Ruiz y E. Pelegrín Rodríguez
SUAP

Palabra clave: Atención Primaria, Calidad en la gestión de los servicios. Servicios de información.

Introducción: El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Totana atiende pacientes en horario no cubierto por el Centro de Salud. En los contratos-programa previos del servicio se han establecido compromisos para tramitación de formularios de gestión de cobros a terceros que no han podido cumplirse.

Objetivos: Evaluar y mejorar la calidad de la gestión de cobros a terceros.

Metodología: Se analiza el problema mediante un diagrama de causa efecto y se definen tres criterios de calidad, "c1" consta "supuesto facturable" en HC, "c2" consta "cumplimiento de formulario" y "c3" consta "tipo de accidente", especificando aclaraciones y excepciones para cada uno. La fuente de datos ha sido el registro de HC del SUAP de Totana y el marco muestral las hojas de atención cumplimentadas durante el último trimestre de 2001. Se han seleccionado mediante muestreo sistemático aleatorio para "c1" 96 casos (precisión de 10% y nivel de confianza de 95%) y 43 casos para "c2" y "c3" (precisión de 15% y nivel de confianza de 95%). La dimensión estudiada es científico-técnica y la evaluación es interna, retrospectiva y autoevaluada.

Resultados: En la evaluación inicial los cumplimientos han sido 2,08% para "c1", 55,81% para "c2" y 46,41% para "c3". Los incumplimientos han sido 94 para "c1", 42 para "c2" y 13 para "c3". El criterio 1 acumula el 63,9% de los incumplimientos, y los criterios 1 y 2 el 91,28%. Las medidas correctoras han ido dirigidas a informar a los profesionales implicados sobre los procedimientos, la organización y los recursos que facilitan la tramitación con un método participativo y motivador. En la reevaluación los cumplimientos han sido 94,79% (pdif < 0,01) para "c1", 88,37% (pdif < 0,05) para "c2" y 79,07% (pdif < 0,05) para "c3". Los incumplimientos han sido 5 para "c1", 11 para "c2" y 11 para "c3". La disminución de los incumplimientos ha sido de un 81,8%.

Conclusiones: En la gestión de los SUAP existen oportunidades de mejora que pueden abordarse con una metodología sencilla y buenos resultados. Se ha mejorado significativamente por lo que se ha iniciado monitorización; se elige como indicador el nº de facturaciones a terceros por mes.

P-128**HERRAMIENTA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DE DONANTE (IAD)**

J.M. Moreno Cebeira, M.J. Colmenero Ruiz, M.C. Herrero Alonso y J.M. Gasalla Herraiz

Palabra clave: Gestión de Información, Base de Datos, Reproducción Asistida.

Objetivos: Generación e implantación de una herramienta informática para la gestión de la información y la documentación de las muestras de semen de donante de la Unidad de Técnicas de Reproducción Asistida.

Material y métodos: Diseño de una base de datos en Access, multipuesto a través de la red del hospital, protegida con claves de acceso a dos niveles.

Resultados: La herramienta facilita la gestión del proceso de Inseminación artificial con semen de donante (IAD).

Posibilita la consulta en tiempo real de las dosis seminales existentes para las pacientes en ciclo de estimulación.

Permite la reasignación del material (respectando la compatibilidad), optimizando así la gestión de excedentes por suspensiones de ciclos. Integra la información de los resultados clínicos y de laboratorio (seguimiento de los embarazos conseguidos y las tasas de recuperación de espermatozoides móviles).

Permite la consulta del estado de cada dosis específica a tiempo real. Permite un registro de trazabilidad de las IAD por Donante, Banco de semen de procedencia y mujer inseminada.

Proporciona los datos de actividad.

Facilita la gestión económica de asignación de costes al proceso, posibilitando la generación de informes al Área Económico Financiera, con asignación directa al nº de historia que genera el gasto.

Genera informe al departamento de compras para el abono al proveedor correspondiente.

Conclusiones: La utilización de un gestor de base de datos como aplicación interdepartamental es una herramienta útil para la gestión integral del proceso de IAD. Esta aplicación comercial abierta se adapta a las necesidades reales de nuestros procesos. Al estar accesible desde cualquier ordenador integrado en la red del hospital, permite su uso en tiempo real para la consulta o actualización de los datos. Facilita la gestión administrativa inherente al proceso, exigida tanto por la organización como por la legislación.

P-127**DISEÑO DEL NUEVO FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS DEL SUMMA-061**

C. Infante Rodríguez, M.A. Pérez Cuevas, V. Hernández Jaras, C. Jiménez Domínguez, A. Cabañas Martínez e I. Segovia Robles

Palabra clave: Acciones correctivas/preventivas. Registros de calidad. Sistemas de información.

Objetivo: Presentación del diseño del nuevo formato respondiendo a las necesidades de: a) Unificar el registro de dichas acciones. b) Recoger el origen y las causas que las motivan. c) Definir las responsabilidades de quienes las gestionan. d) Marcar los plazos para su implantación definitiva.

Metodología: El formato queda dividido en cuatro apartados:

1. Área de la que proviene la acción: Cada acción lleva un registro numérico que permite su seguimiento individualizado.

2. Apertura: 2.1: Origen: Reclamaciones del usuario. Auditorias. No conformidades detectadas durante el desarrollo de tareas habituales. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.

2.2: Causa: Breve descripción. 2.3: Descripción de la acción propuesta: Puede incluir la elaboración de documentos así como las fases previstas para su correcta implantación. 2.4: Responsable de la gestión e implantación. Siempre del área/áreas implicadas en la acción. 2.5: Fechas inicial y final estimativas de la implantación. 2.6: Aprobación de la acción.

3. Seguimiento: Realizado por el responsable del Área de Calidad. 3.1: Fecha. 3.2: Firma.

4. Cierre: 4.1: Motivo: Si la acción se da por cerrada debe quedar justificado el fundamento de dicho cierre. 4.2: Anexo de evidencias: SI NO. 4.3: Eficacia: Las acciones no eficaces generan una nueva acción.

Resultados: En el año 2001 se abrieron 37 acciones de las que 28 están cerradas. Las nueve restantes se encuentran en fase de implantación.

Conclusiones: 1) El registro unificado agiliza la implantación de las acciones. 2) Favorece el seguimiento de cada acción por parte de una persona responsable de gestionarlas. 3) Resulta, por tanto, una herramienta eficaz.

P-129

Palabra clave: Información rápida y comprensible.

Introducción: La dirección del Centro Médico Quirúrgico de Reus se planteó la necesidad de informar a sus posibles clientes de una manera rápida y comprensible de todo lo que puede ofrecer el centro tanto en servicios como en valores.

Objetivos: Elaboración de un tríptico informativo del centro.

Material y métodos: Se realizó una revisión y recopilación bibliográfica. Se creó una comisión que elaboraron y distribuyeron los distintos ámbitos a introducir en el tríptico asignándose un responsable para cada uno de los temas. Los ámbitos que se decidieron poner en el tríptico fueron: 1) portada con foto del centro, logotipo y bienvenida, 2) descripción del centro, 3) pequeño recordatorio histórico del centro, 4) valores del centro, 5) cartera de servicios, 6) breve información de la estructura del centro, 7) información general, 8) código ético, 9) derechos y deberes del paciente, 10) recomendaciones y servicios que ofrece el centro en caso de ingresos, 11) ubicación del centro: dirección, teléfono, fax, e-mail.

Todos ellos se han distribuido de manera que siguen una lógica. Se pusieron fotos en sitios estratégicos del póster para hacerlo más ilustrativo.

Resultados y conclusiones: Elaboración de un tríptico desplegable con toda la información sobre el centro, de fácil manejo (tamaño bolsillo) y comprensión y visualmente agradable. El tríptico ha sido traducido al castellano, eusquera, gallego, inglés, francés, italiano, alemán, ruso, holandés y árabe, ya que al centro acceden clientes de estas nacionalidades.

VALIDACIÓN DEL REGISTRO DE TUMORES DEL CENTRO ONCOLÓGICO DE GALICIA

M.J. Pita, C. Veiras, J.L. Candal y B. Candia

Palabra clave: Registro, cáncer, tumores.

Introducción: El Registro de Tumores del Centro Oncológico de Galicia es un Registro Hospitalario de Cáncer, que recoge información desde el año 1991. Contiene un total de 18.586 casos, de los que 2194 corresponden al año 2000.

La explotación de la información de este registro para la Gestión de la Calidad del Centro Oncológico requiere de una validación que garantice la fiabilidad de los datos. Por este motivo, y con el fin de obtener de forma automatizada indicadores de calidad, se hace necesario proceder a la validación de su contenido.

Objetivos: 1) Identificar variables críticas para los indicadores de calidad, 2) Evaluar la fiabilidad del contenido de las diferentes variables del registro, 3) Determinar las propuestas para la mejora de calidad de la información en su caso.

Material y métodos: A partir de la información disponible sobre el registro, se diseña un estudio para determinar la fiabilidad global del mismo. Se procede a la evaluación de los datos referidos al año 2000, y se calcula el tamaño muestral necesario, con afijación proporcional por localización y sexo. Se identifican las variables críticas y se revisan las historias clínicas correspondientes. Los resultados se recogen en una base de datos y son tratados con el Paquete estadístico SPSS/PC, aplicando para el estudio de la fiabilidad los índices de concordancia (índice kappa).

Resultados: Se obtienen unos resultados que evidencian una muy alta fiabilidad del registro, superando el 97%. Se identifican además oportunidades de mejora y la posibilidad de aumentar el grado de cumplimentación en algunas de las variables a través de la mejora de comunicación con alguno de los centros de derivación.

Conclusiones: La información contenida en este registro puede ser considerada segura para obtener indicadores de calidad automatizados.

La validación del registro permite además aumentar la confianza de los gestores y de los profesionales para implantar medidas que permitan mejorar la organización.

INFORMÁTICA Y CALIDAD: PUNTO DE ENCUENTRO

M.J. Sánchez Ibañez, A. Serrat Sese, I. González Díaz, M.J. López Córdoba, L. Obama López y M.T. Ibañez Maya ABS Morera-Pomar.

Palabra clave: WEB, calidad, información.

Introducción: En el año 2000 tras la informatización de las consultas de nuestra Área Básica de Salud y a partir de la inquietud de varios profesionales, se creó en nuestro centro una página Web de uso interno. Ésta consta de varios apartados: Información general, equipo, calendario de guardias, guías y protocolos del centro y de la organización, apartado de la comisión de docencia (calendario de sesiones y actividades docentes) y apartado de la comisión de calidad.

Objetivo: Utilización de la Web como medio de comunicación e información de la comisión de calidad con el equipo (EAP) y viceversa.

Método: En el proceso técnico de creación participaron un médico de familia y un diplomado de enfermería, miembros ambos de la comisión de calidad. La información que inicialmente se consideró necesario que estuviera al alcance del EAP fue: reglamento de la comisión, miembros de la comisión y sus funciones en ella, línea de contacto con la comisión y sus miembros vía correo electrónico directo, lista de problemas detectados junto con la posible solución que se puede gestionar (se va actualizando a medida que se detectan los problemas), y memoria del último año. Actualmente se ha revisado el contenido de la Web y se han hecho propuestas de mejora para ampliar la información en temas de calidad. Se está trabajando en la creación de: apartado de noticias de interés en el cual se reflejarán los acuerdos más relevantes adoptados por la comisión, y creación de un espacio bibliográfico con abstracts de artículos de calidad, de interés en atención primaria en especial.

Conclusiones: Desde su creación nuestra página Web se ha ido implantando como herramienta de uso cotidiano en la consulta. Es su accesibilidad y fácil manejo lo que ha facilitado que sea aceptada por los miembros del equipo en su actividad diaria, como lo demuestra que en el último año se han contabilizado más de 650 visitas a la Web. Dentro del espíritu de mejora de la calidad tenemos previsto conectar la Web de nuestro centro con la web de la organización para ampliar su difusión.

VALIDACIÓN DEL REGISTRO DE TUMORES DEL CENTRO ONCOLÓGICO DE GALICIA

M.J. Pita, C. Veiras, J.L. Candal y B. Candia

Palabra clave: Registro, cáncer, tumores.

Introducción: El Registro de Tumores del Centro Oncológico de Galicia es un Registro Hospitalario de Cáncer, que recoge información desde el año 1991. Contiene un total de 18.586 casos, de los que 2194 corresponden al año 2000.

La explotación de la información de este registro para la Gestión de la Calidad del Centro Oncológico requiere de una validación que garantice la fiabilidad de los datos. Por este motivo, y con el fin de obtener de forma automatizada indicadores de calidad, se hace necesario proceder a la validación de su contenido.

Objetivos: 1) Identificar variables críticas para los indicadores de calidad, 2) Evaluar la fiabilidad del contenido de las diferentes variables del registro, 3) Determinar las propuestas para la mejora de calidad de la información en su caso.

Material y métodos: A partir de la información disponible sobre el registro, se diseña un estudio para determinar la fiabilidad global del mismo. Se procede a la evaluación de los datos referidos al año 2000, y se calcula el tamaño muestral necesario, con afijación proporcional por localización y sexo. Se identifican las variables críticas y se revisan las historias clínicas correspondientes. Los resultados se recogen en una base de datos y son tratados con el Paquete estadístico SPSS/PC, aplicando para el estudio de la fiabilidad los índices de concordancia (índice kappa).

Resultados: Se obtienen unos resultados que evidencian una muy alta fiabilidad del registro, superando el 97%. Se identifican además oportunidades de mejora y la posibilidad de aumentar el grado de cumplimentación en algunas de las variables a través de la mejora de comunicación con alguno de los centros de derivación.

Conclusiones: La información contenida en este registro puede ser considerada segura para obtener indicadores de calidad automatizados.

La validación del registro permite además aumentar la confianza de los gestores y de los profesionales para implantar medidas que permitan mejorar la organización.

EL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA INTRANET DEL HOSPITAL

V. Ureña Vilardell, J.M. Ramos López y A. Gil Santiago
Hospital Ramón y Cajal, Unidad de Calidad.

Palabra clave: Sistemas de Información, Comunicación interna, Páginas web.

Resumen: Uno de los puntos clave de la gestión de un programa de calidad es lograr una buena difusión interna del mismo. Los centros grandes, con un número importante de empleados, encuentran muchas barreras para la comunicación interna y tienen que aprovechar los canales disponibles para hacer llegar y recoger toda la información. En los últimos años la instalación de redes informáticas nos ha ofrecido una serie de herramientas que pueden contribuir a superar estas barreras.

Objetivos: Mejorar la comunicación interna de los contenidos del Programa de Calidad.

Metodología: La Unidad de Calidad en colaboración con el Servicio de Informática, empezo en el año 1999 a incorporar toda la información del Programa de Calidad en la intranet del Hospital.

Resultados: Se diseñó una página web a partir de la cual se accede a: 1) Una descripción del Programa de Calidad del Hospital con sus antecedentes desde el año 1994, objetivos generales, cronograma de acciones, posterior inclusión en el Plan Estratégico del Hospital y las memorias y resultados anuales. 2) Un apartado sobre Comisiones Clínicas que incluye la Normativa General de Funcionamiento de las Comisiones, Comisiones Clínicas incluidas en el programa, sus miembros, principales objetivos, resultados y sus recomendaciones e informes técnicos. 3) Una sección sobre los objetivos de calidad del año en curso en la que para cada objetivo se describen sus criterios de calidad, estándares e indicadores, modelos de hojas de recogida de datos y documentación de apoyo.

Conclusiones: La intranet garantiza una mayor capacidad de acceso (no se precisan códigos personales) y permite incluir contenidos que quizás no serían adecuados para internet. No permite compartir experiencias y conocimientos con la comunidad, pero evidentemente nada impide publicar también información en internet. Este tipo de canales de comunicación tienen todavía su efectividad limitada por una serie de condicionantes como la posibilidad de acceso (número de puntos de conexión a la red) y la falta de costumbre de utilización. Sin embargo, pensamos que constituyen una poderosa herramienta de futuro por su agilidad, la facilidad con la que pueden mantenerse actualizados y su gran capacidad de contenido.

AVISOS POR BUSCA

A.I. Lora Mingote, E. Redín Nicuesa, F. Moreno Armendariz
y M. Saldaña Lusarreta

P-134

Objetivos: Centralización de las llamadas de los usuarios hacia un único número de teléfono, con el objeto de dinamizar los avisos y dar rápida solución a los más urgentes.

Metodología: El método utilizado hasta mediados del año 2000 para ponerse en contacto el usuario con el informático era a través de un busca personalizado. El usuario realizaba una llamada a la centralita del hospital y estos a su vez se encargaban de poner el busca al informático con el numero de teléfono al cual debía llamar.

A partir de dicho año, todo este proceso se canaliza en una única llamada directa del usuario con el informático a través de la administrativa encargada de recoger los avisos, la cual tiene un contacto más directo con los usuarios, pudiendo dar ella misma una rápida solución o derivando la llamada al informático que se encuentre disponible en ese momento en la oficina o a aquel que el usuario haya requerido.

Resultados: Algunos problemas pueden solucionarse telefónicamente ya que el informático se encuentra en su puesto y cuenta con los medios necesarios para resolverlos sin necesidad de desplazamiento. Con esta centralización se evita que dos personas se personen en un mismo lugar para solucionar un mismo problema pueden recogerse quejas y demás avisos mientras los informáticos están solucionando averías.

Conclusiones: Mayor control de llamadas, por tanto se pueden diferenciar entre avisos mas o menos graves.

ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE UNIDADES PARA EL PROGRAMA DE HISTORIA CLÍNICA**INFORMATIZADA**

A. Muruzábal Martínez, E. Manso Montes, M.D. Catalán Goñi, A. Zabalegui Goicoechea, R. Beriáin Burgui y J.A. Garbayo Sánchez
Hospital de Navarra.

P-135

Palabra clave: Codificación de Unidades. Historia Clínica Informatizada.
Objetivos: En el momento de elegir una codificación de Servicios para la Historia Clínica Informatizada (HCI), se vio la conveniencia de adoptar un sistema de códigos unificado, ya implantado en otras aplicaciones, que permitiese la integración de información proveniente de fuentes diversas.
Metodología: En el SNS-O existía un sistema de codificación de Unidades, los Centros de Responsabilidad (CRs) utilizado, entre otros en almacenes, personal y posteriormente en el sistema económico-financiero GE21. Incluía Servicios y Centros de Atención Primaria, Atención Especializada y externos al SNS-O. Se aceptó esta codificación porque es accesible desde el programa de HCI. Se tuvo que hacer algunas adaptaciones en el sistema de CRs para su uso en la HCI, de forma que pudiera ser válido desde el punto de vista clínico, para lo cual, hubo que desarrollar la estructura de CRs a cinco dígitos, de manera que todas las unidades quedasen bien identificadas. Se depuró el listado de Servicios y se desactivaron aquellos que nunca eran peticionarios, incluyendo Servicios de Atención Primaria, Atención Especializada y externos al SNS-O. Este sistema de codificación, permitía identificar la Unidad, pero era necesario relacionarlo con sus médicos responsables. Para ello, se desarrolló una aplicación informática que hizo posible incorporar en cada CR los médicos que lo integran.

Resultados: Este sistema de codificación de Unidades es accesible desde la HCI y se ha extendido su uso a otras aplicaciones departamentales: Neurofisiología, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Laboratorio, siendo ya considerado como el estándar de codificación de unidades para todos los Sistemas de nueva implantación. En cualquier momento es posible incluir nuevos códigos y permite asociar al personal sanitario a uno o varios códigos.

Conclusiones: Esta forma de codificación permite: 1) codificar de manera uniforme la procedencia de pacientes. 2) identificar unidades tanto proveedoras como peticionarias, lo cual facilita la utilización de esta herramienta al usuario, evita errores a la hora de asignar solicitudes de pruebas y, facilita la recuperación de resultados. 3) extraer datos con respecto a la pertinencia de solicitud de pruebas y la facturación de exploraciones complementarias. 4) constituye un sistema de codificación de Unidades estandarizado.

PÓSTER VI

Protocolos y guías/vías de práctica clínica

Sala Navarra
Jueves 10 y viernes 11

IMPACTO DE UNA VÍA CLÍNICA EN LOS INDICADORES CLAVE DEL PROCESO DE PARTO Y CESÁREA

E. Fuster Cadena, M. Farret Massoni, I. García Ripoll,
C. Castillón Mezquita y D. Martínez Claret
Hospital de Barcelona.

P-136

Palabra clave: Vía clínica, parto, cesárea.

Objetivo: Evaluar el impacto de una vía clínica en los cuidados de las pacientes ingresadas por parto y cesárea.

Método: Diseño prospectivo, comparativo y aleatorio. Se comparan los registros anteriores a la implantación de una vía clínica ($n = 50$) respecto a los post implantación ($n = 50$). Variables: Diecisiete indicadores clave del proceso seleccionados por expertos. Tamaño de la muestra: test de Fleisher. Análisis estadístico: Test de chi². Nivel de significación estadística $p < 0,05$.

Resultados: Tras la plena implantación de la vía se observó un aumento del cumplimiento global de los indicadores del 26% al 96% ($p < 0,001$). El grado de mejora fue igual en los indicadores de sala de partos ($n = 6$; 22% vs 95,5% pre y post implantación respectivamente) que en los de la unidad de hospitalización ($n = 11$; 28% vs 94 % pre y post implantación respectivamente) ($p = 0,01$). Entre los indicadores que mejoraron más, cabe citar "Valoración postparto inmediato" (0% vs 100% pre y post implantación respectivamente) en sala de partos y "Registro educación sanitaria" (0% vs 100% pre y post implantación respectivamente) en la unidad hospitalaria. La mejora fue significativamente menor en la profilaxis de úlcera de estrés (0% vs 50% pre y post implantación respectivamente.)

Conclusiones: La estandarización de los procesos favorece el cumplimiento de los indicadores clave. La vía clínica mejoró el cumplimiento tanto durante el proceso de asistencia en sala de partos como en la unidad hospitalaria.

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA VÍA CLÍNICA DE CÁNCER DE RECTO

O. Monteagudo Piqueras, M.D. Herreros Marcos, D. García Olmo, J. García Caballero, V. Pérez Blanco y E. Román Casares

P-137

Palabra clave: Evidencia médica, vía clínica, seguridad.

Objetivos: Crear una forma de trabajo, coordinado y basado en evidencias médicas, entre los implicados en servicios en el tratamiento del cáncer de recto.

Metodología: La vía clínica fue desarrollada por el Servicio de Cirugía General CGC con el apoyo de la Unidad de Garantía de Calidad del Hospital La Paz:

Reuniones conjuntas de todos los servicios implicados en el tratamiento del cáncer de recto: cirugía general, quimioterapia, radioterapia, y digestivo.

Se estableció una forma dinámica y eficaz de trabajo, eliminando tiempos de espera innecesarios causados por la falta de coordinación de los servicios.

Se diseñaron carpetas donde quedaban recogidos todos los volantes y partes de interconsultas necesarios durante el tratamiento.

Se diseñó una matriz donde quedaban recogidos de forma pormenorizada todo el tratamiento a seguir. Esta matriz es el paso previo a la vía clínica de resección de colon con anastomosis o a la de resección de colon con colostomía.

Diseño de consentimiento informado de ecografía endoanal.

Resultados: Optimización de la atención mediante: matriz recordatorio, órdenes de tratamiento, variaciones.

Novedades: tratamiento quimioterápico y radioterápico preoperatorio.

Excelentes resultados en la disminución de tiempos muertos, disminución del número de colostomías.

Información, seguridad y satisfacción: hoja de información al paciente, encuesta de satisfacción, recomendaciones al alta.

Conclusiones: La vía clínica de resección de colon constituye un instrumento ágil que permite integrar mejoras de efectividad científico-técnica en la atención sanitaria. Proporciona calidad asistencial, disminuyendo ansiedad y angustia, permitiendo un restablecimiento precoz de los pacientes con esta patología.

PROGRAMA DE MEJORA DE CALIDAD ASISTENCIAL EN UNA UNIDAD DE C. TORÁCICA: IMPLANTACIÓN DE UNA VÍA CLÍNICA DE NEUMONECTOMÍA

J. García Tirado, J.J. Rivas de Andrés, F. Martínez Lozano, P. Martínez Vallina, J.R. García Mata y R. Embún Flor

P-138

Palabra clave: Vía clínica de neumonectomía. programa de mejora de calidad asistencial.

Resumen: A partir de 1992, el INSALUD puso en marcha en su estructura sanitaria el Contrato Programa. Los Programas de Mejora de Calidad Asistencial (PMCA) constituyan una finalidad obligada, derivada de la complejidad creciente de la Atención Sanitaria, la limitación de recursos económicos, y la necesidad de definir al usuario entre sus objetivos.

Objetos: Presentar la sistemática empleada para la elaboración de un PMCA en una Unidad de Cirugía Torácica (UCT), implantando una Vía Clínica (VC) de Neumonectomía.

Metodología: 1) En Junio-99 se impartió en nuestra UCT un Curso de MCA, desarrollado por la Unidad de Calidad Asistencial (UCA) del H.U.M. Servet; el curso se orientó hacia la adquisición de conceptos y metodología para identificar y priorizar problemas de calidad. 2) Con el apoyo técnico/estratégico de la UCA, en Dic-99 se crea el Grupo de Mejora de Calidad en CT formado por 1 médico, 2 enfermeras y 1 auxiliar. 3) Dicho Grupo, a partir de la formación obtenida por el Curso, detectó los problemas existentes en la UCT mediante "tormenta de ideas", analizó dichos problemas con el método de diagrama causa-efecto, priorizó con técnicas de comparación de parejas y seleccionó con la técnica de parrilla según criterios explícitos. 4) Se eligió una actividad asistencial compleja como es la neumonectomía, para abordar su MCA. Se decidió la elaboración de una VC como método de trabajo: la VC permite aunar los conceptos de efectividad y eficiencia bajo la condición de Medicina Basada en la Evidencia.

Resultados: Se presenta la VC de Neumonectomía desarrollada por los Servicios de CT, UCI y Anestesia; incluida la elaboración gráfica de la información para el paciente y familiares. Para dicho desarrollo, se consideró necesaria: 1) la modificación en la distribución de tareas, 2) la preparación quirúrgica del paciente, 3) la reparación de material y dotación precisa, 4) la definición del curso clínico en la VC, 5) la información a la familia tras la cirugía, así como durante el curso clínico. La evaluación de la VC se efectúa mediante áudit anual.

Conclusiones: La MCA es un objetivo asistencial derivado de una actitud más profunda. Para trabajar en PMCA debemos utilizar la metodología apropiada, existente para ello. La VC de Neumonectomía está reduciendo la variabilidad, estancias innecesarias (y por tanto, coste), proporcionando seguridad legal.

ÁUDIT DE LA VÍA CLÍNICA DE NEUMONECTOMÍA IMPLANTADA POR EL PROGRAMA DE CALIDAD DE UNA UNIDAD DE C. TORÁCICA

J. García Tirado, J.J. Rivas de Andrés, F. Martínez Lozano, R. Embún Flor, P. Martínez Vallina y J.R. García Mata

P-139

Palabra clave: Vía Clínica en Neumonectomía, Programa de Mejora de Calidad Asistencial.

Objeto: Las vías clínicas (VC) son planes asistenciales sistemáticamente desarrollados para contribuir a la toma de decisiones clínicas sobre los cuidados de salud apropiados para patologías concretas, de curso clínico predecible. Las VC suponen una de las formas más actualizada de trabajar aunando los conceptos de efectividad y eficiencia bajo la condición de Medicina Basada en la Evidencia. En nuestra Unidad se creó en dic-99 el Grupo de Mejora de la Calidad en C. Toráctica, habiéndose elaborado e iniciado el uso de la VC de neumonectomía; se presentan los resultados iniciales, sobre los que se replantean actualmente las posibles modificaciones a realizar.

Metodología: El material empleado para su desarrollo consistió en: 1) revisión bibliográfica; 2) participación de servicios de investigación en salud (Unidad de Calidad Asistencial del Hospital), y expertos clínicos de los Servicios implicados (UCI, Anestesia y C. Toráctica); 3) diseño y edición de la vía. El Método a seguir consistió en: 1) identificación y definición del proceso clínico a abordar, mediante criterios de frecuencia, riesgo y coste y curso clínico predecible; 2) contraste con la revisión bibliográfica; 3) desarrollo por el equipo de médicos y personal sanitario no facultativo implicados en la atención del enfermo con dicho proceso clínico, junto con un coordinador en Calidad; 4) diseño escrito; 5) áudit anual de la misma.

Resultados: Durante 2000-2001 se intervinieron 43 pacientes, 7 de los cuales fueron excluidos de la VC por razones diversas (5 éxitus). Como criterios de evaluación se eligieron: 1) Intervención al día siguiente del ingreso; 2) alta al 7º día de la intervención. Respecto al criterio 1, 33 de los 36 pacientes lo cumplieron (91,66 %); sin embargo, respecto al criterio 2, sólo con 16 de 36 pacientes se cumplió la indicación de la VC (44 %). En 20 de los pacientes la estancia fue diferente a 7 días, siendo en 13 de ellos (65 %) superior a 7 días, y en 7 pacientes (35%), inferior a 7 días.

Conclusiones: Las VC constituyen un excelente método en la mejora de calidad de los cuidados médicos, al asegurar una atención basada en la evidencia científica, y la posibilidad de detectar situaciones de desviación que alerten acerca de la necesidad de efectuar cambios en la práctica clínica empleada. En nuestra experiencia en curso, la VC de neumonectomía requiere una revisión, a partir de los datos obtenidos por el áudit acumulativo tras sus dos primeros años de implantación, a fin de ajustar la variabilidad y las estancias innecesarias, con las repercusiones consecuentes en el coste y en la calidad de la asistencia dispensada.

PROGRAMA DE MEJORA DE CALIDAD ASISTENCIAL EN UNA UNIDAD DE C. TORÁCICA: IMPLANTACIÓN DE UNA VÍA CLÍNICA DE NEUMONECTOMÍA

J. García Tirado, J.J. Rivas de Andrés, F. Martínez Lozano, P. Martínez Vallina, J.R. García Mata y R. Embún Flor

P-138

Palabras clave: Vía clínica, Cáncer de endometrio.

VÍA CLÍNICA DE CÁNCER DE ENDOMETRIO

E. Martínez Ochoa, J. Vidán Alli, I. Lanzeta Vicente, M.L. Saldaña Lusarreta y M.T. de Pedro Montalbán
Medicina Preventiva y Gestión Calidad Hospitalaria.

P-140

Introducción: Se entiende por vía clínica los planes asistenciales que se aplican a enfermos con una determinada patología de curso clínico predecible. Ante la necesidad creciente de mejora de la calidad clínica asistencial, de reducir la variabilidad de su práctica y garantizar efectividad y eficiencia se plantea la elaboración de una vía clínica.

Objetivos: a) Elaboración de una vía clínica para el cáncer de endometrio unificando criterios entre los participantes. b) Diferenciar entre intervención de cáncer de endometrio por laparotomía y por laparoscopia. c) Medición de los tiempos transcurridos entre las distintas etapas. d) Mejorar la calidad de información al paciente sobre su proceso.

Metodología: Buscando el cumplimiento de los objetivos de los Servicios se forma un grupo de trabajo compuesto por especialistas en Ginecología, Anatomía Patológica y Medicina Preventiva, que decide mediante técnicas de consenso el procedimiento al que se va a aplicar una vía clínica. Se parte de una sistemática de atención clínica protocolizada que facilita la elaboración de la vía. Consultando la bibliografía existente sobre el tema, se llega a un consenso y se redacta la vía.

Resultados: Se elabora una vía clínica que consta de tres apartados diferenciados según la atención en los Centros de Atención a la Mujer, el Servicio de Ginecología y el Servicio de Oncología. En el procedimiento terapéutico, se diferencian dos opciones dentro de la vía según el tipo de intervención - quirúrgica. Se incluye la medición de los tiempos transcurridos entre los distintos tipos de asistencia (incluido estudio anatomo-patológico). Existe un apartado específico de registro de la información proporcionada al paciente. Se ha realizado una encuesta de satisfacción, que se le entregará al paciente al alta. Una vez aprobada la vía en la Dirección del Centro, se implanta. Cuando transcurra un año de la implantación, se procederá a su evaluación.

Conclusiones: Se elabora una vía clínica para el cáncer de endometrio consiguiendo una visión global del proceso asistencial a través de la participación de las especialidades médicas implicadas y enfermería. Una misma vía para dos opciones terapéuticas. Mayor control de los tiempos empleados. Se garantiza la información puntual al paciente, buscando aumentar su satisfacción.

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA VÍA CLÍNICA DE DOLOR TORÁCICO

F.J. Gracia San Román, P. Jadraque Jiménez, V. Pérez Blanco, C. de Pablo Zarzosa, T. Contreras Sanfeliciano y J. García Caballero
Hospital Materno-Infantil, Servicio Medicina Preventiva.

P-141

Palabra clave: Vía clínica, calidad, dolor torácico.

Objetivos: 1) Mejora de la calidad de la asistencia. 2) Mejora de la calidad percibida por los pacientes (satisfacción). 3) Mejora de la información al paciente y/o familiares.

Metodología: Se creó un grupo de trabajo con los profesionales implicados (S. de Urgencias, S. de Cardiología, Lab. de Urgencias). Tras una revisión bibliográfica de la mejor evidencia científica disponible, y mediante reuniones periódicas, se elaboró una matriz temporal con tiempos y modos de actuación, junto con una hoja de variaciones. Asimismo, se diseñó una hoja recordatorio para la enfermería señalando la importancia de la minimización del tiempo entre la petición de los biomarcadores cardíacos y la recepción de los resultados.

Se creó un tríptico de información sobre el dolor torácico para el paciente y sus familiares así como una encuesta de satisfacción para entregar a los pacientes antes de que abandonarán el Hospital. La evaluación de la vía permitirá verificar los resultados esperados.

Resultados: Matriz temporal/Hoja de variaciones: Estratificación del riesgo coronario en menos de una hora y exclusión de los dolores torácicos no sugestivos de isquemia.

Hoja recordatorio para la petición de biomarcadores cardíacos: Minimización del tiempo de recepción de los resultados.

Encuesta de Satisfacción: se pretende medir la mejora de la satisfacción de los pacientes, a la cual contribuirán tanto la Vía Clínica cómo:

- Tríptico de información para el paciente y familiares.
- Hoja de recomendaciones al alta.

Conclusiones: El desarrollo e implantación de una vía clínica sobre un síntoma tan frecuente permitirá disminuir la diversidad de la práctica clínica, facilitando las actuaciones de los médicos en los Servicios de Urgencias y aumentando la satisfacción de los pacientes.

VÍA CLÍNICA PARA BIOPSIA RENAL: RESULTADOS AL AÑO DE CUMPLIMIENTO

M. Gómez Santillana, F. Tornero Molina, B. Rincón Ruiz, J. Usón Carrasco y J.E. Ruiz de la Iglesia
Hospital Virgen de la Luz.

P-142

Palabra clave: Biopsia renal, Vía Clínica.

Introducción: Las vías clínicas definen la secuencia, duración y responsabilidad óptima, actividades de médicos, enfermeras, y otros profesionales, para un diagnóstico o procedimiento particular, minimizando los retrasos, mejorando el uso de recursos y maximizando la calidad de la asistencia.

Objetivo: Bajo este planteamiento el Servicio de Nefrología pacta como objetivo de calidad el desarrollo, la implantación y la evaluación de la Vía clínica para la Biopsia renal.

Metodología: Tras el diseño y aprobación de la vía clínica, se utilizaron los siguientes indicadores de evaluación:

- Indicadores de cumplimiento. Estándar > 80%.
- Indicadores de efectos adversos(hematomas, insuficiencia renal. Estándar < 5%.
- Indicadores de satisfacción del paciente. Estándar > 90%.

Resultados: Durante el año 2001 se realizaron 12 biopsias renales, solo 9 de ellas cumplían los requisitos para realizar la vía clínica y en estos se hizo en el 100% de los casos.

Indicador del grado de cumplimiento: 8/9=88,8%.

Indicador de efectos adversos: 1/9=11,1%.

Indicador de satisfacción: 9/9=100%.

Conclusiones: La vía clínica se ha mostrado como una herramienta útil en el procedimiento diagnóstico de la biopsia renal, como demuestra el hecho de haber alcanzado los estándares marcados.

EVALUACIÓN DE UNA VÍA CLÍNICA DE HERNIA DISCAL IMPLANTADA EN EL HOSPITAL LA PAZ

E. Román Casares, R. Valencia Martín, J. Gracia San Román, P. Alonso Vigil, M.A. Sarmiento Martínez y J. García Caballero
Hospital Materno-infantil. Servicio medicina preventiva.

P-143

Palabra clave: Vía clínica, evaluación.

Introducción: Las vías clínicas son herramientas que facilitan la atención sistemática y multidisciplinar del paciente. Además, como instrumento de gestión clínica mejoran la calidad de la atención sanitaria. Al recoger la secuencia de actuaciones y actividades que han de llevarse a cabo durante la estancia hospitalaria del enfermo se evitan variaciones innecesarias en la práctica. Un paso clave tras el diseño e implantación de vías es su evaluación: análisis de los procesos establecidos y de los resultados para detectar oportunidades de mejora.

Objetivos: Evaluar la vía de hernia discal lumbar implantada en el Hospital la Paz de Madrid mediante los indicadores de evaluación diseñados a tal efecto.

Material y métodos: Revisión de matrices de la vía clínica de hernia discal lumbar del año 2001. Análisis descriptivo, construcción de indicadores de evaluación y comparación con estándares establecidos en el diseño de la vía.

Resultados y discusión: Cobertura de la vía: 27,21%, inferior a la obtenida en el pilotaje (68%) y al estándar fijado (100%). El 50% de los pacientes eran hombres, edad media de 40,26 años (DE 12,13), similar en las mujeres. Estancia media: 5 días (DE 1,52), superior a la fijada (4 días). El 93,5% de los enfermos ingresan el día antes de ser intervenidos. Indicador de cumplimiento de estancia hospitalaria: 52,17% (estándar = 80%). Sólo en el 15% de las matrices estaba marcada la profilaxis antibiótica perioroperatoria. Todos los pacientes recibieron analgesia, el 71,7% pautada como indicaba la vía. La variación más frecuente fue debida a la analgesia (39,28%). Se detectaron un total de 28 variaciones: el 53,57% se debieron a los pacientes y el resto a los profesionales. No hubo variaciones debidas a la institución. La variación más frecuente (35,71%) atribuible a los profesionales es la prescripción de benzodiazepinas. Cumplimentación de la hoja de matriz-verificación muy baja. Sólo en un 21,7% de los casos constaba la entrega de encuestas de satisfacción.

Conclusiones: Cobertura de la vía muy inferior al estándar, al igual que la cumplimentación de las hojas de matriz-verificación. Necesidad de ajustar la estancia media a la fijada a la vía y de revisar las pautas analgésicas y de benzodiazepinas.

VÍA CLÍNICA PARA BIOPSIA RENAL: RESULTADOS AL AÑO DE CUMPLIMIENTO

M. Gómez Santillana, F. Tornero Molina, B. Rincón Ruiz, J. Usón Carrasco y J.E. Ruiz de la Iglesia
Hospital Virgen de la Luz.

P-142

Palabra clave: Biopsia renal, Vía Clínica.

Introducción: Las vías clínicas definen la secuencia, duración y responsabilidad óptima, actividades de médicos, enfermeras, y otros profesionales, para un diagnóstico o procedimiento particular, minimizando los retrasos, mejorando el uso de recursos y maximizando la calidad de la asistencia.

Objetivo: Bajo este planteamiento el Servicio de Nefrología pacta como objetivo de calidad el desarrollo, la implantación y la evaluación de la Vía clínica para la Biopsia renal.

Metodología: Tras el diseño y aprobación de la vía clínica, se utilizaron los siguientes indicadores de evaluación:

- Indicadores de cumplimiento. Estándar > 80%.
- Indicadores de efectos adversos(hematomas, insuficiencia renal. Estándar < 5%.
- Indicadores de satisfacción del paciente. Estándar > 90%.

Resultados: Durante el año 2001 se realizaron 12 biopsias renales, solo 9 de ellas cumplían los requisitos para realizar la vía clínica y en estos se hizo en el 100% de los casos.

Indicador del grado de cumplimiento: 8/9=88,8%.

Indicador de efectos adversos: 1/9=11,1%.

Indicador de satisfacción: 9/9=100%.

Conclusiones: La vía clínica se ha mostrado como una herramienta útil en el procedimiento diagnóstico de la biopsia renal, como demuestra el hecho de haber alcanzado los estándares marcados.

IMPACTO DE LA VÍA CLÍNICA DE DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO

B. Valentín López, J.L. Herreras Gutiérrez, P. Aparicio Grande, J.M. Muñoz-Ramón, J. Díez Sebastián y J. García Caballero
Hospital la Paz.

P-144

Palabra clave: Vía clínica. Dolor agudo postoperatorio.

Introducción: La vía clínica de dolor postoperatorio constituye el núcleo fundamental del programa de dolor agudo postoperatorio instaurado en el Hospital Universitario La Paz.

Objetivo: Analizar el impacto que ha supuesto la implantación de la vía clínica de dolor postoperatorio.

Metodología: La vía clínica del dolor postoperatorio se puso en marcha en Diciembre del año 2001, realizándose un seguimiento continuo de su implantación para detectar los puntos críticos susceptibles de mejora. Dado el importante volumen de pacientes tras cinco meses de implantación se procede a realizar una evaluación de la vía clínica.

La evaluación de la vía clínica se realizó a partir de la hoja de recogida de datos, procesándolos en una base de datos de Access, y utilizando en el análisis el paquete estadístico SPSS v10.

Resultados: Se incluyeron en la vía clínica de dolor agudo 337 pacientes que cumplían el requisito de dolor postoperatorio moderado-grave ingresados en la Unidad de Reanimación Post-Anestésica (URPA). La edad media es de 56,9 años (DE: 16,1 años), siendo el 53% hombres y el 47% mujeres, intervenidos el 60,2% en Cirugía General, el 22,8% en Neurocirugía, el 12,8% en Urología y el 3% en cirugía vascular. La estancia media de los pacientes en vía clínica es de 2,20 días (DE: 0,71 días) ajustándose a la estancia programada en vía.

El control del dolor postoperatorio al alta de la URPA, (dolor controlado EN 4) es de un 67%. En planta a las 24 horas un 35% de los pacientes no presentan dolor, un 45% dolor leve, un 18% moderado y un 2% dolor severo. La analgesia postoperatoria utilizada el 1er día postoperatorio es: un 25,5% cloruro mórforo mediante PCA (Analgesia controlada por paciente); un 62,3% infusor de tramadol; un 4,5% epidural (anestésicos locales) y un 4% únicamente AINES.

Conclusiones: La introducción de registros de evaluación del dolor, criterios de actuación y nuevas técnicas analgésicas ha permitido mejorar la atención del paciente intervenido. Los resultados conseguidos han generado una mayor demanda de la analgesia aguda postoperatoria, incluyendo a más servicios de los previstos al inicio, permitiendo abordar el tratamiento de pacientes ingresados en la reanimación y el empleo de nuevas técnicas analgésicas como la epidural.

INCORPORACIÓN DEL PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO EN UNA VÍA CLÍNICA PARA DISMINUIR LA VARIABILIDAD

J. Leal Llopis, C. Pérez López, C. Pujante Zapata, M.D. Navarro Ortiz, M.M. Martínez Mercader, J. Iniesta Alcázar y E. Abad Corpa
Hospital Morales Meseguer. Dirección de enfermería.

P-145

Palabra clave: Vía clínica; Colecistectomía; Enfermería.

Antecedentes: En la búsqueda continua de la disminución de la variabilidad en la práctica clínica (VPC), nuestras instituciones sanitarias continúan apostando por la creación e implantación de Vías Clínicas. Su principal característica es la multidisciplinariedad, incorporando la aportación de todos los profesionales implicados en la atención de los pacientes.

Objetivo: Describir la aportación de enfermería en la Vía Clínica de la Colecistectomía Laparoscópica del Hospital JM Morales Meseguer.

Material y método: La Vía se elaboró durante el último trimestre del 2001 y el primero del 2002, participando personal de Enfermería, Cirugía General y Anestesia. Las fases de la Vía Clínica pasaron por la elaboración, pilotaje, implantación y evaluación. En la 1^a fase, se realizaron dos reuniones semanales, una del grupo de enfermería y otra de todo el equipo. El grupo de enfermería se planteó la necesidad de incorporar nuevas herramientas, además de los clásicos protocolos, para disminuir la VPC entre las que se encontraban la elaboración de un Plan de Cuidados y un Informe de Enfermería al Alta estandarizados y la inclusión de medidas de valoración del dolor así como del manejo de medias de compresión evaluadas previamente mediante la metodología de la Enfermería Basada en la Evidencia.

Resultados: Siguiendo el proceso de normalización de los cuidados y aplicando el Proceso de Atención de Enfermería, se elaboró un Plan de Cuidados Estandarizado para el paciente sometido a Colecistectomía Laparoscópica con los siguientes períodos: preoperatorio, peri-operatorio, post-operatorio inmediato y post-operatorio en unidad de hospitalización. En segundo lugar, se incorporó a los cuidados estandarizados la valoración del dolor mediante la escala analógica visual de Wong tras comprobar su validez. En tercer lugar, se incluyeron las recomendaciones realizadas por el meta-análisis del Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and Midwifery sobre la utilización y manejo de las medias de compresión como profilaxis tromboembólica. Por último, se elaboró un Informe de Enfermería al Alta Estandarizado con el fin de asegurar la continuidad de cuidados en Atención Primaria.

Conclusiones: El problema de la VPC continúa patente en nuestros centros por lo que es necesaria la combinación de diversas herramientas que trabajen conjuntamente en su disminución.

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE PROCESO Y ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LAS TRAYECTORIAS CLÍNICAS

C. Zaldivar, M. Esteve y L. Marbà
Hospital de Mataró.

P-146

Introducción: Desde el año 1997 el Hospital de Mataró utiliza para atender al 40% de los pacientes la metodología asistencial de Trayectorias Clínicas (TC), esto supone un total de 21.541 procesos atendidos.

En este momento están implementadas un total de 48 TC de las cuales 41 son quirúrgicas y 7 son médicas.

Metodología: El seguimiento se lleva a cabo mediante la ayuda de un programa informático que recoge automáticamente los datos administrativos de cada paciente y las diferentes trayectorias utilizadas en cada proceso asistencial, pudiendo analizar la variabilidad real de cada paciente, con el diagnóstico médico al alta y con los diferentes diagnósticos asociados.

Resultados: Se presentan los resultados obtenidos durante el año 2001 correspondientes a 7.060 pacientes y el análisis de los mismos.

La información de que se dispone para cada una de las trayectorias implantadas es la siguiente:

Número total de trayectorias utilizadas. Variabilidad presentada. Diagnósticos médicos al alta, en los que se ha utilizado la trayectoria.

La informatización del proceso permite consultar los datos individualizados pudiendo analizar porque no se ha utilizado trayectoria clínica en pacientes con el mismo diagnóstico médico al alta, y si las variaciones están relacionadas con complicaciones o comorbilidad.

Para cada trayectoria clínica se han definido indicadores de calidad.

Conclusión: Las Trayectorias Clínicas permiten establecer unos criterios explícitos de calidad y de buena práctica clínica.

La experiencia del Hospital de Mataró contribuye a engrasar las evidencias que apuntan que las TC pueden mejorar la eficiencia en los servicios prestados.

VÍA CLÍNICA; TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA; (TVP). EFECTIVIDAD Y REPERCUSIÓN SOBRE EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO

J. Roldán
Servicio de Medicina Interna.

Palabras clave: Ecografía, d-dímero, TVP, Vía clínica.

Objetivo: Comparar la efectividad de dos estrategias diagnosticas de TVP, contabilizando el número de ecodoppler evitados con la nueva estrategia.

Metodología: Hasta el 2001 la TVP se ha diagnosticado realizando ecodoppler en los enfermos con sintomatología clínica sugestiva de TVP, siendo esta prueba la que confirmaba o excluía el diagnóstico (estrategia 1). Tras la aplicación de la nueva vía clínica, el diagnóstico se realiza determinando en primer lugar el d-dímero plasmático, que si .../ml excluye el diagnóstico, si es mayor se realiza ecografía, que si positiva confirma diagnóstico, si negativa se realiza estratificación de riesgo y se repite ecografía una semana después en pacientes de alto riesgo (estrategia 2).

Se estudian 398 pacientes con sospecha clínica de TVP, que acudieron al servicio de urgencia en un periodo de 17 meses (2000-2001), en todos ellos se determina d-dímero (vidas) y se hace estratificación de riesgo clínico. Se realizó seguimiento durante tres meses a todos los pacientes en los que no se confirmó el diagnóstico. Se utilizó como indicador de eficacia el número de falsos negativos (pacientes en los que tras excluir inicialmente el diagnóstico, se diagnostica ETEV en los tres meses siguientes a la primera exploración). Se cuantifican las ecografías potencialmente evitadas con la segunda estrategia.

Resultados: Si aplicáramos la primera estrategia se habrían realizado 398 ecografías con una prevalencia de TVP del 23%. Con la segunda estrategia se realizaron 295 ecografías, 245 en pacientes con d-dímero > 1 ng/ml y 50 repetidas a la semana en pacientes con primera ecografía negativa y estratificación de alto riesgo. Con la segunda estrategia se evitaron 103 ecografías (26% de las realizadas con la primera). El número de falsos negativos con la primera estrategia sería del 2,7% (IC 95% 0,4-3,6%) frente al 1,3% de la segunda (IC 95% 1,2-5,4%) siendo la P > 0,05.

Conclusiones: La efectividad diagnóstica de la nueva vía, es tan elevada como la conseguida con la estrategia inicial. La reducción del número de ecografías aplicando la segunda estrategia fue del 26%, lo que se traduce en una reducción de la presión asistencial en el servicio de radio-diagnóstico.

P-147

VÍA CLÍNICA DE BRAQUITERAPIA DE PRÓSTATA

R. Valencia Martín, F.J. Gracia San Román, A.B. Fernández Llanes, C. Nuñez Mora, A. Escribano Uzcudun y J. García Caballero
Hospital Materno-Infantil, Servicio Medicina Preventiva.

P-148

Palabra clave: Coordinación, Braquiterapia, Calidad, Información.

Objetivos: a) Mejora de la calidad asistencial. b) Mejora de la calidad de vida de los pacientes. c) Mayor satisfacción de los pacientes con la asistencia recibida. d) Coordinación de los Servicios implicados (Urología, Oncología Radioterápica, Radiofísica/Radioprotección y Anestesia).

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica sobre el proceso a tratar, seleccionando la información de mayor evidencia científica disponible; posteriormente, a través de reuniones con los Servicios implicados, se elaboró la matriz temporal con la evolución más probable de un enfermo sometido a este procedimiento; posteriormente, se diseñó la hoja de tratamiento en la que se señala todo lo que el enfermo va a recibir durante su estancia más probable en el hospital; este mismo documento consta de espacio para reflejar las variaciones que se lleven a cabo. Es clave la información a los pacientes; se creó un único consentimiento informado que incluyera los riesgos tanto de la cirugía como de la propia radiación recibida y emitida; se diseñó un tríptico de información para el paciente y/o familiares en el cual se informa de los pasos a seguir; este documento también incluye medidas de precaución con las semillas radiactivas, precauciones recomendadas por el Servicio de Radiofísica/Radioprotección; además, se incluye una hoja de información iconográfica sencilla explicando la evolución a seguir en el ingreso para la cirugía. Se utilizará el cuestionario de salud SF-36, el cual se entregará a los pacientes previamente a la cirugía y posteriormente (a los 6 meses), para poder establecer así una mejoría real en la calidad de vida. Asimismo, se les entregará una encuesta de satisfacción el día del alta hospitalaria para poder establecer los puntos fuertes y débiles de todo el proceso asistencial. Se ha diseñado también una base de datos para poder realizar un seguimiento de los pacientes que se incluyen en esta vía clínica; también se realizó un documento de evaluación de la vía clínica con una serie de indicadores para evaluar distintos aspectos.

Resultados: 1) Matriz temporal/hoja de tratamiento (variaciones). 2) Único consentimiento informado. 3) Tríptico de información. 4) Hoja de información iconográfica. 5) Cuestionario de salud SF-36. 6) Encuesta de satisfacción. 7) Base de datos. 8) Indicadores.

Conclusiones: A pesar de la dificultad que suponía que varios servicios se coordinaran para realizar una actividad asistencial, la vía clínica constituye una herramienta que consigue poner orden a los procesos. Con ello se pretende no sólo mejorar la calidad propiamente asistencial sino también la calidad percibida por los enfermos (satisfacción y calidad de vida).

GRUPO DE MEJORA DE VALIDACIÓN DE PLANES DE CUIDADOS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA

E. Díaz Sampedro, P. Herrera Carral, T. Dierssen Sotos, M. Robles García, M. Rodríguez Rodríguez y A. Díaz Mendi
Hospital Sierrallana, Servicio Medicina Preventiva.

Palabra clave: Validación. Protocolos. Planes de Cuidados.

Objetivos: Garantizar la Calidad Asistencial a través de la validación de los Planes de Cuidados, Protocolos, Procedimientos, Registros y Recomendaciones, así como potenciar la formación e investigación en los temas referidos.

Métodos: Constitución de un Grupo de Mejora multidisciplinar, que a través de la elaboración de Guías de Diseño y Elaboración de Protocolos, Planes de Cuidados y Procedimientos, valida el diseño y presentación de los documentos realizados en las distintas Unidades antes de su implantación. Como fuentes de datos para la confección de las mismas, se utilizó la búsqueda informatizada en la base de datos PubMed con las palabras clave: Validity, Reproducibility y Protocol como texto libre junto con Nurse's care. Además se accedió a documentación de cursos formativos, y a partir de ella a literatura gris. En dichas Guías se definen las distintas fases para la construcción de los documentos, así como un modelo de presentación de los mismos.

Resultados: Se han elaborado y difundido Guías para el Diseño y elaboración de Protocolos, Planes de Cuidados y Procedimientos. Hasta ahora, sólo se ha realizado la validación a nivel de presentación de los documentos. El primer año, que coincidió en el tiempo la presentación de las Guías, y la elaboración de los documentos protocolizados, el Grupo revisó, adaptó y acreditó, todos los documentos: 6 PCE, y 3 Protocolos. Ninguno de ellos cumplía al 100% el modelo propuesto. El 2º año de 5 PCE y 6 Protocolos, 6 cumplían, antes de su acreditación, al 100% los criterios evaluados. Como complemento a estas actividades, se han realizado 3 cursos sobre metodología enfermera, y 1 de investigación. Los documentos validados se han presentado en sesiones generales de enfermería.

Conclusiones: La elaboración de las Guías nos ha permitido conseguir una mejora en la calidad de la protocolización de los servicios enfermeros. Además hemos conseguido un registro de los cuidados ofertados, y la aplicación del método científico a la labor de cuidar. Hemos podido identificar puntos, que ajustándose al modelo propuesto resultaban débiles para la evaluación de las actividades protocolizadas. Es necesario ajustar el modelo propuesto a nuestro entorno.

P-149**EL INGRESO: UNA OPORTUNIDAD PARA LA INFORMACIÓN**

M. Bas Méndez, J.L. Castro Fariña y M.C. López Vale
Hospital Do Meixoeiro.

Palabra clave: Información, Protocolo, Ingreso.

Objetivo: La satisfacción de los pacientes es una de las dimensiones de la calidad y, según publicaciones recientes, uno de los aspectos que más valoran éstos para sentirse satisfechos es la información que reciben.

El momento del ingreso en el hospital, es particularmente importante, porque supone una situación estresante para el usuario ante un ambiente desconocido y posiblemente hostil.

Nuestro objetivo, desde la Dirección de Enfermería, es garantizar que el paciente y su familia reciban una información comprensible de su proceso de cuidados desde la recepción del paciente en el hospital.

Metodología: Incluido en el Manual de Procedimientos de cada unidad está el "Protocolo de recepción y acogida del paciente".

Durante el año 2001 se realizó la monitorización del cumplimiento del protocolo utilizando siete indicadores que median básicamente tres aspectos de la acogida: recepción del paciente en el hospital y en la unidad, información y cuidados.

La recogida de datos para esta monitorización se realizó mediante una encuesta que se pasaba en un día predeterminado a todos los pacientes que habían ingresado a lo largo del día anterior (40 aproximadamente).

Después de obtener los primeros resultados, se planteó que este Proceso de Acogida debería ser revisado por un Grupo de Mejora, que a su vez está integrado en el "Grupo de Dinamizadores de Calidad" y favorecer de esa manera la participación de los profesionales en la detección de problemas y búsqueda de soluciones.

Resultados: El cumplimiento global del protocolo oscila entre el 66% y el 78%, siendo los criterios relacionados con la información los que reflejan un porcentaje mas bajo de cumplimentación.

Conclusiones: 1) La evaluación de la situación inicial y la monitorización periódica de indicadores, nos permite detectar áreas de mejora. 2) La participación activa de los profesionales, en la recogida, análisis y difusión de los resultados, así como, en la búsqueda de soluciones contribuyen a la satisfacción tanto de pacientes como de los profesionales.

P-151**¿ES POSIBLE UNA TRAYECTORIA CLÍNICA PARA EL AVC ISQUÉMICO EN UN HOSPITAL GENERAL BÁSICO?**

J. Altés Capellá, A. Arribas Bartolomé, M. Piñol Galofré,
R. Rosique Jové, C. Rizo Rey y J. Grau Cano
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.

Palabra clave: Trayectoria clínica, AVC Isquémico.

Objetivos: Valorar la elaboración, implementación y seguimiento de una Trayectoria Clínica (TC) para el AVC Isquémico en un Hospital Comarcal.

Metodología: Análisis global inicial del procedimiento mediante la revisión de 20 casos de pacientes ingresados con el diagnóstico de AVC Isquémico (enero-abril 2001); revisión bibliográfica; creación de un grupo de trabajo multidisciplinario; convocatoria de 10 reuniones de trabajo entre noviembre 2000 y febrero 2001; aprobación del documento de TC por el grupo de trabajo (febrero 2001); presentación del nuevo documento a las Direcciones Médica y de Enfermería; diseño de la nueva documentación de registros -hoja de validación y hoja de variaciones (marzo-junio 2001); 4 reuniones de presentación y formación a los profesionales implicados en la TC (mayo-junio 2001). Fecha implementación de la TC con la nueva documentación de registro: Junio 2001. Análisis seguimiento postimplementación mediante la revisión de 27 casos (junio-setiembre 2001); reunión del Comité de TC para la presentación del informe de seguimiento y revisión de documentos (enero 2002).

Resultados: 1) Mejoras de proceso: (a) Urgencias: Valoración consulta urgente por neurólogo (primeras 24 horas); consulta rehabilitación en ordenes de ingreso; TAC craneal primeras 6 horas; realización escala valoración neurológica cada 4 horas (escala de valoración neurológica canadiense modificada); realización test de deglución; implantación guías/protocolos: tratamiento anticoagulante/antiagregante, profilaxis TVP, tratamiento HTA. (b) Hospitalización: Día 1: comunicación con UFISS (enfermería); valoración por rehabilitación y UFISS; seguimiento por enfermería de escala valoración neurológica. Día 2: entrega hoja informativa sobre AVC. Día 3: información de UFISS sobre servicios y recursos existentes. Día 4: valoración/coordinación conjunta de rehabilitación y UFISS con Medicina Interna y Enfermería; planificación del destino a la alta por UFISS. 2) Introducción de nueva documentación de registros: hoja de validación y hoja de variaciones. 3) Indicadores asistenciales: Estancia media previa: 9,6 (+/- 4,8); Estancia Media post-revisión 6,2 (+/- 4,9) días. 4) Modificación post-primeras-evaluación de documento de TC y de la documentación de registros.

Conclusiones: La creación e implementación de la Trayectoria Clínica del AVC isquémico es posible en un Hospital General Básico, habiendo aportado una revisión sistemática, dinámica y multidisciplinaria de esta patología, un rediseño del proceso y la introducción de una nueva sistemática de trabajo. En una primera evaluación, observamos mejora de resultados en los apartados de variabilidad clínica, coordinación entre profesionales y estancia media.

P-150**VÍA CLÍNICA DE TRATAMIENTO DE PERITONITIS EN DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA**

F.J. Gracia San Román, P. Alonso Vigil, Fernández De Larrea, P. Jadraque Jiménez, M.A. Bajo Rubio y J. García Caballero
Hospital Materno-Infantil, Servicio Medicina Preventiva.

Palabra clave: Peritonitis, Calidad, Diálisis Peritoneal Ambulatoria, Información.

Objetivos: a) Desarrollo y puesta en marcha de una vía clínica que aborde esta complicación. b) Mejora de la asistencia en el manejo de este proceso. c) Mejora de la calidad percibida por el paciente. d) Mejora de la información sobre el manejo por parte del paciente de la Diálisis Peritoneal Ambulatoria.

Metodología: Se establece un grupo de trabajo con los profesionales que diariamente abordan este problema (Servicio de Nefrología: Unidad de Diálisis Peritoneal). Se realizó una puesta en común de la bibliografía más relevante y lo que se estaba haciendo hasta ese momento, y a través de reuniones periódicas, se elaboró una matriz temporal, en la que se indica lo que se debe hacer cada vez que acude el paciente y una hoja de variaciones de la vía. Se elaboraron trípticos-dípticos de información sobre la diálisis para los pacientes (pasos a seguir para un correcto funcionamiento de la diálisis, precauciones y cuidados del catéter, correcto lavado de manos previo a diálisis, guía de complicaciones y recomendaciones). También se diseñó una encuesta de satisfacción para los pacientes.

Resultados: Matriz temporal/Hoja de variaciones de la vía clínica: Mejora de la calidad de la asistencia. Trípticos/Dípticos de información para el paciente: Mejora de la calidad percibida por el paciente así como el manejo correcto de la diálisis por parte del mismo, lo que disminuirá la aparición de complicaciones. La información constituye además una forma de disminuir la angustia de los pacientes. Encuesta de Satisfacción: Forma de evaluar la mejora de la satisfacción de los pacientes.

Conclusiones: El desarrollo e implantación de una vía clínica sobre una complicación tan importante en los pacientes en diálisis, permitirá mejorar no sólo la calidad asistencial sobre este proceso (disminución de la variabilidad de la práctica clínica), sino también mejorar la calidad percibida por los pacientes.

P-152

IMPACTO DE UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE CUIDADOS EN LOS PROFESIONALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA

E. López Jiménez, M. García Jiménez, C. Valero Cabrera y M.A. Delgado Cáceres
Hospital Universitario Reina Sofía, Unidad Docencia.

P-153

Palabras clave: Protocolización, cuidados de UPP, estrategia, formación, comunicación.

Introducción: En el H. U. Reina Sofía contamos con un Protocolo de Cuidados para UPP, que contempla la atención desde una perspectiva holística, buscando la independencia de la persona. Tras el último corte de prevalencia de Junio de 2001, y debido a un aumento de la proporción de casos, el equipo de mejora de UPP nos cuestionamos si los profesionales de nuestro hospital conocen dicho Protocolo y lo utilizan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

Objetivo: 1) Identificar déficits en los conocimientos de los profesionales de enfermería del HURS, sobre los cuidados que para el problema de las UPP recoge el Protocolo de nuestro hospital. 2) Así como posibles puntos débiles que dificultan la adecuada realización de estos cuidados.

Material y métodos: Se ha diseñado para este fin un estudio prospectivo y analítico mediante encuesta antes y después de la intervención. La encuesta, que recoge 36 ítems de preguntas cerradas, fue pasada durante el mes de Noviembre 2001 a un total de 313 profesionales: 115 de AE y 198 de DUE. En ninguno se identificó a los profesionales, tomando las debidas precauciones para preservar el anonimato. En Marzo de 2002, tras una intervención participación del equipo de mejora en sesiones de formación en servicio, se hizo una nueva encuesta con los mismos ítems y se realizó un análisis comparativo de los resultados.

El análisis comparativo se determinó mediante el test de la chi cuadrado o el test exacto de Fisher para los datos nominales.

Resultados y conclusiones: Ofrecemos solo los datos obtenidos del análisis comparativo de cuatro variables:

Conocen el protocolo ($p = 0,01$).

Usan la hoja de incidencia ($p = 0,0001$).

Realizan cambios posturales (no significativo).

Conocen el uso adecuado de los distintos apóstoles ($p = 0,026$).

En la presentación se facilitarán el resto de los datos ya recogidos (36 ítems estudiados).

Se detecta como punto débil: déficit en el registro de la valoración de riesgo.

Se ha conseguido aumentar el nivel de conocimientos del protocolo por parte de los profesionales.

LA VÍA CLÍNICA COMO INSTRUMENTO DE MEJORA CALITATIVA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

M.R. Dalmau Llorca, C. Aguilar Martín, C. Curto Romeu, J.L. Clua Espuny, N. Beguer Larrumbe y A. Roig Panisello
CAP El Temple.

P-155

Objetivos: Identificar posibles diferencias entre los resultados actuales de la gestión clínica de la diabetes tipo 2 (DM) en el ámbito de atención primaria (AP) y los estándares de la American Diabetes Association (ADA) y el National Center for Quality Assurance (NCQA). Sistematizar el proceso clínico de la atención al paciente diabético en atención primaria mediante la implantación de una vía clínica.

Metodología: Se diseña un estudio de intervención tipo "antes-después". La población de estudio es casos incidentes de DM registrados en el sistema informático de AP pertenecientes a un área básica de salud (ABS). Se realiza una valoración inicial de los indicadores de calidad asistencial de DM sobre una muestra aleatoria de 315 DM, junto una encuesta de satisfacción de la atención recibida. Posteriormente se diseña una vía clínica basada en la atención al paciente desde el diagnóstico hasta la aplicación anual del protocolo.

Resultados: Valoración inicial: insulinitizados 18,6%, uso de automonitorización 64,5%, HbA1c > 7% 21,9%, TAS > 140 48,7%, TAD > 90 18,6%, LDL > 130 47,7%, sin exploración de pies 48,7%, sin exploración ocular 33,3%, sin exploración de función renal 15%, RCV > 20 38,7%. El nivel de las distintas dimensiones de satisfacción oscila entre 6,3 y 8,2 en una escala del 1-10. El grupo de trabajo de la vía está formado por 3 médicos y 3 enfermeras ha consensuado 3 visitas de acogida que recogen tareas a realizar por medicina (M) y enfermería (E) consecutivamente: visita 1: M: confirmación de diagnóstico y evaluación de órganos diana; E: información básica de supervivencia y constantes. Visita 2: M: estratificación de riesgo; E: examen de pie diabético. Visita 3: M: detección de complicaciones; E: educación diabetológica grupal. Se realizará una evaluación anual que se basará en indicadores previamente acordados y se repetirá la encuesta de satisfacción anualmente.

Conclusiones: La vía clínica se diseña para minimizar recursos y maximizar la calidad asistencial. Este proyecto pretende aportar un plan de mejora de la calidad en la atención del paciente diabético dado el interés actual de este proceso junto con la importancia del concepto de riesgo cardiovascular.

VÍA CLÍNICA DEL PIE DIABÉTICO EN HOSPITALIZACIÓN: PAPEL DE ENFERMERÍA EN SU EXPLORACIÓN Y SEGUIMIENTO

M.A. Aznar García, C. López Pérez, M.C. Andreo Andreo, A.J. Pérez Fernández, R. Montero Gómez, E.M. García Ayala y R. Liebanas Bellón
Hospital Morales Meseguer. Servicio de Farmacia.

P-154

Palabra clave: Vía clínica; Pie diabético; Enfermería.

Introducción: El tratamiento y los cuidados que requiere un paciente afectado por un pie diabético en Atención Especializada son muy variados y de carácter multidisciplinar, en los cuales el papel de enfermería, junto con el resto de especialistas implicados (cirujanos, endocrinios, fisioterapeutas, rehabilitadores, etc.), es de crucial importancia. Con la aplicación de VÍAS CLÍNICAS se ha conseguido una mejor coordinación de los diferentes profesionales implicados y proporcionan una mejor eficiencia clínica. La exploración del pie diabético a su ingreso en la Unidad de Hospitalización, aporta una información certera sobre su estado, y consecuentemente su valoración y evolución puede ser más objetiva y precoz.

Objetivo: Configurar una hoja de recogida de datos para la exploración del pie diabético que debía ser: completa, detallada, sistemática, sencilla, asumible y consensuada por profesionales implicados, que incluyera criterios de: validez, fiabilidad, relevancia y utilidad en todos los ítems seleccionados.

Material y método: Un grupo de trabajo (2 enfermeros, un médico de Urgencias y un cirujano) realizó una revisión de la bibliografía relacionada y seleccionó los ítems siguiendo los criterios establecidos. Posteriormente los resultados fueron consensuados y unificados por los profesionales integrantes de la Vía Clínica.

Consideraciones: Se realizaron seis borradores que consecutivamente fueron sometidos a un proceso de validación y fiabilidad hasta obtener 2 ejemplares definitivos.

Resultados: Se elaboró una *Hoja de Exploración de Primer Día* (página Din-A4) con 17 ítems, divididos en tres grandes grupos: Antecedentes, Exploración Física y Exploraciones Complementarias. Y una *Hoja de Seguimiento y Evaluación* (reproducida 4 veces en revés Din-A4) con los 7 ítems susceptibles de cambio.

Conclusiones: Una exploración amplia, detallada y sistemática del pie diabético es la mejor y más objetiva herramienta para la valoración de la evolución de los pacientes afectados por esta patología. El personal de enfermería de la Unidad de Hospitalización tiene un contacto directo y continuo con el paciente, es el responsable de realizar la cura del pie diabético y el que mejor conoce su evolución y desarrollo, además posee los conocimientos y aptitudes necesarias para su correcta exploración y seguimiento, convirtiéndolo en el profesional indicado para su realización en una Unidad de Hospitalización.

LA HOSPITALIZACIÓN PARA HERNIORRAFIA INGUINAL O FEMORAL DESDE LA INTRODUCCIÓN DE LA CIRUGÍA AMBULATORIA

C. Lema Devesa, J. Mariñas Dávila, E. Bouzas Caamaño, P. Pipenbacher Gertmann, M. Castro Villares y J. Escudero Pereira
Complejo Hospitalario Juan Canalejo Subdirección.

Palabra clave: Hernia, estancia, cirugía ambulatoria

Objetivo: La cirugía de las hernias inguinal y femoral se ha modificado en los últimos años con la introducción de la cirugía ambulatoria. En este estudio hacemos una descripción de la evolución de la hospitalización para herniorrafia inguinal o femoral en los últimos 6 años considerando la realización de la técnica por cirugía ambulatoria.

Material y métodos: Hemos utilizado los datos del Sistema de Información de Análisis Complexos de Hospitalización de Agudos (SIAC-HA) del Servicio Galego de Salud (SERGAS) y los de la Unidad de Codificación Clínica del Complejo Hospitalario Juan Canalejo. Estudiamos los años 1996 al 2001 inclusive. Se realiza un estudio descriptivo univariante de variables de interés: episodios, edad, reingresos, tipo de tratamiento y su asociación bivariante con los pacientes intervenidos ambulatoriamente.

Resultados: Durante estos 6 años se han realizado 771 herniorrafias ingresadas suponiendo 2.141 estancias y con una edad media de 27 años, de ellas 312 corresponden a pacientes mayores de 14 años y 1.086 ambulatorias, siendo sólo 8 en pacientes menores de 14 años; con una tendencia decreciente para los ingresos y creciente en los casos ambulatorios. En los pacientes ingresados 615 eran varones con una edad media de 30,3 y estancia media de 3,01 días, y 156 eran mujeres con edad media de 14,7 años y estancia media de 1,83 días. La estancia media total se redujo en estos años de 3,1 a 2,9 días, y para los pacientes adultos desde 5 a 4 días. El porcentaje de ambulatorización global ha subido en este período un 25% (del 43,2% al 68,3%), para pacientes adultos este porcentaje fue del 77% en el período estudiado con un máximo del 83,9% en 1999.

Conclusiones: En nuestro centro hay un crecimiento del abordaje ambulatorio de las herniorrafias frente al ingreso tradicional, se observa una tendencia de la estancia media de los pacientes ingresados a disminuir, lo que supone que la mejor gestión de los ingresos contrarresta la posible selección de pacientes más complejos no susceptibles de manejo ambulatorio.

PÓSTER VII

Calidad en distintos ámbitos y servicios

Sala Navarra
Jueves 10 y viernes 11

EVALUACIÓN DE LA ANALGESIA POSTOPERATORIA EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA VASCULAR Y GENERAL

B. Valentín López, N. Calcerrada Díaz-Santos, D. Moscoso Sánchez, J.M. Muñoz y Ramón, P. Aparicio Grande y J. García Caballero
Hospital La Paz.

Palabra clave: Encuesta. Analgesia postoperatoria.

Introducción: La evaluación de la analgesia en los pacientes intervenidos en los servicios de cirugía general y vascular forma parte de la puesta en marcha en nuestro hospital La Paz de un programa de analgesia aguda.

Objetivos: Describir la situación actual de la atención y tratamiento del dolor postoperatorio en el Hospital Universitario La Paz para establecer propuestas de mejora.

Metodología: Se elaboró una encuesta anónima, a partir de un cuestionario de la American Pain Society, que consta de 14 preguntas, que recogen las características de dolor postoperatorio, la información recibida sobre el tratamiento del dolor, la solicitud de medicación, y el grado de satisfacción. Los datos referentes al procedimiento quirúrgico y a la analgesia utilizada se completaron mediante la revisión de la historia clínica del paciente. La encuesta se llevó a cabo mediante entrevista en el postoperatorio inmediato a todos los pacientes intervenidos de cirugía en los Servicios de Cirugía General y Cirugía Vascular. **Resultados:** Fueron entrevistados 158 pacientes, un 89% de Cirugía General y un 11% de Vascular. Clasificando la intensidad del dolor de los pacientes a priori en función del tipo de cirugía, un 58% de los pacientes presentaban dolor severo; un 38% dolor moderado y un 4% dolor leve. El dolor postoperatorio a las 24 horas muestra un 18% de los pacientes sin dolor, una meseta donde se encuentran el 80% de los pacientes con dolor leve-moderado, y un 10% de los mismos con dolor severo. La analgesia postoperatoria más empleada fueron los AINES en un 96%, con prescripción pautada en el 73% de los casos. Un 36% de los pacientes solicitaron la administración de un calmante. Existe una relación estadísticamente significativa entre la solicitud de analgesia y tener la medicación pautada a demanda ($p < 0,05$). La edad y el grado de información son variables relacionadas con la demanda de analgesia ($p < 0,05$), siendo los más jóvenes y los que reciben mayor información el grupo de pacientes que solicitan con más frecuencia analgesia.

Conclusiones: El dolor postoperatorio constituye una oportunidad de mejora para el establecimiento de mejoras en la atención y tratamiento de los pacientes intervenidos, máxime cuando existen tratamientos analgésicos eficaces para el control del dolor que no se están utilizando, debiendo acabar con la modalidad de prescripción a demanda en todas aquellas intervenciones que de antemano se sabe van a experimentar dolor postoperatorio. La satisfacción del paciente con la atención recibida es muy alta, siendo mejorable la información suministrada al paciente.

P-156

IMPLANTACIÓN DE LA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA Y REPERCUSIÓN EN LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS

I. Lanzeta Vicente, J. Vidán Alli, E. Martínez Ochoa, M.L. Saldañá Lusarreta y J. García de Jalón Sanz
Hospital Virgen del Camino, S^o Medicina Preventiva.

Palabras clave: Cirugía Mayor Ambulatoria, Índice de sustitución.

Introducción: La cirugía mayor ambulatoria (CMA), junto con la hospitalización de día, es un ejemplo de las nuevas formas de atención hospitalaria que evitan el ingreso. Se entiende por CMA la práctica de determinados procedimientos terapéuticos y/o diagnósticos de mediana complejidad en enfermos que vuelven a su domicilio el mismo día de la intervención, después de un período de observación y control.

Objetivos: a) Estudiar la implantación de la CMA en nuestro hospital. b) Calcular el índice de sustitución en CMA desde su implantación. c) Revisar qué procedimientos potencialmente ambulatorios no se realizan. d) Calcular el porcentaje de ingresos en procedimientos inicialmente ambulatorios.

Metodología: A partir del CMBD y de la base de datos de CMA de los años 1999-2001, se realiza el estudio y el análisis descriptivo. El índice de sustitución se obtiene comparando el número de procedimientos realizados por CMA con los realizados mediante hospitalización convencional.

Resultados: La CMA se implantó en nuestro hospital en 1999 en todos los servicios quirúrgicos, con 1.265 intervenciones, que han ido aumentando hasta 2333 en 2001. Índice de sustitución a lo largo de los 3 años: 11,64%, 15,98%, 19,23%. Por servicios ha aumentado, salvo en Cirugía Maxilofacial y en Cirugía Plástica. Se confirma que muchos procedimientos potencialmente ambulatorios del Contrato Programa no aparecen en nuestra base de CMA. Porcentaje de pacientes con procedimientos inicialmente ambulatorios que finalmente requirieron ingreso: 1,34%, 0,49% y 0,56% respectivamente. La estancia media de los servicios quirúrgicos no se ha modificado significativamente.

Conclusiones: El índice de sustitución se incrementa progresivamente, pero sigue habiendo muchos procedimientos potencialmente ambulatorios. Esto puede deberse a que o no se han implantado o siguen otro circuito. El incremento de la actividad ambulatoria se incluirá entre las propuestas de mejora del hospital para el año 2002. La repercusión en la estancia media de la externalización de pacientes en los servicios presenta un efecto parádójico: no se observa incremento. Esto puede estar influido por el peso de la política de reducción de estancias del hospital. Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de ingresos en pacientes inicialmente ambulatorios, podemos suponer que la CMA tiene una excelente calidad.

P-158

GESTIÓN PARA TRATAMIENTO TEMPRANO EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA

B. Acea Nebril, C. Candia Bouso B, J. Mosquera Osés, S. Jorge Méndez, J.M. Fernández Blanco y S. Couce
Hospital Juan Canalejo.

Palabra clave: Cáncer de mama demoras quirúrgicas.

Introducción: El Programa de Gestión de Tratamiento Temprano de mujeres con cáncer de mama consiste en la intervención sobre el circuito de las pacientes, y está orientado a la reducción de las demoras. Fue implantado el 1 de abril del 2001. Contempla la realización de la mamografía el mismo día que son atendidas en la consulta externa por presentar síntomas o signos sugestivos de cáncer mamario, y la biopsia, si precisa, con aguja gruesa 14G para confirmación histológica en las primeras 24 horas. Asimismo, contempla la actuación sobre el circuito de las pruebas preoperatorias.

Objetivo: Evaluar la intervención del Programa.

Material y método: Se realiza un estudio prospectivo antes-después para evaluar el Programa. Se seleccionan dos cohortes de pacientes: *Grupo antes*: mujeres intervenidas por carcinoma de mama antes del Programa. *Grupo después*: mujeres intervenidas por carcinoma de mama después del Programa. Fueron excluidas las mujeres sometidas a terapia neoadyuvante y las diagnosticadas en otro centro. Se analizan las demoras registradas y su relación con distintas variables preoperatorias (edad, síntoma de presentación, pertenencia al programa de screening y el tipo de biopsia). El análisis estadístico se lleva a cabo con el SPSS v.10.0 Inc, 1999®, aplicando el test de comparación de medias, y se establece el nivel de significación en $p < 0,05$.

Resultados: De las 126 mujeres intervenidas por un carcinoma de mama durante el período a estudio, 110 cumplieron los criterios de inclusión. (Grupo antes: 59 pacientes; Grupo después: 51 pacientes). Se constató un descenso de 11 días en la demora media quirúrgica tras la instauración del Programa, siendo la demora media hasta la intervención para el grupo antes: $28 \pm 17,4$ días, y para el Grupo después: $17 \pm 9,5$, diferencias que fueron estadísticamente significativas ($p < 0,001$). En el Grupo antes la mayor demora media la tenían las mujeres procedentes del programa de screening (36,2 días) y las que presentaban lesiones no palpables (35,1 días). Con la implantación del Programa, se evidencia una mejora en la demora media quirúrgica, pasando a ser para las mujeres procedentes del programa de screening 21,2 días, y para las que presentaban tumores no palpables descendió a 14,6 días, diferencias que fueron estadísticamente significativas.

Conclusiones: La intervención con el Programa de Gestión para Tratamiento Temprano ha permitido reducir la demora media para todas las mujeres en espera de intervención quirúrgica. Las enfermas con tumores no palpables que precisan una biopsia quirúrgica para la confirmación histológica constituyen un grupo especial con mayor demora quirúrgica. Así, la presencia de mayor demora para el grupo concreto del Programa de Screening nos ha de orientar a una revisión más específica que facilite aún más, si es posible, la demora sobre estas mujeres.

P-159**MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES DE BY-PASS DE ARTERIAS CORONARIAS. REGIÓN DE MURCIA 1999-2000**

J.E. Calle Urra

Palabra clave: Calidad, CMBD, By-pass de arterias coronarias.

Objetivos: Procedimiento cuya realización requiere pericia técnica y el uso de una tecnología compleja. Los errores en la realización de la misma pueden dar lugar a complicaciones tales como apoplejía y muerte. Necesidad de monitorizar las intervenciones realizadas en cuanto a volumen y resultados.

Metodología: CMBD de años 1999 y 2000. 8 hospitales públicos de la Región de Murcia. Indicadores del sistema de monitorización de la calidad HCUP-II (volumen de procedimientos y mortalidad en mayores de 39 años). Porcentaje de hospitales que realizan intervención, volumen medio de procedimientos realizado, estabilidad en la realización de procedimientos, principales motivos de ingreso, porcentaje de episodios en GRD's de complicación-comorbilidad (CC) mayor, tasa de mortalidad.

Resultados: Sólo 1 de los 8 hospitales analizados (12,5%) realizaba esta intervención. La media de procedimientos realizados en los 2 años analizados fue de 160 (163 en el primer año y de 157 en el segundo), lo cual supone que el volumen se mantiene estable pero decreciente. El principal motivo de ingreso fue la arteriosclerosis coronaria de arteria coronaria nativa (83,92%), ocupando el segundo lugar las alteraciones de la válvula aórtica (5,10%). La tasa de mortalidad fue, para los 2 años, de 16,56%, oscilando entre el 17,8% del primero y el 15,3% del segundo año. En cuanto al porcentaje de episodios en GRD's de complicación-comorbilidad mayor (545 a 547) este fue del 25,7% en el 99 y del 28% en el 2000.

Conclusiones: El volumen de procedimientos puede considerarse adecuado de acuerdo con el primero de los estándares recomendados en el HCUP-II (100 o más procedimientos), pero por debajo del segundo (200 o más). Altos volúmenes de este procedimiento han sido asociados a mejores resultados, generalmente menor mortalidad. La tasa bruta de mortalidad es superior a la encontrada en otros estudios realizados en Estados Unidos (5,1%) donde la media de procedimientos realizados era también mayor (266-636 según los Estados). De todos modos la tasa descendió para los años analizados, al contrario que el porcentaje de episodios en GRD's con CC mayores. No se realizó ninguna intervención ambulatoria para este procedimiento en los años en estudio.

P-160**PROYECTO PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROCESOS QUIRÚRGICOS EN LAS LISTAS DE ESPERA (LE)**

J. Alcalde Escribano, P. Ruiz López, E. Rodríguez Cuellar, R. Villetta Plaza, J.I. Landa García y E. Jaurrieta Mas

Palabra clave: Priorización de Listas de Espera, Gestión de Listas de Espera.

Objetivos: Definir criterios clínicos que permitan establecer las prioridades en las LE para los procesos benignos más prevalentes en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Metodología: Clasificación de las prioridades (Siguiendo pautas del Ministerio de Sanidad): Pacientes con prioridad alta (PA): Pacientes con indicación de cirugía programada, pero no permite una demora superior a 30 días. Pacientes con prioridad media (PM): Pacientes cuyo tratamiento quirúrgico permite una demora algo mayor, pero inferior a 90 días. Pacientes de prioridad baja (PB): Pacientes cuyo tratamiento quirúrgico puede demorarse más de 90 días.

Fases del desarrollo metodológico: 1ª. Revisión bibliográfica. 2ª Análisis de las LE de algunos centros y selección de los procesos a estudiar. 3ª Selección de criterios de inclusión y exclusión que definen los procesos objeto de estudio y sus factores agravantes. 4ª Elaboración de los cuestionarios. 5ª Entrega a los participantes de la metodología del proyecto, bibliografía y cuestionarios, 6ª Análisis de la información obtenida mediante comparación de porcentajes, estableciendo el grado de prioridad a según los valores más altos. 7ª Redacción del informe que refleja el estado de opinión de los cirujanos.

Resultados: Se ha recogido la opinión de 50 especialistas en Cirugía General y del Aparato Digestivo pertenecientes a diferentes hospitales de la Sanidad Pública Española. Las prioridades definidas son las siguientes: -Sin factores agravantes: Colelitiasis simple (PB) (otros tipos no se especifican por falta de espacio), hernia inguinocrural (PB), hernia umbilical (PB), eventración laparotómica (PB), lesiones benignas de la mama (PB), bocio nodular eutiroideo (PB), hipertiroidismo (PM), sinus pilonidal (PB), hemorroides (PB), fisura anal (PB) y fistula anal (PB).

-Con factores agravantes: Colelitiasis simple (PM) (otros tipos no se especifican por falta de espacio), hernia inguinocrural (PA), hernia umbilical (PA), eventración laparotómica (PA), lesiones benignas de la mama (PM), bocio nodular eutiroideo (PA), hipertiroidismo (PA), sinus pilonidal (PM), hemorroides (PA), fisura anal (PA) y fistula anal (PM).

Conclusiones: El método desarrollado ha permitido establecer las prioridades de los procesos analizados, habiendo definido unos criterios clínicos sencillos y consensuados por cirujanos españoles.

P-161**LA INTEGRACIÓN DE INTERNISTAS EN LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS MEJORA LA CALIDAD ASISTENCIAL**

E. Montero Ruiz, C. Hernández Ahijado y J. López Álvarez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

Palabra clave: Interconsulta. Medicina Interna. Calidad asistencial.

Objeto: La relación entre los servicios asistenciales hospitalarios se fundamenta en el parte interconsulta. Este es un sistema poco eficaz y caro. En muchos casos no logra el objetivo final, mejorar el estado clínico del paciente para que sea posible realizar los procedimientos diagnósticos o terapéuticos previstos. Nos proponemos estudiar si la adscripción de internistas a los servicios quirúrgicos representa una mejora sobre el sistema actual de interconsultas.

Metodología: De octubre a diciembre de 2001 un internista y un residente de 5º año fueron destinados a tiempo completo al Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT). Atendían a los enfermos ingresados desde Urgencias, y a los programados una vez eran dados de alta de Reanimación, de la misma forma que se hace en Medicina Interna. Los resultados han sido comparados con los obtenidos por COT en el período enero-septiembre del mismo año mediante la T de Student. El escaso número de éxitos impide su adecuada valoración estadística. En 2001 el coste medio del día de estancia en COT ha sido 485.

Resultados: Ingresos urgentes(182): reducción de la estancia media en 3,12 días (27,8%) ($p < 0,005$), reducción de la estancia prequirúrgica en 1,52 (30,83%) ($p < 0,005$) y de la posquirúrgica en 2,22 (27,5%) ($p < 0,005$). Ingresos programados (210): reducción de la estancia media en 0,56 días (11%) ($p < 0,05$), no ha variado la estancia prequirúrgica y sí la posquirúrgica en 0,8 días (16,8%) ($p < 0,01$). Ingresos totales (392): reducción de la estancia media en 1,95 días (23,9%) ($p < 0,005$). La no presencia en COT de los internistas, en el período referido, habría originado un gasto adicional estimado de: $392 \times 1,95 \times 485 = 370.734$.

Conclusiones: Los internistas destinados en COT mejoran de forma muy significativa los parámetros asistenciales y económicos de dicho servicio. Los enfermos han sido mantenidos en una buena situación clínica que ha permitido reducir la espera prequirúrgica. Se ha conseguido disminuir las complicaciones posquirúrgicas, lo que ha originado una menor estancia posquirúrgica. Creemos que la adscripción de internistas a otros servicios quirúrgicos se traduciría en resultados similares a los obtenidos en COT.

P-162

CONSULTA ÚNICA EN CARDIOLOGÍA: UNA EXPERIENCIA DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

J.L. Zambrana García, C.M. Alba Fernández, A. Montijano Cabrera, M. Amat Vizcaíno, M.J. Velasco Malagón y M.D. Adarraga Cansino
Hospital Alto Guadalquivir.

P-163

Palabra clave: Consultas ambulatorias, calidad, cardiología.

Objetivos: La consulta única constituye una medida innovadora encaminada a la mejora de la calidad bajo el objetivo de resolver las necesidades de los ciudadanos en un único tiempo asistencial. Su puesta en marcha sólo precisa de una planificación efectiva de los procesos, sin infraestructura o inversión tecnológica especial. Nuestras consultas de cardiología mantenían una organización del trabajo tradicional, pero durante el pasado año 2001 adoptamos un sistema de consulta única a fin de mejorar la calidad de la asistencia a los enfermos cardiológicos. El objetivo de nuestro estudio es evaluar la viabilidad de la implantación de este sistema, así como las posibles mejoras obtenidas en cuanto a eficiencia y calidad asistencial.

Métodos: Análisis antes-después comparando la actividad desarrollada durante el año 2000 en nuestras consultas de cardiología (organización tradicional) frente a la actividad desarrollada durante el pasado año 2001 (organización de consulta única).

Resultados: La puesta en marcha de un sistema de consulta única consigue un aumento en el número las primeras visitas [115 (31) frente a 110 (29) pacientes/mes, $p < 0,001$], una reducción en el número de consultas sucesivas [(77 (20) frente a 80 (26) pacientes/mes, $p < 0,001$)] y un aumento de las revisiones realizadas en el día con pruebas complementarias [(37 (11) frente a 11 (11) consultas/mes)]. Del mismo modo, el porcentaje de consultas únicas realizadas en el año 2001 fue significativamente mayor comparándolo con el realizado durante el año 2000 [(83 (10) frente a 64 (13) %, respectivamente, $p < 0,001$). La encuesta de satisfacción nos sitúa en una puntuación de 9,2 sobre 10 en los ítems relacionados con dicho sistema de consulta.

Conclusiones: Un sistema de consulta única en cardiología permite frente a un sistema organizativo tradicional una mejora en la calidad asistencial prestada dado que permite alcanzar un diagnóstico y un tratamiento específico en el mismo día en un elevado número de pacientes. Esto conlleva un menor número de visitas sucesivas, menor gasto asociado a los desplazamientos al hospital y mayor satisfacción del paciente al permitir solucionar el problema de salud por el que consultó el paciente en un mismo día.

CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN (CAR): PROPUESTA DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN CONSULTAS EXTERNAS

J.M. Cucullo López, N. Flaquer Terrasa, J.M. Manrique Permanyer, B. Gamboa Huarte, M. Navarro Cirugeda e I. Guajardo Sinusía

P-164

Palabra clave: CAR, mejora calidad asistencial; salud funcional; demora; paciente anciano.

Objetivo: La medición de la salud del anciano viene definida en términos de función. La incapacidad es un marcador de fragilidad y de consumo de recursos asistenciales así como de deterioro de la calidad de vida. Un abordaje precoz ha demostrado la reversibilidad de la incapacidad sino total al menos parcialmente y una demora en su abordaje un deterioro de la calidad asistencial en el Servicio de Geriatría. En un esfuerzo de mejora de la calidad asistencial se propone el desarrollo en el centro de una Consulta de Alta Resolución para el estudio y orientación terapéutica (nivel asistencial adecuado) de los pacientes ancianos con patología funcional.

Metodología: En el diseño de la CAR han sido necesarios definir los siguientes puntos: pacientes, vía de contacto, criterios de inclusión, recursos humanos, medios materiales, instrumentos de valoración y respuesta. Indicadores de evaluación: adecuación del paciente ($nº$ de pacientes incluidos/ $nº$ de pacientes derivados; 80%); demora de la primera visita (15 días); tiempo de ejecución del proceso asistencial (2 días); porcentaje de pacientes resueltos en 2 días (80%); porcentaje de cumplimentación de los instrumentos de valoración (90%).

Resultados: La Consulta de Alta Resolución se oferta a los médicos de Atención Primaria para mayores de 65 años con deterioro funcional. Las solicitudes son evaluadas por la UNidad de Admisión. Según los criterios las derivará a CAR o a consultas externas. Instrumentos de valoración: Barthel, Tinnnett abreviado, MSQ. La historia clínica y pruebas complementarias (analítica, radiología, ecografía, ECG) se realizarán en el día y el informe se remitirá por fax. Los resultados tras 12 días de funcionamiento incluyen a 20 pacientes (17 mujeres); edad media 77,4 (varones 75,7) y proceden de Equipos de Atención Primaria. En esta fase inicial, aunque poco valorable, se cumplieron adecuadamente los marcadores anteriormente citados.

Conclusión: La CAR es una propuesta novedosa y factible de abordaje del deterioro funcional en el anciano. Permite una vía de acceso rápido y eficiente a la atención especializada. El abordaje precoz de la incapacidad permite disminuir su prevalencia y el impacto en el consumo de recursos y mejora la calidad de vida del anciano.

CÓMO SER MÁS EFICIENTES: MEJORAS EN EL CIRCUITO DE PREOPERATORIOS QUE SATISFACEN AL USUARIO

E. Verdiell Sansa, E. Villanueva Alonso, A. Galobart Roca

P-165

Palabras clave: Eficiencia. Circuitos. Diagrama de flujo.

Introducción: El enfermo que debe ser sometido a una intervención quirúrgica no urgente necesita ser evaluado preoperatoriamente según el protocolo existente. Para ello debe entrar en un circuito de programación y efectuación de pruebas y una posterior revisión médica. El circuito de preoperarios antiguo era complicado, con demoras y un bucle, lo que provocaba abandonos y preoperarios caducados que debían de volver a realizarse. Se revisa el circuito para optimizarlo.

Metodología: Se crea un grupo de mejora. Se utiliza la técnica del diagrama de flujo para visualización del circuito previo, detección de oportunidades de mejora y rediseño del mismo con la implantación de las acciones pertinentes. Valoración de los abandonos durante el primer trimestre de 2001/2002 como indicador de satisfacción de los usuarios.

Resultados: Se presentan ambos circuitos. Las acciones de mejora suponen la eliminación del bucle y la reducción de las demoras desde indefinidas a un máximo de 15 días. Se ha reducido el número de preoperarios a uno por persona. Se disminuye la complejidad del circuito, reduciendo los preoperarios caducados a cero. Los abandonos en algún punto del circuito se reducen del 24,2% al 7,9% ($p = 0,00001$).

Conclusiones: 1) La demora máxima es de 15 días. 2) No hay preoperarios caducados. 3) Se reducen los abandonos por causa de las demoras. 4) Se implanta la multiprogramación de pruebas complementarias en el mismo día. 5) Disminuye el número de preoperarios programados. 6) Aumenta la eficiencia del Área de Programación. 7) Supone una mayor satisfacción del usuario.

DISEÑO DE UNA GUÍA DE CONSULTAS EXTERNAS ORIENTADA AL CLIENTE DEL HOSPITAL DE ANTEQUERA

C. Cabrera, T. Cruz, J. Terol y M.M. Pérez
Hospital de Antequera.

P-166

Palabra clave: Guía, clientes, consultas externas, hospital de Antequera, diseño, metodología.

El Objetivo de este trabajo es comunicar la metodología que se ha seguido para el diseño de una guía de consultas externas desde la perspectiva del cliente.

Objetivos de la Guía de Consultas Externas son: 1) Reducir la incertidumbre que produce en los clientes de Consultas Externas el desconocimiento del funcionamiento del Hospital. 2) Facilitar información relevante para los clientes sobre los circuitos y procedimientos de los que va a ser protagonista en la asistencia que van a recibir en Consultas Externas. 3) Adecuar las expectativas de los clientes en Consultas Externas. 4) Mejorar el nivel de satisfacción con el servicio recibido en Consultas Externas.

Metodología: que se ha seguido: 1) Estudio preliminar sobre guías de consultas externas existentes. 2) Elaboración de un prototipo de Guía por parte de profesionales de Atención al Usuario y Enfermería de Consultas Externas, utilizando técnicas grupales. 3) Organización de Grupos Focales con clientes reales y potenciales de Consultas Externas para identificar necesidades de información y comunicación de los pacientes y para testar el prototipo de Guía de Consultas Externas elaborado. 4) Elaboración de la Guía de Consultas Externas. 5) Plan de comunicación integral de la Guía de Consultas Externas. 6) Seguimiento y Control anual de la Guía de Consultas Externas mediante Técnicas Grupales.

Resultado: Elaboración de una guía de Consultas Externas desde la óptica del cliente.

CIRCUITO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN CONSULTAS EXTERNAS

J.M. Depares y G. Soto
Institut Català d'Oncologia.

Palabra clave: Atención al cliente; calidad asistencial; trato personalizado.

Introducción: Para garantizar la máxima calidad al cliente a la llegada a Consultas Externas de nuestro Centro se ha puesto en marcha un circuito de atención y recepción personalizado donde están implicados todos los profesionales de nuestra Área.

Objetivos: 1) Ofrecer un mejor servicio al cliente. 2) Personalizar al máximo la atención al paciente. 3) Mejorar la calidad en la asistencia.

Material y método: 1) Revisión del circuito del paciente 1.1 El cliente llegaba a nuestra Área y se dirigía al Centro de Programación donde le enviaban a la sala de espera correspondiente; 1.2 El cliente se esperaba a que saliera el personal sanitario a recibirle y darle información del horario de visita. 2) Identificación de los puntos débiles. 2.1 Inexistencia de un punto de información y recepción de los clientes: Desamparo; 2.2 Falta de información del personal sanitario a la llegada de los clientes: Angustia. 2.3 Dimensión errónea de las salas de espera: Aglomeraciones; 2.4 Tiempos de espera excesivos: Desesperación; 2.5 Personalización insuficiente: Deshumanización; 2.6 Falta de señalización: Desorientación 3) Creación de un circuito de atención personalizado. El cliente llega al centro de recepción para ser visitado, el personal administrativo introduce los datos y le envía a la sala de espera correspondiente. El personal sanitario visualiza por pantalla el paciente y sale a recibirlle. Verifica en el ordenador la recepción de este cliente y queda en espera para ser visitado. El facultativo realiza la visita y el personal captura la visita del paciente y lo dirige al centro de programación para gestionar las futuras citas.

Resultados: Con este circuito se ha conseguido: 1) Existencia de un punto de información y recepción: Acojida; 2) Comunicación personal administrativo-sanitario: Coordinación; 3) Dimensión correcta de las salas de espera: Comodidad; 4) Tiempo de espera medidos: Organización; 5) Trato directo: Calidad humana; 6) Señalización correcta: Orientación.

Conclusión: El trabajo interdisciplinar de los profesionales del Área de Consultas Externas ha conseguido mejorar la calidad y la satisfacción del cliente.

P-167**ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE SANITARIO**

P. González de la Flor, J.L. Ruiz Arranz y J.L. Navarro Espigares
Complejo Hospitalario de Jaén.

Palabra clave: Transporte sanitario, eficiencia, protocolos

Introducción: Es frecuente la percepción del uso inadecuado del transporte sanitario, con su repercusión sobre la equidad y la eficiencia de la asistencia prestada. La mayoría de los trabajos realizados sobre este tema se centran solamente en servicios de urgencias. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de la implantación de un protocolo de prescripción de transporte sanitario en los pacientes asistidos en las consultas externas de la Línea de Traumatología del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

Métodos: Se diseñó un estudio cuasiexperimental pretest postest sin grupo control en las consultas externas del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, entre el 1 de marzo de 2000 y el 31 de agosto de 2001. Las variables de estudio han sido las siguientes: número de pacientes que acuden a consultas externas, número de ambulancias y taxis prescritos, diagnóstico médico que motiva la prescripción, tipo de indicación de transporte sanitario y nombre del facultativo prescriptor. Para determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje de prescripción de ambulancias y taxis previa y posteriormente a la implantación del programa se empleó el test de la ji Cuadrado, verificándose todas las condiciones de aplicación de dicho test.

Resultados: El transporte sanitario prescrito desde las consultas de Traumatología representa el 13,19% del prescrito en todo el Hospital durante el año 2000 y el 9,14% del prescrito en el año 2001. Previamente a la implantación del protocolo se prescribieron 854 transportes sanitarios, 566 ambulancias y 288 taxis, para un total de 7.374 pacientes atendidos. Tras la implantación del protocolo se prescribieron 862 transportes, 807 ambulancias y 55 taxis, para 6.431 pacientes atendidos. Globalmente se ha producido un aumento estadísticamente significativo en la prescripción total de transporte sanitario ($p = 0,0017$; RR = 1,16; IC 95% RR: 1,06-1,27). Aumentando la prescripción de ambulancias ($p < 0,0001$; RR = 1,63; IC 95% RR: 1,48-1,81) y disminuyendo la de taxis ($p < 0,0001$; RR = 0,22; IC 95% RR: 0,16-0,29).

Conclusiones: La impresión existente en muchos centros sanitarios acerca de la sobreprescripción de transporte sanitario no se confirma tras realizar un análisis más detallado. La implantación de un protocolo de prescripción de transporte sanitario racionaliza la prescripción del mismo y elimina la variabilidad en su prescripción.

P-168**GESTIÓN DEL TRANSPORTE SANITARIO EN CONSULTAS EXTERNAS (EXPERIENCIA DE 1 AÑO)**

A.M. Martos Guerrero

Palabras clave: Transporte sanitario, demora, anulaciones, reclamación. **Introducción:** El Instituto Catalán de Oncología es una Empresa Pública del Servicio Catalán de la Salud. El centro de referencia para la asistencia de enfermedades oncológicas de la Región Sanitaria de Costa de Ponent, así como referente de la comunidad catalana para tratamiento de tumores de baja incidencia. El transporte sanitario es una prestación que concierta el Servicio Catalán de la Salud con las compañías de transporte. Dada la numerosa demanda de transportes sanitarios solicitados por nuestros pacientes y tras la exposición de numerosas quejas sobre la prestación de dicho servicio por parte de las compañías de transporte sanitario, la Institución consideró necesario ofrecer, a través de la Unidad de Atención al Cliente, la gestión del transporte sanitario a los pacientes del área de Consultas Externas (CCEE).

Objetivo: a) Facilitar los trámites administrativos a nuestros pacientes. b) Gestión y control del servicio de transporte sanitario a pacientes de CCEE que lo solicitan.

Metodología: Desde la Unidad de Atención al Cliente se ofrece un trato personalizado y todo tipo de ayuda a la hora de solicitar una ambulancia, exponer una reclamación o intentar paliar las largas demoras contactando con los coordinadores de las mismas.

El trabajo a realizar es variado: a) solicitud del servicio a la compañía de transporte de la zona correspondiente; b) registro de datos (compañía de transporte, nombre del paciente, hora llamada del servicio, hora de llegada de la ambulancia, población de destino y observaciones); c) anulaciones de los servicios solicitados; d) recogida y derivación de las reclamaciones realizadas al Servicio Catalán de la Salud,

Resultados: Traslados realizados de las diferentes compañías durante un año (1.346). Ambulancias anuladas (30). Tiempo medio de espera por traslado realizado (1h03'). Reclamaciones efectuadas durante el año (46).

Conclusiones: Los pacientes tienen un referente en la Unidad de Atención al Cliente para la gestión y control del transporte sanitario. El tiempo medio de espera ha disminuido desde el inicio del servicio, así como el número de reclamaciones en promedio mensual. Este servicio da un valor añadido a la atención global que el Instituto Catalán de Oncología ofrece a los pacientes.

P-170**UTILIDAD DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA PRESCRIPCIÓN ANTIBIÓTICA DE LARGA DURACIÓN EN HOSPITALIZACIÓN**

L. Canadell-Vilarrasa, G. García-Pardo, C. Ardanuy-Tisaire, M. Olona-Cabasés, F. Vidal-Marsal y M.J. Gallart-Mora

Unidad de M. Preventiva y Epidemiología. Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.

Objetivo: Valorar la efectividad de un sistema de vigilancia prospectivo, para el control de los tratamientos antibióticos de larga duración.

Metodología: Estudio prospectivo.

Período: febrero-marzo 2002.

Ámbito: Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.

Método: A partir del programa informático de unidosis del Servicio de Farmacia, se estableció un sistema de alarma para identificar antibioterapias de duración superior a 10 días. Un miembro del comité de antibióticos, revisó diariamente las historias de los pacientes seleccionados, clasificando el tratamiento como adecuado/posiblemente adecuado/no adecuado, y dando las recomendaciones pertinentes (suspensión del tratamiento/cambio de antibiótico/continuación del tratamiento establecido) al facultativo responsable del paciente. Se excluyeron los servicios de Cuidados Intensivos de adultos y Pediatría, por no estar disponibles en unidosis. Se detectaron 582 episodios de antibioterapia, de los que cumplían los criterios de inclusión 54 (9,3%).

Resultados: La adecuación de la prescripción fue del 85,2%.

En cuanto a las recomendaciones de cambio de tratamiento, la aceptación fue de 81,5%. Se observó que el 75,9% de las prescripciones eran empíricas, el 65,1% eran monoterapia y la terapia secuencial (paso de vía endovenosa a oral) sólo se había aplicado en el 7,6%.

Conclusiones: El programa ha sido efectivo para modular actitudes en relación a dos puntos básicos para la política de antibióticos del hospital: tipo de prescripción y aplicación de terapia secuencial. Hay que destacar la buena aceptación del programa por parte de los facultativos responsables del paciente.

PROCESO DE CUIDADO DEL PACIENTE ANCIANO CON INSUFICIENCIA CARDIACA: CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DEL PROYECTO ACOVE

A.J. Trujillo-Santos, S. Domingo-González, J. Gonzalo-Blanquer y J.J. García-Alegria
Hospital Costa del Sol, Servicio de Medicina Interna.

Palabras clave: Insuficiencia cardíaca. Procesos de cuidado. Ancianos.

Objetivos: Analizar el cumplimiento de las estándares de calidad respecto a los cuidados de pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca mayores de 65 años.

Metodología: Recogemos todos los informes de alta de todos los pacientes mayores de 65 años ingresados con diagnóstico principal de insuficiencia cardíaca durante el año 2000 en el Hospital Costa del Sol (Marbella, Málaga). Analizamos los puntos más relevantes indicados en el proyecto ACOVE y comparamos el cumplimiento de acuerdo a los dos servicios más frecuentemente responsables del alta, Medicina Interna y Cardiología. En el análisis se emplearon como medida de centralización la proporción y las comparaciones se realizaron mediante χ^2 .

Resultados: Se registraron 248 altas, 100 de M. Interna y 148 de Cardiología de las que 178 eran mayores de 65 años (87 en M. Interna y 91 en Cardiología). La edad media fue de 78 años en M. Interna y 73 en Cardiología. 46% varones en M. Interna y 58% en Cardiología. El porcentaje de cumplimiento y las diferencias entre ellos se refleja en la siguiente tabla:

Criterio	Global (%)	M. Interna (%)	Cardiología (%)	P
Valoración de FEVI	67,2	54	80	< 0,001
Tratamiento con IECA si FEVI ≤ 40%	83,1	76,7	89	0,024
Tratamiento con Digoxina si FEVI < 35%	30,6	41,7	22,4	0,049
Tratamiento con BetaBloqueantes				
si FEVI < 40%	35,7	19,4	47,9	0,006
Monitorización del peso	3,4	5,7	1,1	0,095
Indicación de dieta hiposódica	94,9	94,2	95,6	0,46
Indicación de medicación al alta	98,9	97,7	100	0,24
Indicación de las citas de seguimiento	88,2	94,3	82,4	0,012
Medidas si empeoramiento				
de la sintomatología	3,9	3,4	4,4	0,52
Anticoagulación si fibrilación auricular	84,6	78,9	87,9	0,32
Consejo antitábaco	26,7	28,6	25	0,66

Conclusiones: El cumplimiento de diferentes criterios de calidad del proceso de cuidado de pacientes mayores de 65 años con insuficiencia cardíaca es variable y potencialmente mejorable en algunos de ellos.

ADECUACIÓN DE INGRESOS Y ESTANCIAS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DE UN HOSPITAL COMARCAL

M. Valledor Méndez, M. Sánchez Cembellin, M. Meana Fonseca, C. Ramas Díez, C. Quintana López e I. López Lagunas Hospital San Agustín.

Palabras clave: Adecuación, estancias, ingresos, calidad.

Objetivo: La calidad en la asistencia hospitalaria se relaciona directamente con el uso adecuado del hospital tanto en la indicación del ingreso como de los días de estancia que los enfermos permanecen en el mismo. Lo contrario supone un aumento del gasto sanitario y repercute desfavorablemente en el paciente, pues es sabido, que toda estancia hospitalaria representa un riesgo injustificado para quien permanece en el hospital sin necesitarlo. Nuestro centro es un hospital comarcal con 340 camas y una población de referencia de 160.000 habitantes. Durante muchos días del año existe un número de camas supernumerarias que creemos excesivo por lo que en el presente trabajo nos proponemos como objetivo valorar la adecuación de ingresos y estancias en el servicio de Medicina Interna que se ve frecuentemente afectado, así como las causas más frecuentes de inadecuación para ambos.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y de carácter retrospectivo. Para la obtención de datos se utilizaron las historias clínicas de los pacientes que requirieron hospitalización en Medicina Interna durante el año 2001. Se seleccionó una muestra representativa (significación del 95% y error del 5%) de 71 pacientes con 426 estancias haciendo una valoración independiente de ingresos y estancias. Se utilizó el AEP (Appropriateness Evaluation Protocol) como instrumento de medida con demostrada validez y fiabilidad para la identificación del uso hospitalario adecuado.

Resultados: El porcentaje de inadecuación para los ingresos fue 15,5%. El criterio de ingreso adecuado más frecuente fue la administración de tratamientos de forma parenteral (62%) y la causa de inadecuación más habitual la posibilidad de realizarse estudios y tratamientos de forma ambulatoria (72,2%). Respecto a las estancias observamos una inadecuación global del (19,4%) que se incrementaba significativamente (> 30%) en el último tercio de estancia. El 80,3% de las estancias cumplían únicamente un criterio, siendo el más frecuente la terapia parenteral. Las causas responsables de la inadecuación fueron estar pendiente de resultados de pruebas diagnósticas y/o interconsultas y que los estudios diagnósticos y tratamientos podían realizarse como paciente externo.

Conclusiones: 1) El grado de inadecuación de estancias es similar al publicado por estudios realizados en otros hospitales del mismo nivel, sin embargo el correspondiente a los ingresos inadecuados es significativamente superior. 2) La mejora del tiempo de respuesta de los servicios básicos tanto en realizar las pruebas como en emitir el informe, así como revisar los criterios de ingreso y su aplicación es esperable que mejoren estos resultados.

P-171

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CALIDAD DE UN SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

A. Arizti Bayon, F. Molano, M. Tejedor Fernández, L. Pastor, F. Marin Puerto y J. Álvarez Ponce

Palabra clave: Programa de calidad, Cardiología.

Objetivo: Descripción del proceso de diseño y definición del programa de calidad de un Servicio de Cardiología.

Material: Equipo de trabajo compuesto por un Cardiólogo, un Jefe de servicio. Director de Calidad del hospital y un Médico (colaborador externo) experto en evaluación. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) año 99 y 2000. Sistema de información y disponibilidad de indicadores de las distintas áreas de producción. Análisis A.E.P. (APPROPRIATENES EVALUATION PROTOCOL) del GRD 140 (angina de pecho). Microsoft Office 97.

Método: Análisis de indicadores de la producción del Servicio: áreas de hospitalización, Consultas Externas, Procedimientos y recursos. Elección del modelo de diseño del plan en su modalidad: Orientado al cliente. Sesiones del equipo de trabajo para aceptación del diseño: definiciones y desarrollo de las partes que lo conforman: Sesiones de presentación y discusión con la totalidad de los componentes del Servicio.

Resultados: Realización del Programa de calidad del Servicio de Cardiología con los siguientes apartados: Objetivo, responsables, misión, clientes, oferta de servicios, indicadores, cuadro de mandos, evaluación de resultados y control del programa. Implantación de las actuaciones contenidas en el programa. Mayor nivel de precisión y especificidad -y por tanto de calidad- en la consignación en el CMBDA de los códigos correspondientes a los campos diagnósticos, y otros, de los datos procedentes del informe de Alta, a través del fenómeno de codificación conjunta de clínicos responsables del proceso asistencial y codificadores. De ello, ha resultado la revisión, consideración particular de criterios y validación del proceso de codificación. Identificación de áreas de mejora.

Conclusiones: Es necesaria la implicación activa de cada estamento y miembro del Servicio para obtener resultados satisfactorios. Es necesaria una estructura organizacional suficiente que posibilite y garantice su cumplimiento. La implicación activa de los clínicos en la codificación redundada en una mejora en la estructura y consignación de datos en el informe de alta.

P-173

VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL CÓLICO NEFRÍTICO EN URGENCIAS

J. Casado Cerrada, P. Sánchez Molini, C. Sanz Sebastián, T. Isasia Muñoz y J. Hurtado Santos Hospital Universitario de la Princesa.

Palabras clave: Cólito nefrítico, Dolor, Ecografía.

Objetivo: Analizar la atención ofrecida durante un año a los pacientes diagnosticados de cólico nefrítico, valorando aspectos clínicos, analítico-diagnósticos, terapéuticos y de derivación para seguimiento al alta.

Método: De los 1.113 pacientes diagnosticados de cólico nefrítico se seleccionaron de forma aleatoria una muestra significativa de 130, en los que se cumplió un protocolo en los que se incluyan datos demográficos, clínicos y de derivación.

Resultados: El cólico nefrítico fue causa de atención en 1,19% de las urgencias. El 56,8% fueron mujeres. El 84% acudió a petición propia. El 50% llegó en la primera hora tras el comienzo del dolor. El 46,8% tenían antecedentes de litiasis. En 93,5% se analizó orina, presentando 65% hematuria. En 74,3% se realizó radiografía simple de abdomen. En 35,8% de los casos se encontraron imágenes compatibles con litiasis (19,75% en riñón y 16,04% en uréter). Solo en tres casos se indicó ecografía. Los AINES fueron los fármacos más utilizados en el tratamiento, 41,7% requirieron una única dosis y 42,85% dos dosis, siendo la asociación más frecuente AINES y analgésico. El tiempo medio de estancia en urgencias fue de 3,46 horas. Solo el 2% de los casos fue atendido por urología. El 67% de los pacientes se derivó al alta a Atención Primaria y el 31,18% a urología. Solo 1,83% se envió a consulta de litiasis. El 66% de los pacientes con litiasis visible en Rx no se envió a atención especializada.

Conclusiones: 1) Los pacientes con cólico nefrítico en nuestro centro son mayores y con mayor proporción de mujeres que en los estudios publicados. 2) La hematuria en el sedimento es el dato analítico más constante. 3) El tratamiento administrado en nuestros pacientes es similar al de otros protocolos de actuación. 4) El tiempo de estancia en urgencias muestra ser adecuado dada la naturaleza e intensidad del dolor. 5) La derivación de los pacientes debe ser modificada remitiendo directamente a la atención especializada a todo paciente con litiasis visible en Rx, especialmente si se sospecha cálculo en uréter. 6) Detectamos una utilización escasa e inadecuada de la ecografía.

P-174

Palabras clave: Urgencias, Vías venosas, Causas inadecuación.

Objetivo: Conocer el porcentaje de vías venosas puestas en el Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) de forma innecesaria. Este objetivo es un indicador que formaba parte del Plan de Calidad del Contrato de Gestión del año 2001 de nuestro centro.

Método: Se realiza un estudio retrospectivo mediante muestreo aleatorio simple revisando la historia clínica de los pacientes que acudieron al SUH del Complejo Hospitalario de Ciudad Real (Hospital del Grupo II) durante el mes de junio de 2001 valorando la colocación de accesos venosos que quedan registrados en la hoja de enfermería. Se revisan los pacientes a los que se le ha canalizado una vía venosa en dicho servicio y si ha sido utilizada adecuadamente teniendo en cuenta dos puntos: ingreso del paciente (en planta o traslado a otro centro) y/o administración de fármacos por vía intravenosa.

Resultados: Durante el período de estudio acudieron al SUH 6.022 pacientes. Se revisan 110 historias de pacientes pertenecientes a ese grupo, a 35 de los cuales se les canalizó una vía venosa (31,8%). De estos, 15 recibieron tratamiento intravenoso (42,9%), 6 ingresaron en planta (17,1%) y 8 recibieron tratamiento y posteriormente ingresaron (22,9%). En 6 pacientes (17,1%) no se encontraron causas de adecuación de la vía intravenosa.

Conclusiones: Una parte importante de las canalizaciones venosas realizadas en la atención de urgencias de nuestro Complejo se realiza de forma innecesaria. Un paso para corregir esto sería el desarrollo de guías o procedimientos de uso de las vías venosas.

PLAN DE MEJORA DE CALIDAD PERCIBIDA DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE LA RIBERA

G. Cañellas Martínez, T. Quirós Morató, D. Cuesta Peredo,
B. Ruiz Zaragozá y M. Huguet Ordaz
Hospital de la Ribera.

Palabra clave: calidad percibida, proceso de urgencias, expectativas de pacientes, medición de satisfacción

Objetivo: Desarrollar una metodología, en forma de plan de mejora de la calidad percibida, que propicie un cambio de cultura organizativa, identificando el paso de un paciente por un Servicio de Urgencias como un proceso único e incorporando las expectativas de los usuarios a la calidad de oferta que ofrece dicho servicio.

Metodología: Medición de la calidad percibida, en base a análisis cualitativos y cuantitativos sobre grupos focales y encuestas de satisfacción, respectivamente. Definición de indicadores de actividad. Gestión de las demoras, en base a la monitorización de las mismas y a la búsqueda activa del paciente. Distribución de información escrita relacionada con el servicio. Normalización de la señalética del Servicio de Urgencias. Puesta en contacto con los posibles usuarios descontentos una vez abandonado el Servicio de Urgencias. Reducción del tráfico descontrolado de pacientes por las dependencias del Servicio. Autoevaluación del proceso por parte de grupos de mejora. Propuesta de mejoras a la Dirección por parte del Grupo de Mejora, Dirección del Servicio y Dirección de Calidad.

Resultados: Hay que analizar los resultados desde tres ópticas distintas: 1. La del cambio cultural del personal asistencial: La interacción coordinada del personal asistencial y administrativo ha permitido entender la asistencia al paciente de Urgencias como un proceso compartido, tanto a nivel de responsabilidades como de satisfacción de expectativas. 2. La de los indicadores de gestión: Los tiempos de respuesta han mejorado, disminuyendo significativamente las mediciones de los indicadores, como por ejemplo, los porcentajes de pacientes atendidos por unidad de tiempo tras valoración médica. 3. La de la calidad percibida: Proporcionar una herramienta de información al paciente a los responsables del Servicio.

Conclusiones: Las herramientas de la Calidad Total aplicadas a un servicio asistencial mejoran, de forma invariable, la calidad percibida de sus usuarios. Los grupos de mejora no solo actúan sobre los procedimientos sino que integran a personal de distintos estamentos en un mismo proceso, tomando todos conciencia de la magnitud y posibilidades de actuación para la resolución de los problemas. La definición, establecimiento y monitorización de indicadores de gestión es fundamental para el éxito en la mejora de procesos asistenciales.

CREACIÓN DE UNA CONSULTA EXTERNA DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE URGENCIAS

J. Borràs Suárez y A. Galobart Roca

Palabras clave: Urgencias, Consultas Externas, Mejora Continuada.

Introducción y objetivos: El Servicio de Urgencias (SU) de nuestro Centro consta de dos Secciones: Medicina Interna (MI) y Cirugía/Trauma (COT), y realiza unas 55.000 visitas anuales. No dispone de Pediatría ni Obstetricia. Una parte no despreciable de las visitas se corresponden a controles que son citados a los pocos días de la primera visita. Para optimizar esta circunstancia se ha creado una consulta externa ligada a Urgencias con los objetivos de: Mejorar el drenaje de pacientes desde el SU; Aumentar la tranquilidad del profesional y la del enfermo y familiares; Optimizar circuitos previos poco ágiles y Disminuir las visitas de control. Se procede a su evaluación tras el primer año.

Metodología: El personal asignado es de 14 médicos de la plantilla y 2 auxiliares de clínica. Se dispone de 3 consultorios durante dos horas. Los criterios de inclusión son: visitas que finalizan un proceso; visitas que sirven para optimizar tratamientos y primer control de pacientes que requerirán una segunda visita por un especialista. Los pacientes cuando son dados de alta del SU ya tienen tramitada la visita. Se diseñan circuitos para disponer de la HHCC en la visita. El destino posterior puede ser: Alta definitiva; Control por su médico de cabecera; Control por especialista de nuestro Centro o Ser remitido de nuevo al SU.

Resultados: Se han realizado 4.211 consultas. El 44,8% de los pacientes fueron varones. La media de edad de 39 años. El tiempo medio de espera fue de 5,82 días. El índice de incomparcencia ha sido del 14,2% en MI y del 18,6% en Cirugía/Trauma. El 53,4% de los pacientes fueron visitados por el mismo médico que los citó. La patología más prevalente en MI fue la de nefrología (39,4%), patología respiratoria 20,3% y abdominal 16,8%. En el área de Cirugía/Trauma fueron: heridas 27%, esguinces 25,4%, patología osteomuscular 15% y concusiones 11,3%. Se han creado dos circuitos específicos: 1.- Circuito de neumonía. 2.- Circuito de pieleonefritis.

Conclusiones: 1) La creación de las CC.EE del SU ha significado una mejora de la atención al usuario, tanto desde el punto de vista asistencial como de satisfacción. 2) La finalización de los procesos hincados en el SU significa una mejora de tipo profesional. 3) Optimización de algunos circuitos poco utilizados.

UTILIZACIÓN DE VÍAS VENOSAS EN URGENCIAS

M. Gómez Santillana, C. Morata Huerta y P. Lillo Tejeda
Hospital Virgen de la Luz.

Palabra clave: Vías venosas, urgencias.

Introducción: La canalización de un acceso venoso, es una actividad de enfermería cuya correcta utilización va a suponer: a) Mejorar la calidad asistencial percibida por el paciente. b) Disminuir el tiempo de enfermería en el caso de que se administre IV o repetición de analítica. c) La administración de medicación es más rápida si ya está canalizado un acceso venoso.

Objetivo: Evaluar si en nuestro hospital la canalización de las vías venosas es adecuada según los criterios: a) Administración de tratamiento IV. b) Más de dos extracciones sanguíneas al mismo enfermo. c) Ingreso del enfermo.

Metodología: El estudio se realiza en la Unidad de urgencias (S.U.H) del Hospital Virgen de la Luz, Hospital de referencia de la Provincia. Se trata de un estudio retrospectivo, cuya fuente de información son los registros de enfermería de Urgencias. Período de estudio elegido: mes de octubre. A través de un muestreo simple aleatorio se escogió una muestra de pacientes para una prevalencia del 50% y un error de un 10%. Se recogen los siguientes parámetros: a) Criterios de adecuación: Han de presentarse al menos uno de ellos, para considerar que el acceso venoso es adecuado. b) Paciente ingresado en hospitalización tras recibir la atención en el S.U.H. c) Extracción de sangre venosa en diferentes secuencias de tiempo. d) Administración de tratamiento IV en el servicio de urgencias.

Resultados: Población total: 1.634. Tamaño muestral: 90 pacientes. Nº de pacientes con acceso venoso: 74 (82%). Nº de pacientes con tratamiento intravenoso en la Unidad: 43 (47%). Nº de pacientes que ingresan: 39 (43%). Nº de pacientes a los que se les ha realizado más de una extracción: 4 (4,4%). Pacientes que cumplen criterio de adecuación: 54/74=72,9%.

Conclusiones: Ante estos resultados nos planteamos como acciones de mejora: a) Canalizar acceso venoso a los enfermos que por la sintomatología que presentan van a ser ingresados. b) Canalizar acceso venoso en usuarios que presentan dolor agudo. c) No canalizar acceso venoso en aquellos usuarios que presenten sintomatología difusa.

PROFILAXIS DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA TRAUMÁTICA EN URGENCIAS

M.A. González Soler, M.J. Millán, A. Sánchez Espinosa, F. Peñalver Guillén, J. Gómez Yelo y E. López García

P-179

Palabras clave: Urgencias. Profilaxis. Trombosis Venosa Profunda. **Objetivos:** 1) Conocer la situación actual del uso profiláctico de la heparina de bajo peso molecular (HBPM) en pacientes que acuden con patología traumática a nuestro servicio de urgencias. 2) Analizar los factores que influyen en su utilización. 3) Mejorar su utilización.

Material y método: Se escogió una muestra de 193 casos utilizando un método de muestreo aleatorio sistemático en Enero-Febrero del 2002. Los casos se seleccionaron del archivo de atenciones del servicio de urgencias. Se recogieron datos sobre la pauta o no de profilaxis con HBPM, existencia de fractura, tipo de inmovilización pautada, localización de la lesión, existencia de factores de riesgo para enfermedad tromboembólica y datos sobre quien prescribía el tratamiento. Como test estadístico se utilizó el de Chi cuadrado. Posteriormente se analizaron las indicaciones de profilaxis y se instauraron actividades de mejora de su cumplimiento.

Resultados: De los 193 casos de la muestra, sólo en 8 casos, el 4,14% (intervalo de confianza \pm 2,8%) se pautó profilaxis. De estos casos, 5 eran fracturas (62,5%) y en todos los casos la lesión se encontraba en miembro inferior. Del total de casos se hallaron 43 fracturas, 22,3% (i.c.= \pm 5,9%) de las cuales el 51% correspondían a miembro superior y el 34,9% a miembro inferior. En los casos de fracturas se pautó profilaxis en 5 de ellos (11,6% \pm 9,5%), todos en miembro inferior.

Se encontraron diferencias significativas entre el uso de profilaxis con HBPM y localización de la fractura ($p = 0,01$), existencia o no de fractura ($p = 0,05$), no encontrando diferencias entre que el médico fuese adjunto o residente.

Conclusiones: Se ha encontrado un escaso uso de la HBPM en los pacientes asistidos con patología traumática.

Se ha hallado una mayor utilización en pacientes con patología de miembros inferiores.

APERTURA DE UNA ÁREA BÁSICA DE SALUD: EFECTO EN EL HOSPITAL DE REFERENCIA

J. Valero Sales, A. Ibíricu Barro, L. Ríos Vallés, M.A. Rius Rafecas, R.M. Tomás Cedo y Ll. Colomés Figuera

P-180

Palabras clave: Asistencia, Hospital, Atención Primaria.

Introducción: La puesta en marcha de una Área Básica de Salud (ABS) implica un incremento de recursos sanitarios y del horario de atención, lo que motiva una mayor accesibilidad para la población adscrita a la misma y consecuentemente, debería implicar una disminución del volumen asistencial en el Hospital de referencia, mejorando el Nivel de Resolución de problemas en el primer nivel asistencial.

Objetivo: Describir el efecto de la puesta en marcha de una ABS en la hospitalización y asistencia a urgencias de la población adscrita al ABS. Evaluación por grupos diagnósticos.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todas las hospitalizaciones, visitas en Consultas Externas y asistencias a urgencias de la población de referencia del ABS en el hospital de referencia. Período comprendido entre 1997 y 2001 (antes y después de la apertura del ABS). Se ha utilizado el CMBD de hospitalización con GRD asignado (versión HCFA 16.0) y datos de actividad (visitas) de urgencias y consultas externas. Para el análisis y cálculo de resultados se han utilizado MSAcces y MSExcel y el paquete Clinos.

Resultados: El numero total de urgencias de población del ABS atendidas en el hospital durante el año 2000 fue de 1917, y en el año 2001 de 1.186, con una disminución del 38,14%. Las visitas en consultas externas fueron 726 en el año 2000 y 658 en el 2001 (disminución del 9,37%). En referencia a los ingresos, se ha producido una disminución del 19,2%, siendo los diagnósticos que más han disminuido porcentualmente respecto al año anterior los siguientes: 57,1% patología endocrina, 52,9% patología del sistema nervioso, 48,9% patología del aparato respiratorio, 38,9% de sistema músculo-esquelético, y 25% aparato digestivo.

Conclusiones: La mejora de la accesibilidad de los servicios en el primer nivel asistencial, implica, según los resultados de nuestro estudio, una disminución global de la asistencia hospitalaria, siendo mayor el impacto en la atención urgente. Posiblemente, la disminución en números absolutos de los ingresos por patología crónica, se debe, en parte, a un mayor control de los mismos en el primer nivel.

AYUDANDO A MEJORAR LA CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN FARMACOTERAPÉUTICA EN UN ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA

M. Alcaraz Borrajo, M. Zuzuáregui Gironés, E. Cruz Martos, S. Herrero Hernández y A. Paya Pardo
Gerencia Atención Primaria Área 6 Madrid.

Palabra clave: Prescripción farmacoterapéutica.

Resumen: Con el objetivo de mejorar la calidad de prescripción entre los facultativos del Área 6, presentamos un resumen de indicadores de calidad (IQP) que contiene todos los valores alcanzados por los equipos comparados con el promedio de Área, codificados por colores y agrupados por percentiles. Para reconocer el esfuerzo realizado por los profesionales, hemos elaborado una tabla con los valores y posición de IQP alcanzados por el Área entre las 57 de INSALUD y 11 de Madrid, y una tabla similar para cada EAP entre los 22 del Área.

Objetivos: 1) Facilitar la identificación rápida de aspectos mejorables de la prescripción. 2) Motivar a los profesionales mediante el reconocimiento de los logros conseguidos en la mejora de la calidad de la prescripción.

Metodología: 1) Selección de los IQP con mayor capacidad de influencia en la mejora de calidad por un grupo de trabajo (médicos y farmacéuticas de A.P.) a principios de 2000. 2) Información a todos los facultativos sobre los nuevos indicadores. 3) Pacto de objetivos anuales de cada indicador para cada equipo. 4) Procesamiento de los datos.- 5) Monitorización mensual del valor alcanzado por cada equipo. 6) Elaboración de los resúmenes de indicadores. 7) Presentación de los resultados en Consejo de Gestión y sesión de equipo.

Resultados: Se han elaborado y difundido a los Coordinadores del Área los siguientes resúmenes de IQP: Tabla resumen con los indicadores de los equipos, codificados por colores y separados por percentiles, del 2000, primer semestre de 2001 y cierre de 2001. Tabla resumen de los valores alcanzados por el Área 6 entre las Gerencias de INSALUD y Madrid, del 2000 y 2001. Tabla resumen en papel y transparencia del resultado del EAP comparada con los valores de referencia de los 22 EAP del Área del 2000 y 2001. (Tabla 3: ejemplo de centro). De las 40 sesiones del Servicio de Farmacia del 2001, los temas de 11 se han priorizado utilizando estos resúmenes. Los coordinadores o responsables de Farmacia del equipo han presentado los datos en reunión de equipo.

Conclusiones: Esta sistemática de trabajo es útil para identificar de forma sencilla los grupos terapéuticos sobre los que actuar para mejorar la calidad de prescripción. Las tablas permiten hacer un seguimiento del esfuerzo realizado para mejorar la calidad de prescripción y visualizar el resultado del trabajo efectuado.

P-181

COMISIÓN DE CALIDAD: EVALUACIÓN Y MEJORA

S. Boix Xiol, G. Ricós Furio, R. Yria Figueiras, M. Robles Jiménez, E. Hernández Muñoz, J. Luque González
ABS Apenins-Montigala.

P-182

Palabras clave: Evaluación, mejora, organización

Introducción: En el año 1994 se creó en el CAP Morera-Pomar la comisión de calidad (CC), comenzando su trayectoria sin unos objetivos claros y sin una formación específica en temas de calidad. En 1998 se hicieron cursos de formación en calidad y se comenzó a sistematizar su manera de trabajar, pero la operatividad de la comisión era deficiente. Entonces nos planteamos constituir un grupo de mejora para analizar las causas de este mal funcionamiento, buscar soluciones y aplicarlas.

Objetivo: Como objetivos nos planteamos:

Mejorar el funcionamiento de la CC.

Que la CC fuese considerada por todo el equipo como una herramienta de mejora y un referente en temas de calidad.

Método: Detectar las causas del mal funcionamiento de la CC, mediante tormenta de ideas y encuestas a los profesionales del equipo. Realización de actividades encaminadas a mejorar el funcionamiento de la CC.

Acciones de mejora.

Resultados: Al evaluar la CC en su nueva etapa (1999-2000), después de aplicar las acciones de mejora correspondientes, obtuvimos los siguientes resultados:

Problemas detectados: 74

- Problemas solucionados: 54

Grupos de mejora:

Grupo de mejora de recetas

Grupo de mejora de la comisión de docencia

Grupo de mejora de la confidencialidad

Grupo de mejora del circuito de crónicos

Número de reuniones de la CC: 26

- Número de reuniones con el equipo: 4

- Participación en la comisión evaluadora de los objetivos

Conclusiones: a) A pesar de que los inicios de la CC no fueron del todo satisfactorios, se ha conseguido que la comisión funcione como tal y esté valorada por todo el equipo. b) Se han alcanzado los objetivos iniciales de la comisión de calidad. c) El nivel de resolución de problemas es del 73%. d) Se han creado cuatro grupos de mejora. e) Se pretende reevaluar la CC para detectar nuevas oportunidades de mejora y optimizar su funcionamiento.

ESTUDIO DE CALIDAD EN UN PROGRAMA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

L.A. Hijos Larraz, D. García Bello, D. Ara Launa, A. Castellanos de Mur, F. Aranguren Martínez de Moretin, L. Rubio Buisan C.S. Grañen.

P-183

Palabra clave: Hipertensión arterial, calidad, atención primaria.

Objetivos: a) Fomentar la creación y mantenimiento de un Grupo de Trabajo en Calidad. b) Reiniciar la realización de evaluaciones internas de los distintos programas. c) Análisis y Priorización de las causas del problema seleccionado: Hipertensión arterial (HTA).

Metodología: En el año 2000, se creó un grupo de trabajo en calidad, identificándose y priorizándose el problema: Inadecuado control de la HTA. Se propuso la realización de un estudio retrospectivo mediante un audit, para lo cual se determinaron 19 criterios relativos a la calidad científico-técnica siendo los tipos de datos obtenidos de estructura, proceso y resultado intermedios. Sobre los pacientes incluidos en programa de hipertensión arterial se realizó un muestreo sistemático de 64 historias ($\alpha = 0,95$; $e = 0,12$). Las fuentes de datos utilizadas fueron la historia clínica, registro de formación continuada y la encuesta sobre adhesión al tratamiento. Para el análisis de los datos y obtención de las oportunidades de mejora se usaron gráficos de Pareto, de estrella, histogramas de cumplimiento.

Resultados: La cobertura del programa fue de 943 pacientes (98,74%) La edad media fue de 70,2 años ($\pm 10,9$); el 56,25% fueron del sexo masculino y el 43,75% del sexo femenino. En primer lugar se procedió a valorar los criterios agrupados, observando que la mayor parte de los incumplimientos se deben a los problemas estructurales (11,99% de cumplimientos). En segundo lugar, obtenemos que las oportunidades de mejora radican en las causas de proceso. Al analizar los criterios y subcriterios se priorizaron los problemas detectados siendo por este orden: Problemas estructurales (criterios relativos a revisión de esfigmomanómetros, mangúitos de obesos, esfigmomanómetros electrónicos), de proceso (realización de analítica, microalbuminuria, fondo de ojo y reconocimiento específico) y de resultados (control HTA y disminución factores de riesgo cardiovascular).

Conclusiones: En primer lugar, en el análisis del problema se observaron causas por déficit estructurales, y a continuación causas organizativas (internas y externas) y causas dependientes del profesional y del cliente externo. Esta priorización se utilizó para la aplicación de distintas medidas correctoras: Mejoras estructurales, organizativas (actualización del programa), educativas (mecanismos de feed-back, elaboración de trípticos). Implícitamente, se ha consolidado el grupo de trabajo en calidad mediante la realización de otros proyectos.

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA: EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES

M.A. García Lirola, E. Lirola García, T. Moreno Díaz, M.J. Gimeno Jordá y G. Fernández Moya

Distrito A. Primaria Poniente Roquetas.

P-184

Palabra clave: Indicadores calidad de la prescripción.

Objetivo: Mejorar la calidad asistencial y el uso racional del medicamento estableciendo un sistema de indicadores de calidad de la prescripción y haciendo una evaluación y seguimiento de estos indicadores.

Material y métodos: El estudio se realiza en el Distrito Poniente-Roquetas con 95 médicos generales que atienden a una población de 175.000 habitantes. El período de estudio es enero 2000-marzo 2002.

- Se establecen indicadores de calidad en los grupos terapéuticos utilizados en las patologías más frecuentes en Atención Primaria. Estos indicadores reflejan los criterios de selección de medicamentos en base a las Guías de Práctica Clínicas y evidencias científicas disponibles.

- Se informa a todos los médicos del Distrito de estos indicadores y de sus estándares mediante entrevista personal y se hace un seguimiento individual con periodicidad trimestral de la evolución de estos indicadores.

Resultados: La evolución de los indicadores de calidad en el período estudiado es la siguiente:

	2000	2001	1º trim. 2002
Estatinas de elección	57%	62%	67%
IECAs de elección	43%	43%	42%
ARAs II	31%	35%	38%
AINEs de elección	54%	59%	64%
Piroxicam	9%	6%	4%
Antibióticos restringidos	10%	12%	12%

Conclusiones: El uso de un sistema de indicadores con sus estándares de calidad y una retroinformación a los médicos del Distrito ha permitido la mejora de la calidad de la prescripción.

URGENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA: UNA EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN Y MEJORA

J.J. López-Picazo Ferrer, M. Villaescusa Pedemonte, F. Agulló Roca, G. Sanz Mateo, J.M. Bernal Romero y C. López Asensio GAP Murcia.

P-185

Palabras clave: Calidad, Urgencias, Atención Primaria.

Objetivo: Los médicos de familia que trabajan en servicios de urgencia pueden mejorar la calidad de su atención si se involucran en iniciativas de evaluación y mejora. Este trabajo pretende entonces mejorar la atención urgente en Atención Primaria a través implicación de estos profesionales en ciclos de mejora.

Metodología: Estudio de evaluación y mejora de la calidad: (1) Construimos los criterios a emplear; (2) Evaluamos su cumplimiento en enero 2001, con datos representativos por servicio; (3) Diseñamos e implementamos intervenciones para mejorar; y (4) Reevaluamos en enero 2002.

Emplazamiento: 15 servicios de urgencias (SU) de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia, donde trabajan 74 médicos para atender a 659.190 habitantes.

Criterios: Construimos 8 criterios: Cumplimiento de Hoja de Asistencia (HA), Datos de filiación (DF), Motivo de consulta (MC), Antecedentes personales (AP), Exploración física (EF), Juicio diagnóstico (JD), Indicación de tratamiento (IT) e Identificación del médico (IM). Consensuamos su contenido, explicitando las aclaraciones y excepciones necesarias.

Evaluación Reevaluación: Mediante muestra aleatoria de las asistencias estratégica por servicio estimamos el cumplimiento de los criterios, la mejora absoluta y relativa y su significación estadística (una cola). Mediante LQAS evaluamos los SU construyendo un lote por cada criterio y SU, que aceptamos si cumple un estándar del 90%, umbral del 65% (potencia, 80%).

Intervención: Ofrecemos la participación activa a los profesionales, incentivando económicamente las mejoras.

Resultados: Se implicaron 67 médicos (90,6%). Evaluamos 219 asistencias en la 1ª evaluación y 491 en la reevaluación, apreciándose mejora en 7 criterios. El cumplimiento fue (evaluación/reevaluación, significación): HA, 95,4 ± 0,8%/100,0 ± 0,0%, $p < 0,001$; DF, 73,5 ± 5,9%/91,9 ± 2,4%, $p < 0,001$; MC, 79,9 ± 5,3%/83,5 ± 3,3%, ns; AP, 58,7 ± 6,6%/66,2 ± 4,3%, $p < 0,05$; EF, 56,3 ± 6,8%/77,1 ± 4,0%, $p < 0,001$; JD, 85,2 ± 4,7%/91,1 ± 2,6%, $p < 0,05$; IT, 92,0 ± 3,8%/96,9 ± 1,6%, $p < 0,01$; IM, 63,0 ± 6,4%/71,5 ± 4,0%, $p < 0,05$. Por SU, rechazamos 39 lotes (32,5%) en la evaluación y 27 en la reevaluación (22,5%; mejora absoluta 10%, relativa 14,8%). Rechazos por SU (evaluación/reevaluación): máximo, 5/4; mínimo 0/0; mediana, 3/1; moda, 3/0-1; cero-defectos, 3/4 SU.

Conclusiones: La implicación en la mejora continua de la calidad puede ser introducido en urgencias de atención primaria a través de la puesta en marcha de ciclos de mejora incentivados, que usen criterios de alto valor facial, fáciles de medir y centrados en el aspecto científico-técnico.

EVALUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA POBLACIÓN DIABÉTICA: ¿NECESIDADES DE UNIDADES DE DIABÉTICOS?

F.J. Arrieta, R. Cabral, J. Garrido, A. González, M. Lobo y H. Ortiz

P-186

Palabra clave: Diabetes Mellitus, Cobertura, Atención Primaria.

Introducción: Recientemente la ADA en 1997, modificó los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus, con el fin de facilitar el diagnóstico precoz de la enfermedad y evitar y/o retrasar el desarrollo de las complicaciones crónicas de la enfermedad.

Objetivo: Valorar la captación de los diabéticos a lo largo de los últimos 5 años en los equipos de Atención Primaria.

Material y métodos: Estudiamos en el Área 4 de Madrid la población que es atendida por los equipos de Atención primaria y el número de diabéticos diagnosticados. Para ello utilizamos la tarjeta Sanitaria (TSI) de cada EAP para saber la población y la cartera de Servicios para conocer el número de diabéticos. Para el cálculo de la cobertura estimamos en la Comunidad de Madrid el 6% de población diabética entre 45-65 años.

Resultados: La población atendida por los equipos desde el año 1995 hasta el 2000 ha ido aumentando: 168.030-170.998-206.321-300.528-356.754 habitantes. El número de diabéticos captados ha sido de 3.767-4.926-5.874-6.737-10.270-11.816. La cobertura de los EAP fue de 0.37-0.48-0.47-0.43-0.57-0.55.

Conclusión: La captación de la población diabética es progresiva, a medida que aumenta la población atendida, por los equipos de Atención Primaria. Dada la importante población diabética probablemente sea necesaria la creación de unidades de apoyo formadas por especializada-primaria con el fin de mejorar la calidad global del diabético.

PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD TELEFÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA

C. Castro García, S. Rodríguez Carrera, C. Martínez Álvarez, A. Franco Vidal y M.T. Manteca Gómez

P-187**Palabra clave:** Accesibilidad.**Objetivo:** Mejorar la accesibilidad telefónica de los usuarios en tres centros de salud del Área sanitaria VIII de Asturias.

Metodología: A partir de las reclamaciones de los usuarios se planteó la evaluación de la accesibilidad telefónica que se llevó a cabo realizando llamadas a los teléfonos de cita previa en horario de mañana (entre las 8 y las 15 horas), durante una semana. Se recogió el número de llamadas necesarias para conseguir una respuesta. Inicialmente se llevó a cabo en dos centros, incorporándose otro posteriormente. El estándar fijado era de un máximo de dos llamadas realizadas para conseguir conexión telefónica. Las medidas de mejora adoptadas partieron de las propuestas realizadas en los Equipos de Atención Primaria y fueron específicas para cada uno de ellos (formación y reorganización de la actividad del personal administrativo, información a la población sobre la cita previa en horario de tarde, refuerzos de personal e informatización de la cita previa desde consultas de médicos y enfermeras). A partir de dos reevaluaciones con buenos resultados se dio por finalizado el plan en dos centros, prolongándose en el otro.

Resultados: La evaluación inicial situaba el número de llamadas a realizar para obtener respuesta por encima del estándar (2,7, 2,5 y 2,9). Los tramos de mayor dificultad para la accesibilidad eran entre las 8 y las 11 horas, llegando a ser necesario realizar hasta 16 llamadas para conseguir respuesta. La reevaluación en la que se finalizó el plan en dos centros arrojaba los siguientes resultados: 1,37 (sin ningún tramo horario por encima del estándar), 1,7. Tras el reforzamiento de las medidas de mejora en el centro que quedaba dentro del plan, la evaluación final supuso la necesidad de realizar 1,3 llamadas para conseguir respuesta sin ningún tramo horario por encima del estándar. La satisfacción de los usuarios (según encuesta del INSA-LUD) con el sistema de cita previa mejoró en el período de implantación del Plan de un 88% de pacientes satisfechos a un 93,4%.

Conclusiones: Se ha conseguido mejorar la accesibilidad telefónica para la solicitud de cita previa en los tres centros implicados mejorando la percepción que de dicho servicio tienen los usuarios.

MONITORIZACIÓN DE INDICADORES DEL BOX DE CRÍTICOS COMO OBJETIVO DE MEJORA DE LA CALIDAD EN UNA ÁREA BÁSICA

M.J. Bueno Domínguez, O. Doblado López, L. Ríos Vallés, J. Puig Soler y M. Mallafré Moya

P-188**Palabra clave:** Box de críticos, Monitorización, Atención Primaria.

Objetivos: Mejorar la calidad y la seguridad del proceso de atención al paciente crítico, en un medio no hospitalario. Garantizar el control, la reposición y el mantenimiento del box de críticos de una Área Básica. Hacer factible la medición de unos indicadores de calidad.

Material y métodos: Mediante la técnica de brainstorming se detecta déficit en el sistema de revisión del carro de paros y el núcleo de calidad decide abordarlo dada su puntuación en la parrilla de priorización.

Tras el uso del diagrama causa-efecto y del análisis de las acciones de mejora, se pone en marcha entre otras acciones el diseño de un protocolo de revisión y reposición del box de críticos, recogiéndose la información en unas hojas de registro en un principio en soporte de papel y que tras varias revisiones se informatiza y se crea una base de datos en Microsoft ACCESS® con el objetivo de facilitar la medición y monitorización de indicadores. Se realiza un estudio retrospectivo Junio 1999-Junio 2002, de los registros del carro de paros y del box de críticos. N = 295. Explotación de datos mediante Microsoft ACCESS 97® y tratamiento estadístico SPSS.

Resultados: Se estudian un total de 295 registros, elaborando y posteriormente monitorizando, unos indicadores de calidad de forma mensual:

- Número y tipo de revisiones.
- Errores en el correcto precintado.
- Déficit en la reposición.
- Medicación y/o material caducado.
- Falta de material de stock.

Conclusiones: La protocolización de la revisión del box de críticos y carro de paros, surge de la necesidad por parte de los profesionales de Atención Primaria y de Atención Continuada del Área Básica de ser capaces de dar una respuesta correcta con todos los medios a nuestro alcance al elevado número de situaciones críticas urgentes que acuden a nuestro centro. Tanto las revisiones tras su uso como las que se realizan de forma mensual, garantizan la implementación del protocolo, favorecen la manejabilidad y destreza en su uso, mejoran el tiempo de respuesta y fomentan la reposición completa y correcta. Las revisiones periódicas han llevado a la necesidad y por ello al diseño de una hoja de revisión informatizada pero siempre personalizada, facilitando la monitorización de los indicadores.

LA CENTRALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS ABORDADO DESDE UNA PERSPECTIVA DE CALIDAD

Y. Díaz López, P. Vallejo Sánchez- Monge y S. Ruiz Martín

P-189**Palabra clave:** Archivo historias clínicas.

Resumen: Dos EAP del Área han identificado la falta de unificación en el sistema de archivo de historias clínicas, por lo que se ha puesto en marcha un proyecto de centralización de archivo, utilizando metodología de calidad.

Objetivos: 1) Unificar el sistema de archivo de las historias clínicas en el centro. 2) Generar una única base de datos con las historias clínicas "activas" en cada centro (historia clínica activa se considera a toda historia que se corresponde con un usuario que ha sido visto en el centro en los últimos cinco años).

Metodología: En los dos centros se realizó: 1) Constitución del grupo de mejora. 2) Identificación de las fases del proceso, establecimiento del cronograma y elección del responsable para cada fase. 3) Diseño de los diagramas de flujo de cada fase del proyecto para identificar los cuellos de botella y puntos críticos del proceso. 4) Identificación y establecimiento de medidas para prevenir los cuellos de botella y puntos críticos. 5) Presentación del proceso al EAP para conocimiento de todos los profesionales participantes del centro. 6) Ensayo piloto del proceso para detectar áreas de mejora no identificadas previamente. 7) Puesta en marcha del proceso de unificación del sistema de archivo de historias clínicas. 8) Evaluación del desarrollo del proceso y reevaluación de la mejora conseguida tras la centralización del archivo.

Resultados: El proceso en ambos centros se ha desarrollado sin incidencias, y se han cumplido los plazos fijados en el cronograma. En la evaluación de los indicadores definidos en el proyecto, se ha conseguido que el porcentaje de historias clínicas con correlación entre la base de datos y el archivo se ha incrementado del 84% al 99% en historias clínicas de mayores de 14 años y del 89% al 100% en las de menores de 14 años.

Conclusiones: La metodología de calidad aplicada al desarrollo del proyecto de unificación del sistema de archivo de la historia clínica se ha mostrado como una herramienta útil por los resultados y de sencilla aplicación.

RESULTADOS DE UN CICLO COMPLETO DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE HIPERTENSO

R. Luquin Martínez, M.C. Santiago García, J. Manzano Cano, I. López Ibañez, M.C. Esquinas Vega y R. Martín Tamayo

P-190**Palabras clave:** Mejora de la calidad; Ciclo Evaluativo; Cartera de Servicios; Hipertensión Arterial.

Objetivos: Mejorar la Calidad de la Asistencia que recibe el paciente con Hipertensión Arterial (HTA) en una Zona Básica de Salud urbana, analizando el grado de cumplimiento de la Cartera de Servicios.

Metodología: Ciclo Completo de Mejora.

Se analiza el grado de cumplimiento de las Normas Técnicas Mínimas (NTM) de la Cartera de Servicios de Atención Primaria (INSALUD), correspondientes al Servicio de Atención al Paciente Hipertenso con 7 criterios (1º: Diagnóstico. 2º: Analítica. 3º: Exploración física. 4º: Electrocardiograma. 5º: Fondo de ojos. 6º: Tratamiento. 7º: Control de Tensión Arterial). Se realizó un análisis de la falta del cumplimiento de las NTM (análisis de campos de fuerza y diagrama causa-efecto). Problemas: Pocos objetivos conjuntos médicos-enfermeras; inexistencia de una hoja validada de monitorización del paciente hipertenso; escasas consultas programadas de HTA.

Se diseñó el estudio de evaluación siguiente: 1. Criterios: Explícitos - normativos. 2. Dimensión estudiada: Calidad científico-técnico. 3. Datos: Proceso (Seis primeros criterios); Resultado (7º criterio).

1. Revisión: Interna. 2. Unidades de estudio: Pacientes mayores de 18 años de edad incluidos en el programa de HTA, seguidos durante el año de 1996 (1ª Fase), pertenecientes a 5 cupos médicos (10.368 usuarios) del Centro de Salud de Cartagena-Oeste. Se implantaron medidas correctoras estructurales y educacionales: -Un responsable por cada estamento. -Guía protocolizada sobre pautas de actuación. -Hoja validada de monitorización. -Consultas programadas regulares. -Información a los sustitutos de la sistemática seguida. Tras 12 meses se reevaluó el programa de HTA correspondiente a todo 1998 (2ª Fase).

Resultados: Por Criterios del 1º al 7º, el grado de cumplimiento fue en 1996 del 97%, 86%, 75%, 90%, 36%, 98% y 69%, respectivamente. Tras las medidas correctoras, el grado de cumplimiento en 1998 fue del 100%, 93%, 86%, 96%, 56%, 100% y 86% para los mismos criterios ordenados del 1º al 7º. Siendo significativo ($p < 0,05$) el incremento de cumplimentación de los criterios 1º; 3º; 4º; 5º y 7º.

Conclusiones: 1) El Ciclo de Mejora del Servicio al paciente hipertenso ha sido útil para mejorar la Calidad de la Asistencia a los Usuarios. 2) Se ha constatado una unificación en la forma de actuar de los profesionales del Centro de Salud tras el Ciclo de Mejora realizado.

PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA SPIROMETRÍA EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA

V. López Cortés, C. Pardos Mtz, J. Fuertes Fernández-Espinar, L. Clemente y A. Aller Blanco
Dirección de Atención Primaria.

P-191

Palabra clave: Espirometría, mejora de la calidad, atención primaria.

Resumen: A través de la realización de un grupo nominal se identificó que la técnica realización y la interpretación de la espirometría era deficitaria.

Entre las causas que ocasionaban este problema estaban: que el paciente no colaboraba por falta de preparación previa, que la calibración no era sistemática, falta de formación en la realización de la técnica por parte del personal de enfermería, mal registro de los resultados de la espirometría en la historia, falta de formación por parte del médico en la interpretación correcta de los resultados. Una vez identificadas las causas, se procedió al diseño de un programa de mejora con los siguientes objetivos:

- Explicar al paciente el correcto procedimiento.
- Formación al personal de enfermería de la técnica y al personal médico de la interpretación.

- Registrar los resultados de la espirometría en la historia clínica.

Plan de mejora

- Elaboración de una hoja informativa al paciente que se le dará al darle la cita.
- Calibración del espirómetro diariamente con la jeringuilla y quincenalmente con calibración dinámica.
- Actualización del programa del EPOC del centro.
- Realización de dos talleres de un taller de 4 horas para la realización de la técnica y otro de 2 horas para la interpretación de resultados.
- Consensuar en qué parte de la historia quedarán registradas las espirometrías para ver la continuidad.

En este momento el proyecto está iniciándose porque acaba de ser aprobado, y esperamos presentar en octubre los resultados y conclusiones de muchas de las actividades iniciadas.

RACIONALIZACIÓN DEL USO DEL MATERIAL SANITARIO EN UN ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA

A. Cañada Dorado, J.M. Mena Mateo, E. Hernández Peña, R. Arnal Sefía y E. Mas Cebrán

P-192

Palabras clave: Material sanitario, Apósitos estériles, Eficiencia.

Resumen: Utilizando la metodología de los siete pasos del Camino de la Mejora, abordamos el tema de racionalizar el uso del material sanitario utilizado en las curas, en un área de Atención Primaria que atiende aproximadamente a 500.000 personas. En el período de enero a mayo de 1999 se detecta un aumento del gasto del material sanitario del 23% con respecto al mismo período del año anterior. El consumo de seis artículos en esos cinco meses suponía un gasto de 33,2 millones de pesetas. Decidimos realizar un Programa de mejora centrándonos en tres de los productos (Gasas y Apósitos estériles, e Irixol) que suponían el 85% del consumo total (28,3 millones de pesetas). Realizamos una estratificación incluyendo a los 24 Centros de Salud del Área, identificándose dos por su mayor gasto.

Objetivo: Como objetivo prioritario de mejora, se plantea adecuar el consumo de estos Centros a la media del Área. Al mismo tiempo buscamos mejorar la eficiencia y la adecuación científico - técnica en el cuidado de las úlceras de la piel a toda la población. Realizamos un Análisis de Causas, identificándose cuatro bloques: profesionales de Atención Primaria, coordinación con el departamento de Suministros, características de nuestra población y relación con nuestro hospital de referencia. Las Medidas correctoras implantadas iban dirigidas a mejorar la información, la formación, la comunicación con Suministros, la coordinación con nuestro hospital y adecuar la oferta de apóstoles en el Área, adaptándola a las necesidades de los profesionales y a la evidencia científica.

Resultados: Monitorizamos en períodos de cinco meses desde 1999 hasta 2002 el consumo de los tres productos. El gasto se ha reducido de forma rápida y progresiva, situándose en el último período evaluado en 17,7 millones de pesetas (106.000 Euros), lo que supone una disminución del 38% con respecto al período inicial. El impacto estimado del Programa de Mejora (sin considerar la tendencia al alza) supone un ahorro de más de 32 millones de pesetas (192.000 Euros), a pesar del aumento de nuestra población, consiguiendo al mismo tiempo mejorar la calidad científico-técnica y aumentar la satisfacción de nuestros profesionales.

ESTÁNDARES DE DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS EN ATENCIÓN PRIMARIA. REVISIÓN METODOLÓGICA

I. Besora Torredelot, I. Ferrer Vall, E. Gibert Llorach, C. Olmo del Macia, A. Ondiviela Cariteu, P. Pérez Company y C. Solé Brichs Hospital Vall d'Hebron, Pabellón Docente (1º Plta.)

P-193

Palabra clave: Palabras Clave: diagnósticos, estándares.

Objetos: Estandarizar las intervenciones para garantizar su eficiencia e incorporar un sistema de evaluación que permita el seguimiento del paciente en el proceso de atención y conocer la calidad de los cuidados.

Metodología: Se ha revisado el Manual "Estándares de Diagnósticos Enfermeros en Atención Primaria (NANDA)" que recoge los diagnósticos más frecuentes en este ámbito orientando hacia los objetivos y tratamiento a las enfermeras desde el año 1994. Las fases de la revisión; 1º Formación en elaboración de estándares y sistemas de evaluación al grupo de trabajo. 2º Actualización de la frecuentación diagnóstica y adaptación de la taxonomía según varios modelos. 3º Revisión de la literatura científica y utilización de la evidencia para la determinación de los estándares.

Resultados: Un nuevo Manual que recoge 34 diagnósticos enfermeros con taxonomía NANDA, objetivos a cada diagnóstico formulados como criterios de resultados o de proceso preparados para la evaluación y el tratamiento correspondiente a las intervenciones propuestas por la International Council of Nurses (CIE). Codificación de toda la información de forma que se pueda introducir como base de datos en un programa informático de cuidados y extraer información para la gestión de los mismos relacionada con las características del producto (intensidad), los recursos y el coste.

Conclusiones: Disponer de un documento de estas características posibilita la mejora de los cuidados, también permite aplicar una metodología con los elementos necesarios para garantizar la eficacia de las intervenciones a partir de objetivos medibles i basados en la evidencia científica.

VARIABILIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA EN UN ÁREA DE SALUD

M.J. Calvo Acántara, M. Villamor Borrego, R. de los Mozos Prieto, H. Ortíz Marrón, M.A. Lobo Álvarez y F. González Sanz Gerencia Atención Primaria Área 4.

P-194

Palabra clave: Prescripción, atención primaria.

Introducción: Parte de la variabilidad en la prescripción de fármacos es explicable a por las características de la estructura sociodemográfica y la morbilidad de la población atendida y otra debida a la excesiva utilización de recursos.

Objetivo: Describir la variabilidad de la prescripción farmacéutica en un área de salud.

Metodología: Se recogen las prescripciones de los facultativos pertenecientes a los EAP del Área 4 del Instituto Madrileño de la Salud durante el período 2000-2001. Se realiza un análisis de los datos por principio activo y subgrupo terapéutico en envases, importe y DHD.

Resultados: En el año 2001 se aprecia un incremento en el número de envases y en el importe con respecto al año anterior. Se aprecia también un cambio en el patrón de prescripción de los principios activos de algunos subgrupos terapéuticos (antiasmáticos, hipolipemiantes, hipotensores, antiúlcera).

Se ha incrementado el porcentaje de prescripción de EFG hasta un 13%, con un rango de prescripción del 4 al 18% entre los EAP, y la adhesión a la guía farmacoterapéutica ha aumentado en el año 2001 hasta el 70% (60-76%). En el grupo de hipotensores se ha producido un ligero aumento en la prescripción de fármacos considerados de primera elección (diuréticos y betabloqueantes) frente al total de hipotensores, alcanzándose una cifra media en el área del 11%. Ha aumentado el porcentaje de prescripción de ARA II frente a IECA, con un valor para el año 2001 del 39%. La utilización de AINE es de 11 DHD, siendo 6 DHD de Coxib, con un rango entre los EAP de 8-10 DHD.

Conclusiones: Los rangos de prescripción entre unos EAP y otros indican que hay todavía bolsas de ineficiencia que pueden corregirse siendo este análisis un primer paso para la puesta en marcha de estrategias de mejora de prescripción siguiendo la metodología de los programas de calidad.

EL EXCESO DE PRESIÓN ASISTENCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: UN PROBLEMA ABORDADO DESDE UN PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD

M. Ballarín Bardaji, Y. Díaz López y M.S. Zuzuáregui Gironés

P-195

Palabra clave: presión asistencial.

Resumen: El exceso de presión asistencial es una realidad en muchas consultas médicas de Atención Primaria y genera desmotivación en los profesionales, insatisfacción en los usuarios e incremento de consumos en la organización.

Los factores que modulan la presión asistencial y, por tanto, sobre los que se puede intervenir están en relación con la organización, los profesionales y/o la población. En los EAP del Área se ha puesto en marcha un proyecto que pretende, desde una perspectiva de calidad, abordar los aspectos susceptibles de mejora que influyen en el exceso de presión asistencial.

Objetivo: Identificar y controlar en cada equipo de Atención Primaria los factores que influyen en el exceso de presión asistencial.

Metodología: Las etapas del proyecto en cada EAP han sido: 1. Puesta en común con todos los profesionales del EAP sobre todos los factores que inciden sobre la presión asistencial. 2. Constitución del grupo multidisciplinar de mejora. 3. Cuantificación del peso de cada uno de los factores en el exceso de presión asistencial en el EAP concreto. 4. Identificación de los factores más desviados y, por tanto, más susceptibles de mejora. 5. Establecimiento de medidas de mejora en cada uno de los factores identificados. 6. Propuesta a los profesionales del EAP de las medidas de mejora acordadas. 7. Implantación de medidas de mejora. 8. Reevaluación del proyecto para valorar la mejora conseguida.

Resultados: En el momento actual el desarrollo del proyecto permite adelantar que las áreas de mejora identificadas para intervenir han sido: pacientes hiperutilizadores, escasa utilización de la historia clínica, ausencia de consulta telefónica, elevada consulta administrativa, protocolización deficitaria y coordinación médico/enfermera deficiente. Son logros inmediatos de la puesta en marcha del proyecto: elevada participación de los profesionales en los grupos de mejora, conciencia de propiedad del proyecto de los profesionales, estímulo al trabajo en equipo y potenciación de la cohesión interna del EAP.

Conclusiones: Abordar el exceso de presión asistencial en las consultas médicas de Atención Primaria como un proyecto de mejora de la calidad, permite adecuar la presión asistencial a las circunstancias sociosanitarias de la población y resulta ser un elemento motivador en el funcionamiento de los EAP.

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE CALIDAD EN ÁREA BÁSICA DE SALUD DE NUEVA CREACIÓN

A. Ibiricu Barro y J. Valero Sales

P-196

Palabras clave: Calidad, Atención Primaria, Implantación.

Metodología: Implantación de un Programa de Calidad Asistencial en Área Básica de Salud rural (ABS) de nueva creación. Siguiendo la orientación hacia la Calidad Asistencial promovida por la empresa gestora del ABS, se establece Plan de Puesta en Marcha del Programa: a) Curso de Formación en Calidad para todo el equipo (EAP): 20 horas. b) Constitución del Núcleo de Calidad multidisciplinario: órgano responsable del contenido y metodología de evaluación del Programa. c) Definición de principios básicos filosóficos por EAP: Misión - Visión. d) Definición de Estrategia de Implantación/Estructura Funcional: programación anual, círculos de calidad (CC), task force (TF), grupos de mejora (GM).

Resultados: Elaborada la programación anual se desglosó en los siguientes objetivos con sus correspondientes indicadores de evaluación:

- Objetivos cuali-cuantitativos definidos por la Cartera de Servicios de la Sanidad Pública.

- Objetivos satisfacción Cliente Externo: opinión del usuario.

1) Encuesta de expectativas/satisfacción anual.

2) Detección de problemas: análisis reclamaciones.

- Objetivos de Formación del EAP

- Selección indicadores de Proceso, Estructura y Resultado:

Definición Procedimientos Asistenciales/Administrativos

Circuitos: a) control caducidades fármacos. b) esterilización de material. c) reposición/control caducidad y mantenimiento vacunas. d) control dotación Área Urgencias: control stock, caducidad, funcionamiento. e) actuación urgente fuera del centro. f) eliminación residuos. g) substitución dosímetros Rx.

Protocolo mantenimiento/calibrage aparatos electromedicina.

Implantación Plan de Autoprotección: Formación teórico práctica/simulacro incendio.

Creación GM continua -T F: Analíticas; atención pacientes privados; actuación ante urgencias fuera del centro; atención visitas espontáneas (incidencias).

Creación CC de programas: atención paciente domiciliar; actividades preventivas adulto; salud Bucodental gestantes / edad escolar; actuación adolescentes y tabaquismo.

Seguimiento de actividad mensual del ABS: indicadores económicos / actividad asistencial.

Conclusiones: Tras evaluación anual se obtienen las siguientes conclusiones:

Puntos fuertes: a) Conseguidos los objetivos previstos en programa; elaboración memoria anual que incluye todos los procedimientos e indicadores establecidos. b) Participación activa de todo el EAP. c) Creciente motivación del EAP por la mejora continua. d) Correcta implantación GM.

Puntos débiles: a) Insuficientes reuniones núcleo calidad. b) Pendiente definición modelo de calidad a seguir (EFQM- Joint Comission). c) Profundizar en la formación sobre calidad.

ADAPTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN REHABILITACIÓN PSQUIATRICA MEDIANTE UN GRUPO DE MEJORA

E. Samaniego, P. Martínez, T. López, S. West, A. Cotaina y P. Rived
Residencia Profesor Rey Ardid.

P-197

Palabra clave: Gestión por procesos, grupos de mejora, diagnósticos de enfermería, rehabilitación psiquiátrica

Objetivo: Encuadrar este trabajo dentro de un sistema de gestión por procesos en proceso en el centro. Adaptar los diagnósticos de enfermería de la N.A.N.D.A. a las áreas de intervención del modelo teórico OREM. Formación a enfermería y auxiliares que intervendrán. Integrar diagnósticos en el plan de intervención de enfermería y en el plan terapéutico individual.

Metodología: Valoración y análisis sobre que diagnósticos se adaptaban al modelo teórico OREM y a la población que atendemos. Para la realización del trabajo durante el año 2001 se trabajó en distintas fases:

1) Constitución de equipo de mejora: técnico en calidad asistencial, equipo de enfermería, auxiliares en AVD. 2) Analizar el sistema de trabajo que se venía desarrollando y planteamiento de una serie de oportunidades de mejora, entre ellas la más importante fue la necesidad de establecer planes terapéuticos de enfermería en base a un diagnóstico de enfermería estandarizado, concretamente diagnóstico NANDA. 3) Seleccionar aquellos diagnósticos NANDA adaptables al modelo teórico OREM y a enfermedades mentales de una unidad de rehabilitación. 4) Formación del equipo de enfermería y auxiliares que lo llevarían a cabo. 5) Implantación del sistema diagnóstico NANDA.

Resultados: Se han seleccionado las áreas de intervención más adecuadas según el modelo para las intervenciones de enfermería en rehabilitación. El trabajo sistemático de enfermería según este modelo es compatible con el sistema de gestión por procesos del centro. La metodología y evaluación diagnóstica NANDA es una buena herramienta en la planificación de cuidados de enfermería.

Conclusiones: La utilización de diagnósticos estandarizados de la NANDA ha permitido tener un lenguaje común con el resto de profesionales de enfermería, tanto a nivel interno como con otros dispositivos. Este sistema de trabajo permite: 1) avanzar en la sistematización y concreción de planes individuales de intervención derivados de los propios diagnósticos; 2) mejorar el sistema organizativo de planificación de cuidados y por tanto la calidad asistencial desde el departamento de enfermería; 3) contribuir al avance de la profesión de enfermería a través de un desarrollo cada vez más sistematizado, cualificado y específico, que aporta la gestión de calidad como herramienta de trabajo.

EFICACIA DE UN "COMPROMISO DE INTERVENCIÓN" EN LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE PACIENTES CON RIESGO DE UPP EN EL HOSPITAL REINA SOFÍA

C. Valero Cabrera y M. Moreno Noci
Hospital Universitario Reina Sofía, Unidad Docencia

P-198

Palabras clave: Úlceras por presión, pacto, consenso, seguimiento, estudio, mejora.

Introducción: En Junio del año 2001, y tras un incremento en la prevalencia de úlceras por presión (UPP), nuestro hospital proyecta un "tratamiento de choque" para mejorar el cuidado de los pacientes "con" o "susceptibles de" tener este problema. En enero del año 2002, y tras los Pactos Anuales de Objetivos surge en nuestra unidad un compromiso de estudio y mejora de los cuidados a un aspecto que, por la edad y patología crónica de los pacientes a los que atendemos, es de gran relevancia en nuestra unidad.

Objetivo: Describir la intervención sobre aspectos puntuales del cuidado a las personas con UPP y su influencia medida en términos de prevalencia de UPP.

Material y métodos: Teniendo de referencia el Protocolo de UPP de HURS y dentro del Plan de actuación para la mejora del cuidado a pacientes con UPP en nuestra unidad -3ª izquierda del H. los Morales-, fue elaborado, con la participación y el consenso de todo el personal de enfermería de dicha unidad, un COMPROMISO definido como: 1. Apertura de Hoja de Valoración del Riesgo de UPP a todos los enfermos hospitalizados. 2. Registro de datos complementarios: si es diabético o no/presencia o no de SNG. 3. Insistir, dentro de las medidas preventivas en: a) Aportes nutricionales extras (batidos o pudín hiperproteicos). b) Tipo de colchón colocado. c) La protección en talones con apóstoles preformados hidrocelulares. d) Hidratación de piel con aceite de almendras y/o con aceites hiperoxigenados en zonas de riesgo. 4. Cambios posturales programados, individualizados y registrados. 5. Una vez al mes, realización de un corte de Prevalencia. 6. Al alta del paciente se le entregará el Informe de Enfermería con las pautas de curas o la preventión que debe de seguir en domicilio.

Resultados: Junio 2001 Incidencia 6%. Junio 2001 Prevalencia 72,7%. Marzo 2002 Incidencia 3%. Enero 2002 Prevalencia 45,4%. Febrero 2002 Prevalencia 48%. Marzo 2002 Prevalencia 51,5%. Abril 2002 Prevalencia 33,36%. Mayo 2002 Prevalencia 33,36%.

Conclusiones: El plan de actuación para la reducción de tasa de UPP individualizado en cada unidad nos da: 1) Un mayor control en el seguimiento de cuidados en pacientes con riesgo de padecer úlceras como en aquellos que ya las padecen. 2) Concienciación de los profesionales de la importancia de los registros en enfermos con UPP o riesgo de padecerlos. 3) Aunque no podemos asegurar, debido a lo amplio de la intervención estudiada, a cual de los factores imputar el cambio, el estudio hace evidente los muchos factores en los que podemos incidir y que afectan a la aparición de UPP.

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS HOSPITALIZADOS EN TRAUMATOLOGÍA CON LA ATENCIÓN PROPORCIONADA POR LAS ENFERMERAS

M. Pérez Piñero, C. López Izuel, M. Riu Camps, M. Forner Bscheid, M.J. Vilar Corrius y A. Sánchez Tolosa
IMAS. Hospital del Mar.

Palabras clave: Satisfacción, Usuarios, evaluación, calidad, trayectoria clínica, enfermeras.

Objetivos: Conocer el grado de satisfacción de los Usuarios con la atención de las enfermeras del servicio de traumatología en el que se ha implantado una nueva iniciativa de mejora de la calidad: las trayectorias clínicas

Metodología: Encuesta telefónica, realizada por entrevistadores ajenos al hospital y previamente adiestrados, a una muestra de 121 personas dadas de alta en los 3 meses anteriores, ingresados en el servicio de traumatología y tratados con trayectoria clínica.

Resultados: Valoración global en una escala del 1 al 10 de 8,4. Los siguientes resultados los presentamos agregando las respuestas excelente, muy buena y buena por un lado y las respuestas regular y deficiente por otro.

	Excelente/ muy buena/buena	Regular/ deficiente
Competencia técnica de las enfermeras	98,1%	1,9%
Información sobre las actuaciones	84,1%	14%
Información a las familias	82,2%	13%
Recepción instrucciones en el alta hospitalaria	(SI)	(NO)
Las instrucciones han sido	56,1%	40,2%
	Orales	Escrítas
	38,3%	61,7%
Las recomendaciones, las ha encontrado:	Muy útiles- Útiles	
	98,4%	
El trato proporcionado por las enfermeras	96,3%	3,7%
El respeto a su intimidad por las enfermeras	87,8%	10,3%
Posibilidad de expresar sus dudas y problemas	Siempre-a menudo	A veces-nunca
	71,9%	25,2%
Excelente/muy buena/buena	Regular/deficiente	
Coordinación del equipo	92,5%	4,7%
Se ha tenido en cuenta su opinión	Siempre-A menudo	A veces –nunca
	72,9%	21,5%

Conclusiones: Resaltamos la excelente valoración de la competencia técnica, del trato de las enfermeras y de la coordinación del equipo asistencial. La necesidad de potenciar la participación del Usuario en la toma de decisiones sobre sus cuidados. La necesidad de mejorar los aspectos informativos de las actuaciones de la enfermera, así como la atención a las dudas y problemas expresados por los Usuarios. Destacamos también el cambio de orientación del contenido de las encuestas de satisfacción con el objetivo de buscar una satisfacción del Usuario más madura. Nos hubiera gustado haber dispuesto de una encuesta previa a la implantación de las trayectorias clínicas para valorar el impacto que la introducción de esta herramienta ha comportado en la satisfacción de los Usuarios.

P-199**P-201****CALIDAD ASISTENCIAL EN ENFERMERÍA: GRUPOS DE MEJORA EN RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES**

A. Bailo Gay, N. García Fernández, S. Martínez Fernández, Y. Lanza Salcines y R. Nadal Queralt
Residencia de mayores de Alagón.

Palabra clave: Calidad asistencial en enfermería; Grupo de mejora; Residencias de personas mayores.

Objetivos: Dentro del sistema de Gestión por procesos de las Residencias de mayores de Alagón y Barbastro, (Residencias públicas gestionadas por la Fundación Ramón Rey Ardid), consolidar el método de trabajo “tutorización de residentes”, en relación con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia concretada en la personalización de la atención a usuarios y familiares.

Metodología: Encuadrado en los objetivos de calidad asistencial en la Fundación Ramón Rey Ardid, y liderado por la dirección del centro de Alagón, se creó un grupo de mejora que llevó a cabo las acciones siguientes: análisis del funcionamiento del sistema de trabajo de “tutorías”, detección de problemas; propuestas de mejora; definición de estándares e indicadores de evaluación; control de los resultados de los indicadores en relación con los objetivos.

Resultados: Se presentan los resultados más relevantes de los diferentes apartados trabajados: 1/ Detección de problemas; 2/ oportunidades de mejora; 3/ estándares e indicadores; 4/ aplicación de las mejoras y 5/ resultados del control.

Conclusiones: 1) El sistema asegurara la ejecución de las actividades del método de trabajo de “tutorización de residentes”. 2) La participación de los diferentes profesionales contribuye a la consolidación del sistema de trabajo multidisciplinar de las Residencias, y en concreto a la profesionalización del personal auxiliar. 3) La supervisión de la actividad mediante la monitorización de los indicadores posibilita la estabilización del proceso y el establecimiento de las acciones correctivas oportunas para mejorar la atención al residente y su familia.

CUIDADOS DE CALIDAD

M. Rodríguez Rodríguez, P. Herrera Carral, E. Díaz Sampedro, A. Díaz Mendi, M. Robles García y T. Dierssen Sotos
Hospital Sierrallana, Servicio Medicina Preventiva.

P-200**P-202**

Palabra clave: Cuidados de Enfermería. Calidad.

Objetivos: Implantar un Programa de Mejora Continua de la Calidad de cuidados de enfermería.

Métodos: 1) Instaurar la dirección participativa por objetivos, con priorización de aspectos de la calidad. 2) Crear un Grupo de Trabajo, multidisciplinar, cuyo metodología de trabajo está sustentada en la MCC, de Validación de Planes de Cuidados, Protocolos y Procedimientos, cuyo fin es apoyar y revisar el trabajo realizado en las Unidades, garantizando la calidad de las actividades protocolizadas, así como su difusión. 3) Potenciar la Unidad de Calidad del Hospital. 4) Reorientar el Programa de Formación, convirtiéndolo en herramienta de apoyo para los objetivos previstos.

Resultados: Durante los años 2000 y 2001, se han cumplido el 93% de los objetivos pactados con las distintas Unidades. Se elaboraron y difundieron 3 Guías para el Diseño y elaboración de Protocolos, Planes de Cuidados y Procedimientos. Se validaron 11 PCE, 9 Protocolos y 28 Procedimientos. Se han realizado Manuales para la difusión de estos documentos en cada una de las Unidades/Servicios. Se presentaron en 4 sesiones formativas los documentos elaborados. Se han constituido dos Grupos de Mejora para el diseño y elaboración de los Protocolos de Acogida a los Profesionales de Enfermería y a los Pacientes. Se crearon 2 puestos de trabajo a tiempo total en la Unidad de Calidad, y se realizaron 6 cursos sobre Metodología de la Calidad, a los que acudieron 93 personas y 1 sobre Investigación, del cual han surgido 4 proyectos de investigación.

Conclusiones: La instauración de esta metodología de trabajo nos permite, impulsar el cambio de la cultura de la organización, a través de la definición de la cartera de servicios enfermeros, y de la aplicación del método científico a la labor de cuidar. La formación en metodología de la calidad, y su posterior aplicación ha supuesto un avance para la consecución de los objetivos propuestos. La obtención de indicadores, nos permitirá mejorar seguir mejorando la calidad de los cuidados.

IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO NO ASISTENCIAL: HIPERCLORACIÓN DE LA RED EN UN HOSPITAL COMARCAL

L. Ballesteros

Palabra clave: Proceso no asistencial, plan de comunicación, desinfección por hipercloración, legionella.

Objetivos: 1. Utilizar la metodología de la gestión por procesos para la Hipercloración de la red. 2. Estrategia de Implementación. 3. Evaluación de la implementación.

Metodología: 1. Se diseñó el proceso de Desinfección de la red mediante HIPERCLORACIÓN: Definición global, destinatarios y objetivos, componentes del proceso, indicadores del proceso. 2. Elaboración del plan operativo con la creación de un grupo constituido por Supervisoras, Responsable de la Unidad de mantenimiento y Dirección de enfermería. Desarrollo de una técnica cualitativa de grupo nominal (priorización de problemas y propuestas de solución), plan de gestión (indicadores de impacto) y plan de comunicación. 3. Grado de información de los trabajadores, grado de información del cliente externo, Grado de satisfacción del cliente interno. Porcentaje de reclamaciones.

Resultados: 1. Elaboración del documento del proceso de desinfección de la red de abastecimiento. 2. Aspectos priorizados en el grupo nominal: Abastecimiento de agua potable para los pacientes ingresados y familiares, para el lavado de manos, aseo personal o lavado de recién nacidos, control por Mantenimiento de todos los aparatos que se pudieran dañar, horario de desarrollo, personal extra para llevarlo a cabo. Propuesta de plan operacional. Cronograma. Indicadores de impacto: Colonización de la red mediante recuento total de bacterias a 37° y 25° y recuento total de hongos en dos ocasiones al año. El plan de comunicación a cuatro niveles: Gerencia (consejo de dirección) a través de distintos informes que de forma sucesiva enmarcan el proceso. Los profesionales implicados información escrita y a través de grupos según el área a controlar. Los profesionales no implicados directamente a través de dos notas informativas, la 1ª explicando la necesidad de la medida y especificando una persona para resolver las dudas y en la 2ª detallando el plan operacional., la fecha y hora de realización y remarcando la necesidad de colaboración. El cliente externo es informado verbalmente cuatro horas previas para evitar el factor sorpresa. 3. Satisfacción del cliente interno: Desarrollo y resultado sin incidentes. Realización según cumplimiento del RD909. 0% de reclamaciones. 0% accidentes por ingestión o inhalación. El 100% de los profesionales del hospital que trabajaban el día señalado referían estar informados.

Conclusiones : La metodología aplicada a los procesos asistenciales es útil para aquellos procesos que son no asistenciales pero que implican a varias áreas tanto clínicas como no clínicas para su abordaje y control.

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS DEL ÁREA VALLADOLID-ESTE EN EL AÑO 2000

M. Cárdaba Arranz, P. Gutiérrez Meléndez, J. de la Puente Callejo y E. Gilsanz Cartujo
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social.

P-203

Palabra clave: Tuberculosis.

Objetivo: Conocer el grado de desarrollo y la repercusión de las intervenciones de prevención y control de la tuberculosis en la población general del Área de Salud Valladolid-Este durante el año 2000.

Metodología: Se calcularon varios indicadores de proceso y resultado considerados en el 2º Plan de Salud de Castilla y León, utilizando la información obtenida de los pacientes notificados al Sistema de Información de Tuberculosis que cumplían la definición de caso de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Resultados: Se diagnosticaron 97 casos que suponen una incidencia global de 36,9 casos/100.000 habitantes. La tasa de coenfermedad VIH/Tuberculosis por 100.000 habitantes fue 6,1. El porcentaje de casos notificado desde Atención Primaria fue 10,3%. Desde Atención Especializada: 86,6%. Desde el Sistema E.D.O.: 51,6%. Búsqueda activa de casos: 4,2%. Se realizó estudio de colectivos en 21,6% de los casos. El porcentaje de resultados satisfactorios (curación o tratamiento finalizado) es de 71,1. El de exitus es 11,3%. El de resultados insatisfactorios (tratamiento interrumpido, transferencia o fracaso) 5%. En el 12,3% se desconoce el resultado.

Conclusiones: La incidencia de tuberculosis es similar a la nacional (38,51 Estudio PMIT) pero superior a la de países de nuestro entorno. La tasa de coenfermedad VIH/tuberculosis es superior a la regional (4,87) pero inferior a la nacional (6,8). Se constata mayor declaración hospitalaria indicando el cumplimiento del protocolo de derivación para confirmación de caso desde Atención Primaria. El porcentaje de curación es inferior a otros publicados y al aconsejado por la OMS, posiblemente por los factores de riesgo de ciertos pacientes, lo que hace pensar en la necesidad de los TDO. Se comprueba un déficit de información que impide una evaluación más completa del programa, tanto por dificultades de coordinación entre niveles asistenciales como por una insuficiente dotación de recursos.

P-205**DESPISTAJE DE HEPATITIS B: RESULTADOS DE UN AÑO UTILIZANDO DOS MARCADORES DE RUTINA**

M.A. Losa Ciganda, C. Pérez Sánchez, I. García Martín, R. Pérez Albert y M.J. García Sánchez
Laboratorio C.E.P. Carabanchel.

Palabra clave: Despistaje Hepatitis, Eficiencia Diagnóstico, Marcadores Rutina, Evaluación Datos Analíticos.

Objeto: Evaluar la mejora diagnóstica para el despistaje de hepatitis B al introducir el marcador HBsAg junto con el Anti-HBc total como prueba de rutina, con motivo de un consenso entre los Laboratorios del Área 11 Sanitaria de la C.A.M.

Metodología: Rastreo de todas estas peticiones analíticas correspondientes al año 2001 (7.915 peticiones). Diseño impreso de recogida de datos: a) Fechas y Nº de registro de los sueros; b) Servicio Clínico peticionario; c) Diagnóstico presuntivo; d) Panel de marcadores de hepatitis solicitado y c) Resultados de dichos marcadores.

Resultados: 1) El 87,8% de estas peticiones corresponde a médicos de Atención Primaria. 2) En 5.899 casos (74,5% de las muestras analizadas) ambos marcadores fueron negativos. 3) En 2.015 casos (25,5%) el AcHBc resultó positivo, acompañándose de HbsAg positivo en 355 casos (4,2% de la totalidad). 4) Un solo caso, presentó Anti-HBc negativo siendo HBsAg positivo (0,012% de la totalidad) analítica adicional ALT 850 U/L, Bilirrubina 3,0 mg/dl; no se acompañaban datos clínicos del paciente.

Conclusiones: 1) El 99,88% de las 5.900 muestras analizadas con resultado de marcador AcHBc total (anticuerpo anticore) negativo, presenta el marcador HbsAg (antígeno de superficie) también negativo. Podemos considerar que la realización de este marcador no ha aportado información adicional relevante en los casos en que el AcHBc total es negativo. 2) Consideramos que estos resultados permiten utilizar como primer marcador de rutina el AcHBc total, y únicamente cuando éste sea positivo o sean aportados datos clínicos sugestivos, continuar el estudio de los restantes marcadores serológicos contemplados en el protocolo de consenso antes mencionado. 3) Este modo de actuación se traducirá sin duda en una mejor utilización de los recursos materiales y humanos y en consecuencia en un aumento de la eficiencia del Servicio, garantizando a su vez una atención sanitaria de calidad.

RECAPTACIÓN EN PROGRAMAS DE SCREENING

F. Repáraz, J. Alfonso, J. Del Cazo e I. Núñez
Área de Salud de Estella.

P-204

Palabra clave: Detección Precoz, Participación, Captación.

Objetivo: Evaluar la efectividad de aplicar un método de recaptación como instrumento para la mejora de la participación de un programa de detección precoz del cáncer colorrectal.

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo realizado sobre una muestra de 1.414 personas de ambos性es y de edad comprendida entre los 50 y 75 años. Se realizó la captación para un programa de detección precoz de cáncer colorrectal mediante invitación por carta y cita personalizada. A las personas no respondedoras se les realizó una nueva oferta, esta vez telefónica.

Se analiza la tasa de participación tras citación por carta y la tasa de recaptación tras citación telefónica.

Resultados: Un 56% de las muestras respondió a la citación mediante carta. Entre los no respondedores, la captación telefónica fue del 27,5%, con lo que se obtuvo una mejora en la participación en el programa en un 12%, alcanzando una participación global del 68%.

Como contribución a esta tasa global, se obtiene que el 17,6% de la participación en el programa es consecuencia de la recaptación telefónica.

Conclusiones: La utilización de técnicas de recaptura en los programas de detección precoz del cáncer colorrectal mejoran la efectividad de la captación del programa.

P-206**EVALUACIÓN Y MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIAS (SDMDU)**

M.D. Nájera Pérez, J. Plaza Aniorte, E. Abad Corpa, M.A. Martínez Bueno y E. García Oltra
Hospital Moreles, Meseguer Servicio de Farmacia.

Palabra clave: Distribución de Medicamentos, Dosis Unitaria, Ciclo de Mejora.

Objetivos: Se pretende analizar y mejorar el cumplimiento de los horarios en el Sistema de Distribución de Medicamentos de Dosis Unitaria (SDMDU).

Metodología y resultados: El trabajo se ha realizado siguiendo la metodología de un ciclo de mejora, distinguiendo las siguientes fases:

-Oportunidad de mejora: en el Servicio de Farmacia se ha detectado un retraso en el cumplimiento de horarios en el SDMDU en las unidades de medicina interna, lo cual ocasiona un retraso en la administración de una de las dosis de medicación.

-Análisis de situación y selección de criterios. Mediante el diagrama de Ishikawa se seleccionan los siguientes criterios: C1) hora de llegada de las prescripciones médicas (pm), C2) horario de transcripción de las pm, C3) horario de validación de las pm, C4) horario de llenado de los carros de medicación, C5) horario de llegada de los carros de medicación a las unidades, C6) pacientes que reciben todas las dosis en el horario establecido.

-Datos de la primera evaluación: aparece un menor porcentaje de cumplimiento de los criterios C3 (7,14; ic = 3,24), C5 (35,71; ic = 6,10) y C1 (60,08; ic = 6,22). El C6 alcanza un porcentaje de cumplimiento de 68,49 (ic = 5,88).

-Acciones de mejora. A corto plazo: 1- reunir al personal implicado: médico, personal de enfermería y celadores, insistiendo en la importancia de respetar los horarios establecidos. 2- Revisar el circuito del SDMDU en el Servicio de Farmacia. A largo plazo: prescripción informatizada de la pm desde las unidades clínicas.

-Datos de la segunda evaluación. Tras la puesta en marcha de las medidas a corto plazo: se ha conseguido una mejora estadísticamente significativa en todos los criterios evaluados destacando C3 (72,72%, ic = 5,70), C5 (78,99%, ic = 5,17) y C6 (90,34%, ic = 3,81%), todos ellos con un valor de $p < 0,001$. Los gráficos de Pareto de ambas evaluaciones, muestran asimismo una disminución marcada en el incumplimiento de todos los criterios.

Conclusiones: 1) Principales mejoras conseguidas: mayor cumplimiento en todos los criterios. Destacada mejora en el C6, el más significativo, ya que nos informa sobre todo el proceso. 2) Oportunidades de mejora pendientes: mejorar el cumplimiento de C1, con la puesta en marcha de la medida a largo plazo expuesta anteriormente.

EL TIEMPO DE RESPUESTA DE ANALÍTICAS URGENTES COMO INDICADOR DE CALIDAD EN UN LABORATORIO INTEGRADO

X. Boquet Miguel, N. del Río Barcenilla, M.A. Bosch Llobet, J.A. Hernández Rivas y G. Sauca Subias

P-207

Objetivo: Conocer la evolución del tiempo de respuesta intralaboratorio (TRI) de las analíticas urgentes, con el fin de evaluar el cumplimiento del indicador de calidad pactado con los servicios clínicos (TRI 60 minutos para el percentil 80), teniendo en cuenta que durante el primer cuatrimestre del 2002 se ha producido un incremento del 14% de la actividad global del laboratorio sin incremento de personal. El Hospital de Mataró es un hospital general de ámbito comarcal de nivel B, de 330 camas con todas las especialidades médicas y quirúrgicas, incluyendo una UCI con 12 camas. Área de influencia 210.000 habitantes.

Metodología: El Servicio del Laboratorio recibió en el año 2001 162.385 peticiones (1.417.676 determinaciones), de las que 53.975 (424.032) eran urgentes (33,5% del total). A nivel organizativo, el laboratorio ha optado por un modelo de "laboratorio de 24 horas", en el que las urgencias están integradas dentro de cada una de las áreas de conocimiento: bioquímica, hematología, inmunoserología, microbiología y depósito de sangre, con una ratio de 8 determinaciones/petición. Hemos utilizado el programa de gestión del laboratorio, en el que la analítica urgente está totalmente informatizada: solicitud de analíticas, consulta y visualización de resultados validados a tiempo real desde cualquier origen peticonario y edición remota de informes completos.

Resultados: 1) En el año 2001 se obtuvo un TRI global 60 minutos para el percentil 80, mientras que en el primer cuatrimestre de 2002 disminuyó al percentil 78. 2) Si analizamos los resultados por turnos de trabajo, observamos que los TRI correspondientes al año 2001 fueron: mañana percentil 75, tarde 80 y noche 86, mientras que en el 2002 son: mañana 68, tarde 78 y noche 88.

Conclusiones: 1) Se observa un incremento del TRI global a expensas principalmente del turno de mañana. En él repercute en mayor grado el aumento de actividad del laboratorio, dado que es cuando se realiza la mayor parte de la analítica programada. 2) Los TRI más largos corresponden a peticiones con determinaciones complejas (Ziehl, digoxina, teofilina, β -HCG, recuento de líquidos biológicos, pruebas cruzadas, etc.), que penalizan el tiempo global de la analítica urgente. 3) El TRI es un buen indicador de calidad, pero no refleja la rapidez de la respuesta en situaciones críticas. Se pacta con los servicios clínicos la creación de "analítica emergente" con TRI ajustados (gasometrías 5 m, hemograma 20 m y coagulación 40 m).

INFORMACIÓN AL PACIENTE QUE ACUDE AL LABORATORIO

M.C. Herrero Alonso, J.M. Moreno Cebeira, F. Cava Valenciano y M. Nevado Santos

P-208

Palabra clave: Preanalítica, Información al Paciente.

Objetivos: Normalizar y Asegurar el proceso de información al paciente que acude al laboratorio como parte del proceso de mejora de la fase preanalítica. Consolidar a los Facultativos de Laboratorio como los únicos responsables de elaborar, editar, revisar y aprobar los documentos, formar al personal y solventar cualquier aclaración en relación a las condiciones preanalíticas.

Material y métodos: 1) Detección determinaciones que precisan información específica. 2) Recopilación y retirada de documentos circulantes. 3) Clasificación y codificación de los documentos necesarios. 4) Definición del formato normalizado en Word. 5) Elaboración, Revisión y Aprobación del Procedimiento de Actuación ante el Paciente que acude al laboratorio. 6) Elaboración de los documentos de Instrucciones al Paciente (IP) por cada facultativo responsable de las técnicas afectadas, Revisión y Aprobación. 7) Conversión a formato PDF. 8) Esquema y diseño de la página de Intranet mediante FrontPage. 9) Publicación y administración de los documentos en la Intranet. 10) Inclusión de los documentos de IP en el Gestor de Peticiones Clínicas (GPC) - herramienta asistencial ya en uso de solicitud informatizada - asociados a las pruebas afectadas. 11) Difusión y formación del personal sanitario. 12) Implantación.

Resultados La inclusión de las IP en GPC permite imprimirlas directamente al realizar la petición a laboratorio. La inclusión de las IP en la Intranet permite su consulta actualizada sin necesidad de realizar una petición. La utilización conjunta de las 2 herramientas garantiza una información normalizada de las condiciones preanalíticas y la entrega del documento de IP específico de la versión vigente eliminando el riesgo de consulta y/o impresión de documentos obsoletos o no elaborados, revisados y aprobados por el personal acreditado.

Conclusiones: La utilización de un sistema informatizado agiliza la gestión documental y su consulta, facilita la información al paciente y contribuye a minimizar las variables preanalíticas, obtener la muestra adecuada y utilizar el recipiente adecuado, lo que constituye el inicio del aseguramiento de calidad del laboratorio. Los Facultativos de Laboratorio deben ser los responsables de elaborar, editar, revisar y mantener todas las IP necesarias para realizar la correcta Información al Paciente.

ACTIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA DESPUÉS DE UNA UNIFICACIÓN DE ARCHIVOS

M.P. Jiménez Carnicer, A.M. Eparza Sádaba, M. Oiarbide Amillano, M. Rada Urbano y equipo de Archivos del Centro de Consultas "Príncipe de Viana".

Centro de Consultas Príncipe de Viana, Sección Documentación.

P-209

Palabras clave: Historia clínica, Indicadores de calidad.

Introducción: La Sección de Archivos del Centro de Especialidades "Príncipe de Viana" custodia las historias clínicas de los dos hospitales terciarios de Pamplona del Servicio Navarro de Salud. Estos hospitales cuentan con 1.059 camas y anualmente tienen 37.656 ingresos, 420.000 consultas y 121.348 urgencias. Atienden una población de 440.000 habitantes. El Archivo está abierto las 24 horas del día durante todo el año. En torno a él gira la actividad del área especializada de Pamplona y de su accesibilidad depende el buen funcionamiento de la misma.

Objetivos: Describir la actividad de la Sección de Archivos en cuanto al movimiento de historias clínicas y evaluar la disponibilidad de la documentación, así como el préstamo urgente.

Material y métodos: Tras la unificación de los archivos de los dos hospitales en Junio de 2000 se procedió a la separación y gestión independiente de la documentación en papel (H^a) y del material radiográfico (Rx). En la actualidad existen 566.147 historias numeradas por el sistema de triple dígito terminal. Para el presente trabajo se ha medido (por nº de historias y nº de sobres de H^a y de Rx) las historias solicitadas y prestadas por tipo de préstamo, el nº de devoluciones y el total de movimientos (solicitadas más devoluciones). Se refleja la actividad mensual, anual y la media diaria en días laborables durante el último año. Así mismo se ha medido la disponibilidad de las historias programadas (relación de historias prestadas respecto a solicitadas) y el control de préstamos urgentes.

Resultados: Se han prestado un total de 473.530 historias, 466.815 sobre de H^a y 177.688 de Rx. La media diaria ha sido de 1.917, 1.890 y 719 respectivamente. Por tipo de préstamo y el total de movimientos se refleja en las tablas. El nº de devoluciones ha sido de 508.432 historias, 472.151 sobre de H^a y 178.788 de Rx, con una media de 2.058, 1.912 y 724 respectivamente. La disponibilidad de las historias ha sido del 88,6% y el porcentaje de urgentes del 14%.

Conclusiones: Los movimientos medidos aportan información sobre la actividad del Archivo ligada a la época estacional. La disponibilidad (que no alcanza el estándar de 90% mínimo) y el porcentaje de urgentes (que supera el estándar de 10%) reflejan posibles mejoras a realizar.

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS PETICIONES DE MAMOGRAFÍAS EN PACIENTES EXTRAHOSPITALARIOS

J. Puche Martínez, M.S. Juan Martínez, R. Vicente Gorballo, M. Carnero Ruiz, C. Crespo Martínez e I. González Álvarez
H.U. San Juan Scio de Radiología.

P-210

Palabra clave: Estudio de evaluación, mamografía, cumplimentación.

Objetivo: Describir el grado de cumplimentación de las peticiones de mamografías con el fin de definir un tipo de documento que facilite su utilización y que recoja la información adecuada

Material y métodos: Se ha realizado un estudio de evaluación revisando 399 peticiones de mamografías recogidas durante cuatro meses y se ha valorado la cumplimentación de diferentes criterios de calidad. Además de la consulta de procedencia y el profesional solicitante se ha constatado la existencia de los siguientes datos: la edad del paciente, la historia familiar previa de cáncer, la existencia de exploraciones mamográficas previas, la anamnesis e historia clínica, la exploración actual y la existencia o no de tratamiento hormonal sustitutorio.

Resultados: Las peticiones fueron realizadas por el servicio de Ginecología en 279 ocasiones, por el servicio de Cirugía en 102 casos y por Atención Primaria en los 14 casos restantes. La presencia de exploración física se constató en el 27,3% de los casos, localizándose la lesión en el 23,3%. La cumplimentación de más de tres criterios de calidad se verificó en el 12,1% de los casos, habiendo un 36% con dos criterios cumplimentados y un 43% con solamente un criterio de calidad. Se han encontrado diferencias de cumplimentación entre los distintos servicios y profesionales.

Conclusiones: Ante la variabilidad y la baja cumplimentación de datos en las hojas de peticiones de mamografía se plantea el proporcionar a cada profesional y servicio sus índices de cumplimentación junto a los resultados agregados y el proponer una hoja con datos predefinidos para facilitar su cumplimentación.

CONTROL DE CALIDAD DE LA PUNCIÓN-ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA

E.M. Alonso Fernández, F.A. Conde, J. Zameza, J. Roca,
M.A. Leciñena y J.A. Martínez
H. Can Misses.

Palabra clave: Punción, informe, control calidad.

Objetivos: Realizar un control de calidad en el servicio de radiodiagnóstico, mediante la recepción-del informe anatomo-patológico de los resultados de la punción-aspiración realizada con guía radiológica. Contrastar dichos resultados con la semiología radiológica y evaluar qué posibles cambios pueden existir en acortar el tiempo de diagnóstico del paciente y/o cambiar la actitud diagnóstico-terapéutica. Incorporar el resultado anatomo-patológico en el informe radiológico para confirmar el diagnóstico definitivo.

Metodología: La punción aspiración con aguja fina es un medio diagnóstico limpio, barato, con muy escasa morbilidad, cuya práctica se ha visto incrementada con el paso de los años. Las lesiones no palpables requieren medios auxiliares radiológicos para localizarlas y muestreárlas. La mama es el órgano que más se punciona. La mayor dificultad estriba en el tamaño, y en la naturaleza de la lesión. En las lesiones subcentimétricas y en ciertas lesiones de mama, de naturaleza (fibrosa), de carácter benigno en su mayoría resulta muy difícil acertar para obtener material representativo para diagnóstico citológico. Fueron revisados todos los diagnósticos de punción-citología con aguja fina realizados en el hospital durante un año, correspondientes a tiroides, mama y pulmón. Los diagnósticos fueron clasificados dentro de uno de los siguientes grupos: material insuficiente, lesión benigna, lesión maligna y lesión no clifiable (no definible con nuestros medios como maligna o benigna).

Resultados: Tiroides (total: 31), material insuficiente: 13 (41,9%), lesión benigna 1: 16 (51,6%), lesión maligna: 1 (3,2%), lesión no clifiable: 1 (3,2%). Mama (total: 54), material insuficiente: 16 (29,6%), lesión benigna: 18 (33,3%), lesión maligna: 18 (33,3%), lesión no clifiable: 2 (3,8%). Pulmón (total: 21) material insuficiente: 3 (14,2%) lesión benigna: 1 (4,8%), lesión maligna: 17 (81%). lesión no clifiable: 0 (0%)

Conclusiones: Creemos que es importante contrastar los informes anatomo-patológicos mediante la recepción directa del mismo en el servicio de radiodiagnóstico para confirmar la correlación radio-patológica, repetir las punciones en los casos de material no suficiente y si fuera preciso orientar un cambio diagnóstico-terapéutico.

P-211**CONTROL DE CALIDAD DE LA INDICACIÓN-ADECUACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS EN NUESTRO CENTRO**

E.M. Alonso Fernández, M.A. Leciñena, F. Muela, J. Roca, F. García y J.A. Martínez
H. Can Misses.

Palabra clave: TC, traumatismo craneoencefálico.

Objetivos: Existe un consenso en la realización de T.C en pacientes con riesgo alto y moderado de padecer lesión intracranial, pero sigue habiendo controversia en cuanto a la realización de T. C de rutina en traumatismos menores con puntuaciones > 12 en la escala de Glasgow. Medir los criterios de adecuación de la tomografía computarizada en el traumatismo craneoencefálico en nuestro hospital.

Elaborar un protocolo con los criterios de adecuación adaptados a nuestro medio, características propias de un hospital insular del grupo I.

Proponer como acción de mejora un protocolo multidisciplinario, consensuado de derivación al centro de referencia de neurocirugía, adaptado a las especiales circunstancias de nuestro centro.

Metodología: Revisamos los datos de la historia clínica-indicación de TC en nuestro hospital (1997-2000) y los comparamos con los estándares basados en la evidencia científica disponible, criterios ACR.

Anotamos las siguientes variables: edad, sexo, escala de Glasgow, semiología tomográfica.

Resultados: Se expresan en porcentaje de casos adecuados al protocolo de ACR. Período de estudio (1997-2000), número total de TC = 260; porcentaje de adecuación = número de casos que cumplen criterios/número de casos estudiados x?100 = 155/260 x?100 = 59%; de 260 pacientes: 78% hombres, 21% mujeres. La edad media fue de 36 años. Rango escala de Glasgow (6,5-10,32).

La semiología tomográfica más frecuente fue (TCDB): LAD II (30%), lesión focal no evacuada (15%) y LAD I (10%). El 45% de las tomografías fue normal.

Al igual que en el resto de los hospitales consultados, aumenta cada año el número de peticiones tomográficas.

Es preciso adaptar las indicaciones a nuestra realidad y mejorar el nivel de adecuación. Falta realizar un estudio estadístico con las variables clínico-tomográficas predictivas de mortalidad y mal pronóstico.

Conclusiones: Es prioritario elaborar un protocolo de petición de T.C y de derivación de los pacientes subsidiarios adaptado a nuestra realidad insular y con el enfoque prioritario a la participación de los profesionales.

P-212**CONTROL DEL PACIENTE ANTICOAGULADO. CALIDAD PERCIBIDA VERSUS SEGURIDAD**

M.A. Orellana Miguel, P. Ruiz López, M. Aramendi Ramos y A. Gómez de la Cámara

Palabras clave: Anticoagulación, INR.

Objetivos: Dentro de la práctica clínica se tiende siempre a elegir las técnicas menos dolorosas para el paciente, siempre que proporcionen una seguridad adecuada en los resultados. Dada la alta prevalencia de pacientes sometidos a anticoagulación oral, cualquier mejora en la asistencia tiene un impacto importante.

El objetivo del estudio es el análisis comparativo del control del paciente anticoagulado, mediante el International Normalized Ratio (INR), con muestras en sangre capilar y venosa y su impacto en la actitud terapéutica.

Material y métodos: Se estudian 155 pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales, que acuden para el control de dicho tratamiento durante un período de un mes. Se les realiza una punción venosa para determinación de INR en plasma y punción en pulpejo del dedo para la obtención de INR en sangre capilar. La toma de muestra es realizada siempre por la misma enfermera. El INR en plasma se realizó en el autoanalizador CA6000 (DADE-Behring). El INR capilar se midió en el sistema Trombotrack (Nycomed). Se consideró el rango de INR que debía tener cada paciente para valorar la actitud terapéutica.

Resultados: La media y DE de INR en plasma fue de $2,36 \pm 0,65$ y en sangre capilar de $3,25 \pm 1,28$. El coeficiente de correlación (Pearson) fue de $r = 0,92$. El grado de acuerdo fue de 0,34 (0,08-0,53) La actitud terapéutica fue discordante en el 51,6%.

Conclusiones: Aunque el seguimiento del tratamiento con anticoagulantes orales (TAO) en sangre capilar pudiera ser más beneficioso para el paciente por ser menos traumático, el resultado obtenido no es el adecuado, ya que el grado de acuerdo entre los dos métodos es muy bajo, por lo que éstos no pueden ser asimilados. Si se usan los mismos criterios de INR en plasma y en sangre capilar, más del 50% de los pacientes estarían infraanticoagulados, con la repercusión clínica que ello supone. Es necesario replantear nuevos criterios de INR para el TAO en sangre capilar.

P-214**CORRELACIÓN RADIOLÓGICA-ANATOMOCLÍNICA EN LAS APENDICITIS AGUDA**

E.M. Alonso Fernández, A. Conde, F.A. Zameza, G. Moreno, M.A. Leciñena y J. Roca
H. Can Misses.

Palabra clave: Abdomen agudo, ecografía, tomografía computarizada, apendicitis aguda.

Objetivos: Enfatizar la contribución radiológica en el diagnóstico y orientación terapéutica rápida y precisa de los pacientes con abdomen agudo. El manejo de la mayoría de estos pacientes se basa en los hallazgos clínicos, y de exploración física. Pero, cuando éstos no son suficientes y se precisa más información, creemos que la ecografía y el TC constituyen métodos diagnósticos útiles.

Desarrollar un circuito multidisciplinario médico-radiológico-quirúrgico que permita evaluar precozmente la gravedad del episodio abdominal.

Metodología: Revisamos retrospectivamente 270 pacientes con el diagnóstico de apendicitis aguda correspondientes a 2 años: 1999 y 2001. Medimos la correlación clínico-radiológica-anatomopatológica en estos enfermos, así como el porcentaje de casos con resultado perforado o gangrenoso.

Resultados: número de apéndices con lesión anatomo-patológica/número total estudiado = 74,25% en 1999 y 79,72% en el 2001. El Número total de casos en 1999 fue de 132 y en el 2001 de 138.

Número de apéndices gangrenosos-perforados/número total estudiado = 43,47% en 1999 y de 31,81% en el 2001.

Conclusiones: La correlación radio-quirúrgica fue aceptable alrededor del 80%. Pero, persiste un elevado número de apéndices perforados o gangrenosos, porcentaje mayor del 30%. A pesar de estos resultados, nuestros indicadores han mejorado con sólo realizar ecografía urgente cuando ha sido solicitada al servicio de radiodiagnóstico. Nos planteamos como acción de mejora la realización de un protocolo conjunto con los servicios de cirugía y urgencias para la realización de ecografía rutinaria en todos los casos con sospecha de abdomen agudo. Creemos que la ecografía y el T.C en los casos dudosos ofrece un diagnóstico adecuado y rápido sin disparar el coste económico.

CONTROL DE CALIDAD DE LA PETICIÓN DE IRM EN NUESTRO CENTRO

E.M. Alonso Fernández, J. Roca, M.A. Leciñena, J.A. Martínez y F. García
Ibiza.

P-215**Palabra clave:** IRM, petición, justificación.

Objetivos Medir la adecuación en la indicación de la resonancia magnética ósteoarticular y neurológica en nuestro hospital
Elaborar un protocolo con los criterios de adecuación adaptados a nuestro medio, características propias de un hospital insular del grupo I, < 200 camas y con una casuística un 10% más compleja de la media de su grupo.

Metodología: Este trabajo se enmarca en el plan de calidad centrado en el diagnóstico de situación de nuestra realidad hospitalaria insular.

Revisamos los datos de la historia clínica-indicación de IRM en nuestro hospital: 1997-2000, y los comparamos con los estándares basados en la evidencia científica disponible, criterios OSTEBA

Resultados: Se expresan en porcentaje de casos adecuados al protocolo OSTEBA.

Período de estudio (1997-2000): Número total de IRM = 3428. La evolución en cuanto a la petición de IRM aumenta aproximadamente un 13% por año.

Porcentaje de adecuación = número de casos que cumplen criterios/número de casos estudiados x 100 = 2350/3528 = 66%. Existen aproximadamente un 10% de exploraciones duplicadas TC-IRM- innecesarias en la evaluación de la patología vertebral y discal. Al igual que en el resto de los hospitales consultados, aumenta cada año el número de peticiones de exploraciones por IRM. Es preciso adaptar las indicaciones a nuestra realidad y mejorar el nivel de adecuación.

La tasa de utilización de la IRM en nuestro hospital es de (9,1/1000) habitantes, un 32% superior a la tasa de los hospitales del grupo I.

Conclusiones: Se repiten pruebas diagnósticas innecesarias TC-IRM en patología vertebral. Es preciso elaborar y difundir un protocolo de petición de estas pruebas adaptado a nuestro medio, con enfoque prioritario a la participación de los profesionales.

MEJORA DE LAS PETICIONES RADIOLÓGICAS DE ECO-DOPPLER DE TRONCOS SUPRA AÓRTICOS EN PACIENTES INGRESADOS DE NUESTRO HOSPITAL

C. de Arriba Villamor, I. García de Eulate Martín-Moro, M.P. Lorente Valero, J. Saénz Bañuelos, M. Saldaña Lusarreta y S. Mauleón Rubio
Hospital Virgen del Camino Servicio de Radiología.

P-216**Palabra clave:** Radiología, eco-doppler, calidad, protocolo.

Metodología: 1. Se desarrolla un ciclo de mejora ante el problema detectado: atender la demanda de peticiones de EDTSA del Servicio de Neurología para sus pacientes ingresados. 2. Se consensúa un protocolo de los criterios de remisión al servicio de radiodiagnóstico. 3. Se pone en marcha la actividad y se monitorizan los indicadores: tiempo de espera, si se ajusta a protocolo y hallazgos radiológicos que van a condicionar posteriores exploraciones, evitando las innecesarias.

Resultados: Desde noviembre de 2001 hasta mayo de 2002 se han realizado 100 exploraciones. Se han incorporado progresivamente las peticiones del Servicio de Neurología y de Medicina Interna. Han sido rechazados por no ajustarse a protocolo 6 peticiones. No se ha generado lista de espera. Las solicitudes se han atendido en una media de 1.21 días evitando el desplazamiento a otros centros y disminuyendo gastos y molestias al paciente. 67 pacientes eran hombres y 33 mujeres, con una media de edad de 66,39 años. Se ha encontrado patología hemodinámicamente significativa en 19 casos: 13 (12,48%) estenosis moderadas y 6 (5,76%) estenosis severas. Se ha completado el estudio con angioRM en 9 casos, en 2 con arteriografía y en 1 con angioTC.

Conclusión: Se ha mejorado la petición de la exploración en los casos que cumplían criterios para ello, consiguiendo disminuir el tiempo de espera, evitando gastos de desplazamiento y orientando las exploraciones complementarias.

Los protocolos se demuestran como herramientas imprescindibles para el proceso de mejora de la calidad asistencial, también en los servicios de radiología.

INFORMATIZACIÓN INTEGRAL DE ENVÍO DE RESULTADOS DE LABORATORIO EN UN ÁREA DE SALUD

C.A. Arenas Díaz, V. Pedrera Carbonell, J.M. Andrés Ferrández, D. Borrego García, J.M. Román Romero y J. Boix Ponsoda
Hospital General de Elda.

P-217**Palabra clave:** Laboratorios, informatización, centralización.

Resumen: Se planteo la necesidad de la informatización integral del envío de resultados de laboratorio en el Área de Salud 17 de la Comunidad Valenciana entre el laboratorio de referencia de Área del Hospital General de Elda los distintos servicios médicos del Hospital, dos Centros de Especialidades y los Centros de Salud del Área.

El objetivo era minimizar el tiempo de respuesta ante la petición analítica y mecanizar e informatizar todo el proceso para hacerlo más ágil y preciso. Las actividades realizadas fueron la centralización del laboratorio programado en un solo punto el Hospital General de Elda, para lo cual hubo que cerrar un laboratorio periférico, la conexión del servidor de laboratorio con todos los servicios médicos del Hospital, los dos centros de especialidades y con los Centros de Salud, (para estas conexiones periféricas se uso la red Arterias de la Conselleria de Sanidad). Se eligió un software y se redacto una hoja de petitorio común estandarizada e informatizada de manera que pueda ser leída de manera automática que la usan todos los facultativos del área. Posteriormente se formó al personal auxiliar administrativo encargado del envío y recepción de los resultados tanto en el Hospital como en los centros de salud. Posteriormente se envió en una primera fase de pruebas los resultados vía electrónica manteniendo el envío en soporte papel mientras se limpaba cualquier problema de funcionamiento del software o formativos del personal. Hubo que realizar en esta fase varios retoques del software para hacerlo más sencillo de utilizar y adaptarlo a las necesidades de los usuarios, también hubo que hacer diferentes actividades formativas específicas con los auxiliares administrativos de Centro de Salud.

Resultados: Una vez implantado el sistema el funcionamiento es muy positivo entregándose los resultados el mismo día de la extracción, que se realiza descentralizada en los Centros de Salud, con lo que el médico de atención primaria dispone de los mismos esa tarde o al día siguiente, al igual que los facultativos de los centros de especialidades, mientras que en el Hospital los resultados se envían a tiempo real también a los servicios. En nuestro caso el sistema ha agilizado el envío y recepción de resultados de las analíticas y simplificado el proceso global permitiendo una mayor comodidad al usuario tanto pacientes como profesionales.

EXPERIENCIA EN LA EXTERNALIZACIÓN DE UN ARCHIVO DE PASIVO DE UN HOSPITAL GENERAL DE ÁREA**P-218**

C.A. Arenas Díaz, M. Bayo Casanova, J. López Moreno, F. Soriano Cano, A. Blasco Peñango y M.J. Martínez Riera
Hospital General de Elda.

Palabra clave: archivo de historias clínicas, externalización, contratos de servicios.

Resumen: Se planteo la externalización del archivo de pasivo del Hospital General de Elda que atiende un área de 200.000 habitantes. Los motivos eran: insuficiencia de espacio en archivo actual, necesidad de espacio para actividades asistenciales, mala ubicación del mismo

Objetivos: Desalojar la zona del archivo de pasivo que estaba adosado a un bloque quirúrgico, ganar espacio para actividad asistencial, descargar de trabajo al archivo (ratio de personal muy ajustado), ofrecer garantías de seguridad y confidencialidad para estas historias, gestión más eficiente del archivado de pasivo y de espacios del Hospital. El pasivo que se externalizó consistió en: éxitos, historias sin movimiento en los últimos 5 años, registros de urgencias de más de 5 años sin historia clínica abierta. El sistema de externalización fue mixto: paso a soporte informático de los registros de urgencias y historias de éxitos, manteniendo soporte papel en el resto. Para ello se contó con empresas con experiencia y solventes que pudieran garantizar la seguridad y confidencialidad y de las historias que custodiaban y la calidad de sus instalaciones. Se firmó un contrato en el cual se especificaban todas las cláusulas de seguridad para la custodia de las historias incluyendo las instalaciones donde iban a alojarse (estructura, protección antiincendios, antirrobo, etc.) así como los aspectos técnicos de la misma (tiempo de respuesta ante la solicitud de historia, paso a soporte informático) con unas condiciones económicas.

Resultados: Se consiguió desalojar la zona de archivo de pasivo de las historias a externalizar en 2 meses. Se liberaron 250 m² que se van a acondicionar como Hospital de Día quirúrgico. La gestión de las historias es buena destacando el cumplimiento en cuanto al tiempo de respuesta a la solicitud de una historia: 24 horas ordinarias y urgentes 3 horas. Las historias solicitadas en 6 meses han sido 216 (9 urgentes). Están custodiadas en instalaciones que cumplen scrupulosamente con las normativas vigentes.

Conclusión: La externalización del archivo de pasivo ha sido una buena solución en nuestro centro para ganar espacios, manteniendo la calidad de gestión del mismo.

INDICADORES ECONÓMICOS DE GESTIÓN 2001 DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL SUMMA 061

M.V. Hernández Jaras, C. Jiménez Domínguez, M.A. Pérez Cuevas, C. Infante Rodríguez, A. Cabañas Martínez e I. Segovia Robles

P-219

Palabra clave: Calidad en Atención Farmacéutica. Indicadores de Calidad. Calidad en Servicios Generales.

Objetivo: Presentar los resultados de los indicadores de calidad 2001, del Proceso de Gestión del Servicio de Farmacia del SUMMA061, en el marco del Plan de Adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la nueva norma UNE EN ISO 9001:2000.

Metodología: El Servicio de Farmacia del 061 debe garantizar en todo momento la disponibilidad de los medicamentos incluidos en la Guía Farmacoterapéutica, esto se traduce en una adecuada gestión de stocks.

Entre los indicadores de gestión se seleccionaron dos de tipo económico:

Índice de rotación de stock, calculado como importe de consumo/importe del inventario. Se define un valor estándar próximo a 7.

Ratio consumo/adquisiciones, se define un valor estándar tendente a 1. Las existencias de medicamentos se obtuvieron del inventario mensual a día 21, el consumo de las salidas mensuales registradas en el programa informático diseñado al efecto y las adquisiciones de los albaranes de pedido realizados a los laboratorios farmacéuticos.

Para el cálculo del valor de existencias, consumos y adquisiciones se aplicó la siguiente fórmula (Precio Venta Laboratorio-Descuentos+IVA). El cálculo de los indicadores se hizo al año.

Resultados: El valor obtenido para el índice de rotación fue 5,38. Reduciendo el stock medio un 30% este valor sería de 7,68, cercano al estándar.

El ratio consumo adquisiciones fue de 0,98.

Conclusiones: 1) El valor del índice de rotación muestra que el inventario es superior al deseable, se tiene un gran inmovilizado, sería necesario incrementar el número de pedidos, para poder disminuir el valor del inventario, aproximadamente en un 30%. 2) El ratio consumo/adquisiciones se ajusta bien al estándar, se están comprando prácticamente las mismas unidades que se consumen, por lo que se deben mantener los mismos criterios para el cálculo de las previsiones de consumo.

¿EXISTE UNA PRESCRIPCIÓN DE CALIDAD EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID?

F.J. Cordobes, F.J. Arrieta, M. Villamor, M.J. Calvo, M.P. Saavedra y J.J. Arrieta

P-220

Palabra clave: Prescripción, Fármacos, Hipoglucemiantes, Diabetes Mellitus, Madrid.

Introducción: La diabetes mellitus constituye un problema socio-sanitario de primer orden especialmente por su morbi-mortalidad, secuelas y costes. El mayor coste directo de la diabetes es debida al gasto hospitalario y a los fármacos.

Objetivo: Analizar la prescripción actual y la tendencia de la prescripción de fármacos hipoglucemiantes.

Material y métodos: Base de datos sobre el consumo de numero de envases y coste de antidiabéticos orales e insulinas en la Comunidad de Madrid durante el período 2000-2001. Los datos fueron facilitados por la Subdirección General de Atención Primaria, siendo procesados por el Servicio de Farmacia del Área 4 de Madrid.

Resultados: La prescripción de antidiabéticos orales aumentaron en 194.990.155 pesetas, y de insulinas en 482.059.523 pesetas. El incremento de los antidiabéticos orales ha sido debido fundamentalmente a los insulino-secretagogos con 72.428.145 pesetas, seguido de las sulfonilureas (60.687.749 pesetas), especialmente glimepirida, de biguanidas, y por ultimo de los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Al analizar las insulinas destaca sobre todo el incremento de la insulina lispro que ha supuesto un incremento en un año de 207.050.368 pesetas.

Conclusiones: Existe consumo muy importe de insulina lispro, y de fármacos orales nuevos que desplazan a los existentes. Por tanto se confirma que existe una tendencia a sustituir especialidades más baratas por otras mas caras.

EVALUACIÓN DE LA COBERTURA DE UN PROGRAMA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

P. Artajo Hualde, J. Chamorro Camazón, J. Vidán Allí, P. Arina Elorza, M.J. Espatolero Esparza e I. Lanzeta Vicente

P-221

Palabra clave: Efectividad, Vacuna antigripal, Cobertura.

Introducción: El efecto de un programa de vacunación (efectividad) está condicionado por la propia eficacia de la vacuna y por la cobertura vacunal (CV: porcentaje de población correctamente vacunada). Los indicadores de CV permiten el seguimiento de campañas específicas de vacunación y empiezan a ser utilizados como indicadores de calidad de la práctica clínica (indicadores de resultado).

Objetivo: Evaluar la efectividad del programa de vacunación antigripal en un hospital de tercer nivel a través del estudio de las CVs de las campañas correspondientes a los cuatro últimos años.

Material y método: En septiembre del año 2000 para aumentar la CV se difunde por el Hospital una campaña de vacunación antigripal activa. Una enfermera y un médico del Servicio de Medicina Preventiva y Gestión de Calidad (SMPGC) se desplazaron a las plantas hospitalarias para vacunar a todos aquellos trabajadores que lo solicitaban. Previamente mediante hojas informativas se presentan las ventajas de la vacunación, contraindicaciones y efectos secundarios. Anteriormente los trabajadores se desplazaban a vacunarse al SMPGC. Se analizan los registros nominales de la vacunación antigripal efectuada en el Hospital Virgen del Camino durante los años 1998 al 2001. Para los trabajadores en los que se recomienda la vacunación, por la posible transmisión de la gripe a pacientes de alto riesgo, se realiza un análisis de tendencia lineal mediante la prueba Chi-cuadrado de Mantel-Haenszel.

Resultados:

Cobertura vacunal del hospital:

	1998	1999	2000	2001
4,4%	5,6%	15,7%	16,1%	

Trabajadores grupo de riesgo:

Coberturas	98-2001	χ^2	tendencia	s.e.
Facultativos	4,8% 9,6% 19,2% 19,2%	51.729	p < 0,01	
Enfermería	3,1% 3,3% 13,6% 15,7%	71.811	p < 0,01	
Auxiliares	3,1% 2,4% 11,1% 10,6%	31.591	p < 0,01	
Fisios	14,3% 21,4% 28,6% 35,7%	1.871	p > 0,01	
Celadores	6,7% 8,4% 18,7% 20,6%	12.480	p < 0,01	

Conclusiones: 1) La campaña de captación activa ha producido un importante incremento de la CV. 2) Son necesarias nuevas estrategia en este sentido pues los indicadores alcanzados no son aún óptimos. 3) Pilares básicos para aumentar la CV: aumentar la oferta (que se consigue con la campaña activa), aumentar la demanda mediante la educación sanitaria y disminuir el excesivo temor hacia los efectos secundarios a través de información personalizada.

REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS CENTROS DE SALUD

J.M. Mallo Fernández, C. Granda Menéndez y J. Ferrández Santos

Unidad Calidad Área 11 Ap.

P-222

Palabras clave: Unidad Administrativa, Centro de Salud, Procedimientos, Mejora de la calidad

Objetivos: Evaluar la estructura organizativa de las unidades administrativas (UAAU) de los equipos de atención primaria (EAPs) de un Área sanitaria. Diseñar un modelo homogéneo de procedimientos y actividades según el tipo de usuario objeto de la atención.

Metodología: Análisis descriptivo del total de UAAU de un Área sanitaria (39 EAPs) identificando la situación origen mediante evaluación cualitativa: Utilización de técnicas de observación directa (evaluación presencial), de enfoque por encuesta y entrevista al 100% de las UAAU. Aplicación de un ciclo evaluativo, con detección de oportunidades de mejora mediante técnica de consenso, priorizando las áreas de intervención relevantes para el conjunto del Área.

Resultados: Identificación de 4 áreas problema en fase de análisis: inadecuación de la imagen (forma y contenido) hacia el usuario, desigual percepción del trabajo por el profesional, gestión apresurada del tiempo de atención y heterogeneidad de los modelos organizativos internos. Priorización de los circuitos organizativos en las UAAU, mediante el rediseño de 4 áreas esenciales de intervención: Protocolización sistemática del conjunto de actividades, definición del perfil profesional y adecuación al puesto de trabajo, redistribución organizativa de tareas tanto de "oficina de usuario" (usuario externo) como de "oficina de centro" (usuario interno), y procedimientos rutinarios de control. Intervenciones de forma global para el Área: Diseño de una estructura marco de las UAAU (áreas funcionales, actualización de las actividades y procedimientos operativos de calidad). Intervenciones de forma específica por centro: Normalización de procedimientos de las áreas funcionales prioritarias (opinión del usuario y gestoría) mediante fichas generales con descripción del despliegue de la actividad, normas técnicas del trabajo y fluograma; sistematización del proceso de evaluación (área de gestoría); e implantación de un plan formativo específico adaptado al perfil profesional.

Conclusiones: La actividad de las UAAU, debe responder a criterios de eficiencia organizativa en respuesta a sus clientes potenciales (internos y externos). Priorizar la homogeneidad de procedimientos facilita la aplicación de circuitos de atención externa e interna con reducción de fallos por variabilidad. La resistencia inicial al cambio del profesional se reduce ante los potenciales efectos positivos de su aplicación. Fuente de financiación y conflicto de intereses: (si los hubiese).

APLICACIÓN DE UN REGISTRO DE SÍNTOMAS EN UNA UNIDAD DE CURAS PALIATIVAS. UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL

A. Cortiella Masdeu, P. García Peña, M. Bonet Martí, R. Solé Fortuny, C. Yagüez Rubio y G. de Febrer

P-223

Palabra clave: Registro de control de síntomas, calidad asistencial, cuidados paliativos, atención sociosanitaria.

Introducción: La Unidad de Convalecencia y Curas Paliativas (UCCP) del Hospital Universitario de Sant Joan de Reus consta de 10 plazas de paliativos destinadas a pacientes paliativos. Hace 4 años pusimos en marcha el registro de control de síntomas. La impresión subjetiva es que éste registro nos ha permitido mejorar el control de síntomas de nuestros pacientes.

Objetivos: 1) Valorar el grado de implementación de los registros. 2) Detección y seguimiento de los síntomas más frecuentes en nuestros pacientes. 3) Evaluación de la intensidad de los síntomas al ingreso y al alta. 4) Comparación de los síntomas y su severidad según la procedencia del paciente. 5) Relación de la intensidad de los síntomas con el performance status y grado de autonomía del paciente.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de los registros de control de síntomas de los 88 pacientes paliativos ingresados en la UCCP en el año 2000. En el diseño del registro se utiliza una escala categórica numérica de 0 a 10. Los síntomas se registran de forma periódica y sistemática. Se determina el Índice sintomático: Σ intensidad de los síntomas / nº de síntomas. Se valora si hay diferencia en la intensidad de los síntomas según el performance status (Índice de Karnofsky) y grado de autonomía (Índice de Barthel).

Resultados: 1) Cumplimiento del 80,6% del registro. 2) Los síntomas registrados son: dolor (37%), debilidad (31%), depresión (15%), disnea (7%) y otros (10%). 3) Se observa mejora estadísticamente significativa del Índice sintomático al alta respecto al ingreso ($p < 0,05$). Medias al ingreso y al alta: dolor 5,62 y 3,03; disnea 6 y 3,17; debilidad 6,78 y 5,67; y depresión 6 y 4,44. 4) Los enfermos procedentes del Servicio de Oncología vienen globalmente con mejor control de síntomas.

Conclusiones: 1) Se observa una mejora, estadísticamente significativa, de la severidad de los síntomas de los pacientes paliativos ingresados en nuestra Unidad. 2) La implementación del registro es elevada. 3) Los pacientes con peor performance status y con menor autonomía tienen una mayor severidad de los síntomas. 4) Los cuidados paliativos en los enfermos no oncológicos, posiblemente, aún no está lo suficientemente extendidos. 5) Nuestra hoja de registro de síntomas es una buena herramienta para mejorar la calidad y los síntomas de nuestros pacientes.

MONITORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE GLUTARALDEHIDO FUERA DE LAS ÁREAS QUIRÚRGICAS

R.M. Gil Soto, M.R. Casas i Agut, G. Brieba Capdevila, S. Salvadò Suñé, M. Huguet Mendizábal y N. Cuevas del Pino
Hospital Universitario Sant Joan Unidad Vigilancia.

P-224

Palabra clave: Glutaraldehído, formación, riesgos, prevención exposición.

Introducción: El Glutaraldehído se utiliza solo o en combinación con otros productos para la limpieza, desinfección y esterilización de material delicado y de superficies. Debido a sus excepcionales cualidades, su uso ha aumentado de manera progresiva en los Hospitales pero no así los conocimientos necesarios sobre su utilización y riesgos de su exposición.

Objetivo: Monitorizar la utilización del Glutaraldehído fuera de las áreas quirúrgicas, determinar si su utilización está indicada, detectar las necesidades de formación de los profesionales sobre conocimientos del producto, riesgos de su utilización y prevención de la exposición.

Metodología: Se realiza un estudio descriptivo transversal. Se ha empleado un cuestionario auto-administrado con variables que analizan el proceso de utilización del Glutaraldehído, las normas de seguridad y los riesgos de su utilización. Las áreas en las que se está utilizando el producto, son Pruebas Especiales, Consulta Externa, Sala de Partos, Medicina del Deporte, UCI y Pediatría. La encuesta se pasó a todos los profesionales que utilizaban el producto, tanto en la forma Esporcidia como en la de concentración al 2%, n = 25.

Resultados: El índice de respuesta fue del 92%. En el 16% de las áreas, no era correcta la utilización del producto. Solamente el 33% de los encuestados conoce las características del Glutaraldehído, como, cuando y para qué utilizarlo. El 49% de los profesionales conocen el producto y sus indicaciones pero no las normas de seguridad para utilizarlo. El 25% del personal conoce el producto, conoce las normas de seguridad pero no las repercusiones que el producto puede tener sobre la salud.

Conclusiones: Es necesario informar adecuadamente a los profesionales sobre las características de los productos antes de su utilización y supervisar su implantación. Se tiene que elaborar un protocolo de trabajo para la utilización del Glutaraldehído, y de cualquier agente químico que tenga que ser manipulado por los profesionales. Es necesario realizar una formación adecuada a las necesidades detectadas: los riesgos que entraña la utilización del Glutaraldehído y las normas de seguridad para prevenir accidentes y sensibilizaciones. Está previsto realizar la información y formación de los profesionales durante el mes de junio del 2002. Se presentará el resultado del impacto de la formación en el Congreso.

RESULTADOS DE UNA ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY CATALANA

M. Subirana Casacuberta, Gich Saladichi, J.A. García García, M. Gasull Vilella, M.V. Pacheco Galván, A.I. Ramón Herrera, J.M. Sánchez Segura y F.L. Vilanova Cardenal
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

P-225

Palabra clave: Encuesta, ley de voluntades anticipadas, conocimiento de la ley.

Objetivos: EL 29 de diciembre del 2000, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 21/2000 sobre el dret dinformació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. La Ley tiene por objetivo concretar de forma práctica los derechos de los pacientes en relación a la información y al acceso a la documentación clínica. Con la finalidad de objetivar cuál es el conocimiento de la Ley 21/2000 entre los profesionales del hospital de la Santa Creu i Sant Pau se realiza una encuesta.

Metodología: Desde la Comisión de Documentación e Información del Programa de Promoción y Evaluación de la Calidad Asistencial (ProAQuA), y dentro de las actividades de evaluación de la Guía práctica sobre la Informació i la Documentació a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau se elaboró una encuesta para objetivar el conocimiento de la Ley. La encuesta consta de 18 preguntas, 3 descriptivas de la población, 8 preguntas relacionadas con el contenido de la Ley y 7 que recogen la opinión personal del profesional sobre la Ley y cuál fue la fuente de información que le facilitó el conocimiento de la Ley. La encuesta se distribuyó de forma personal y la respuesta fue anónima.

Resultados: Se seleccionó una muestra aleatoria de 350 trabajadores a los que se les distribuyó la encuesta, de ellos 212 (61%) la contestaron. De los 212 profesionales 61 (29%) eran médicos, 72 (34%) enfermeras y 79 (37%) pertenecían a otros colectivos profesionales (auxiliares, administrativos, trabajadores sociales y otros). El 29% hombres y el 71% mujeres con una media de edad de 40 a 9 años. A la pregunta de quién es el titular de la información el 74% responde que el paciente y sobre quién debe garantizar el derecho de la información el 50% responde que el médico. El 94% afirma que el consentimiento informado debe solicitarlo el médico. En relación a las voluntades anticipadas el 78% conoce cuál es su finalidad y a quién van dirigidas. El 56% afirma conocer la existencia de la Ley.

Conclusiones: Los resultados de la encuesta reflejan que poco más de la mitad de los encuestados, el 56%, conoce de la existencia de la Ley aunque un porcentaje mayor conoce aspectos concretos de su contenido. Los resultados de la encuesta y la monitorización de indicadores relacionados con la aplicación de la Ley nos permitirán conocer si la Guía práctica sobre la Informació i la Documentació a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau cumple con sus objetivos.

¿SOMOS EFICIENTES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS?

J.F. Solsona, M. Riu, X. Castells y R. Balaguer

P-226

Palabras clave: Eficiencia. UCI. Cuidados Intermedios.

Introducción: Los pacientes que ingresan en las Unidades de Cuidados Intensivos(UCI) pertenecen a dos grandes grupos. Unos requieren tratamiento para estabilizar su enfermedad y otros requieren vigilancia, ya que la naturaleza de su enfermedad puede poner en peligro su vida. Habitualmente este último tipo de pacientes requiere una menor proporción de recursos y son ingresados, si el hospital dispone de ellas, en unidades de cuidados intermedios.

Objetivo: Determinar que porcentaje de pacientes que ingresan con propósito de tratamiento (p.e. ventilación mecánica), precisan con su evolución únicamente vigilancia y pueden ser destinados a un nivel menor de recursos.

Métodos: Estudio transversal prospectivo en una UCI de 14 camas. Población de estudio: todos los pacientes ingresados entre octubre 00 y marzo 01. La valoración se hizo mediante un criterio subjetivo (dos médicos adjuntos de la UCI de manera independiente) y uno objetivo el Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score (NEMS), que mide la intensidad de tratamiento en pacientes críticos. Previamente se realizó una prueba piloto durante quince días. El número mínimo de pacientes que se calculó para disponer de una potencia estadística suficiente fue de 120.

Resultados: En este período se recogió información de 2361 estancias correspondientes a 138 pacientes. El índice de concordancia entre los dos médicos fue de 0,85 (Kappa). Según este criterio el 77% de las estancias fueron adecuadas y el 23% podrían haber sido destinadas a un menor nivel de recursos, lo que suponía 372 estancias. De ellas, 287 correspondían a un NEMS < 24 puntos.

Conclusión: En general una proporción del 20% de los pacientes que ingresan en una UCI con propósito de tratamiento pueden ser destinados en una segunda fase a una unidad de menor nivel de recursos, mejorando con ello, la eficiencia del sistema sanitario.

LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ROPA EN UN HOSPITAL TERCARIO

J.A. Ramos Pérez, E. Donderis Folgado, M.F. Saiz Gallego, S. Lucas Valenciano y M.A. Alfayate Bullón
Hospital Universitario La Fe.

P-227

Palabra clave: Gestión por procesos, calidad.

Metodología: Dentro del marco general de implantación del Sistema de Calidad Total y una vez definida la arquitectura de procesos del Área Económica del Hospital Universitario La Fe, se decidió priorizar, entre otros, el Servicio de Gestión de la Ropa y Lavandería para implantar la Gestión por Procesos. Se "encontraron" y definieron tres procesos clave secuenciales: Recogida de Ropa Sucia, Lavado y Procesado de Ropa y Distribución de Ropa Limpia, además de los considerados de soporte y de gestión. Se constituyó inicialmente un Grupo de Proceso multidisciplinar al que se le realizó formación. Se introdujo en el Grupo un experto en Calidad, procediendo a partir de ese momento a la estabilización de los procesos. Se nombró un propietario y se definieron y documentaron la Misión, los límites, las actividades, cadena proveedor-cliente interno, el mapa del proceso, las características de calidad de las actividades, así como indicadores y los recursos necesarios.

Resultados: En esta fase de estabilización del proceso han participado 10 profesionales que han destinado 110 horas de trabajo en equipo. Se ha reforzado el actual sistema de gestión al introducir nuevas responsabilidades en el equipo. Durante esta fase ya se han identificado distintas áreas problema o de mejora del proceso lo que ha servido para corregir y planificar cambios que permiten mejorar su rendimiento.

Conclusiones: La gestión por procesos, aplicada de una manera estructurada, ha permitido la estabilización de un proceso clave dentro de su área. Es de gran interés observar cómo el procedimiento de estabilización en sí mismo, ha permitido la detección de un buen número de áreas de mejora, lo cual, además, posibilita una implantación planificada, en la que se han tenido en cuenta los nuevos cambios destinados a solucionar los puntos débiles del proceso. Asimismo, a través del Grupo de Proceso se puede incidir en importantes cambios del sistema organizativo, de manera que, mediante un adecuado seguimiento de los indicadores, los Procesos de Gestión de la ropa se mantengan en la dinámica de mejora continua.

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INFORMACIÓN POSQUIRÚRGICO

B. Candia Bouso, B. Acea Nebril, S. Jorge Méndez, C. Fernández Blanco, J.M. Couce Santiago y C. Gómez Freijoso
Hospital Juan Canalejo.

P-228

Palabra clave: Información Drenajes Estancia Complicaciones.

Introducción: El Programa de Educación contempla la información a las mujeres postoperadas con cáncer de mama para el correcto manejo de los drenajes. El personal de enfermería de la Unidad de Hospitalización adiestra a la paciente, iniciando la información a las 24 horas de la intervención. Además, se complementa con un tríptico informativo al alta. La retirada de los drenajes se lleva a cabo en la consulta externa tras valorar el débito registrado y anotando por la paciente en su domicilio.

Objetivo: Evaluar el impacto sobre la estancia hospitalaria de un programa de educación en el manejo de los drenajes en enfermas operadas de cáncer de mama.

Material y método: Se diseña un estudio prospectivo antes-después con dos grupos de mujeres: *Antes*: intervenidas por un carcinoma de mama antes del Programa de Educación y, *Después*: intervenidas un año después de dicha actuación. Se excluyen las enfermas intervenidas en régimen ambulatorio. Se analizaron: la repercusión del programa en la estancia media hospitalaria y, las complicaciones quirúrgicas postoperatorias. Se procedió al análisis estadístico con el SPSS v.10.0 Inc, 1999®, y tanto para la comparación de medias como para la comparación de proporciones se establece el nivel de significación en $p < 0.05$.

Resultados: De las 104 mujeres incluidas a estudio, 62 pacientes corresponden al grupo antes de la implantación del Programa de Educación, y 42 al grupo después. La estancia media cuando no se ofrecía educación sobre drenajes fue de 6,06 días (rango: 1-24 días) sin que se registraran diferencias estadísticamente significativas según las técnicas quirúrgicas aplicadas (Tumorectomía y LA: 5,69 días; mastectomía y LA: 6,73 días; mastectomía subcutánea+prótesis: 6,00 días). La estancia media después de la implantación del programa educativo fue de 2,30 días (rango: 1-6 días) con una estancia similar para cada una de las técnicas quirúrgicas (Tumorectomía y LA: 1,83 días; mastectomía y LA: 2,59 días; mastectomía subcutánea+prótesis: 2,00 días). Durante el seguimiento de estas enfermas no se registraron reingresos hospitalarios. Las diferencias registradas en las estancias medias globales y por técnicas quirúrgicas entre ambos grupos fueron estadísticamente significativas. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la aparición de complicaciones entre ambos grupos.

Conclusiones: La información especializada a la enferma, como puede ser la educación en el manejo de los drenajes en mujeres con cáncer de mama posibilita, además de reducir la ansiedad de la paciente, reducir la estancia hospitalaria, sin aumentar las complicaciones ni los reingresos.

INCIDENCIA DE ERROR EN LA LLEGADA DE SANGRE AL RECEPTOR

M. López Soques, M. García Carasuso, J. García Álvarez, F. Solsona Durán, P. Carrasco y P. Garcés Brinquis
Hospital del Mar.

P-229

Palabra clave: Administración, sangre, error, formación.

Fundamentos: En la administración de sangre pueden presentarse errores o desviaciones en distintos puntos del proceso, tanto en la entrega de la sangre como en la asignación al receptor final. Según el Sistema Británico de Hemovigilancia, es fundamental tener un conocimiento epidemiológico del error y de sus características, para tomar las acciones preventivas apropiadas. Uno de los indicadores de calidad a considerar en el proceso de administración de la sangre puede ser la tasa de llegadas de sangre inadecuada al receptor.

Objetivo: Conocer, aprovechando los sistemas de calidad instaurados en un hospital de nivel 3 de 470 camas, las características de la llegada de sangre inadecuada al receptor, y realizar el estudio epidemiológico del error.

Método: Revisar el libro de registro de errores instaurado en enero de 2002 por el Comité de Transfusión.

Resultados: De enero 2000 a junio 2002 se han detectado 8 errores en la llegada de sangre al receptor, 7 respecto a concentrados de hematies homólogos y uno respecto a sangre autóloga. El 50% de dichos errores han tenido lugar en el turno de noche. En el 80% de casos, las personas implicadas han sido expertas, con más de 3 años de experiencia hospitalaria. En la mayoría de casos, dos o más personas estuvieron implicadas en el incidente. En ningún caso de detectó reacción clínica adversa.

Conclusión: La medida preventiva más importante es la formación de personal, enfocada al personal ya experto y no al personal de reciente contratación.

Hemos de exigir la estricta comprobación ABO a la cabecera del paciente. Otras medidas podrían incluir el uso pulseras de identificación, la utilización de sistemas informáticos portátiles a la cabecera del paciente, la duplicación de observador antes de iniciar una transfusión de hematies, y la revalorización de la actividad nocturna, medidas que sin duda contribuirán a disminuir la incidencia de este tipo de errores.

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INFORMACIÓN POSQUIRÚRGICO

B. Candia Bouso, B. Acea Nebril, S. Jorge Méndez, C. Fernández Blanco, J.M. Couce Santiago y C. Gómez Freijoso
Hospital Juan Canalejo.

P-228

Palabra clave: Información Drenajes Estancia Complicaciones.

Introducción: El Programa de Educación contempla la información a las mujeres postoperadas con cáncer de mama para el correcto manejo de los drenajes. El personal de enfermería de la Unidad de Hospitalización adiestra a la paciente, iniciando la información a las 24 horas de la intervención. Además, se complementa con un tríptico informativo al alta. La retirada de los drenajes se lleva a cabo en la consulta externa tras valorar el débito registrado y anotando por la paciente en su domicilio.

Objetivo: Evaluar el impacto sobre la estancia hospitalaria de un programa de educación en el manejo de los drenajes en enfermas operadas de cáncer de mama.

Material y método: Se diseña un estudio prospectivo antes-después con dos grupos de mujeres: *Antes*: intervenidas por un carcinoma de mama antes del Programa de Educación y, *Después*: intervenidas un año después de dicha actuación. Se excluyen las enfermas intervenidas en régimen ambulatorio. Se analizaron: la repercusión del programa en la estancia media hospitalaria y, las complicaciones quirúrgicas postoperatorias. Se procedió al análisis estadístico con el SPSS v.10.0 Inc, 1999®, y tanto para la comparación de medias como para la comparación de proporciones se establece el nivel de significación en $p < 0.05$.

Resultados: De las 104 mujeres incluidas a estudio, 62 pacientes corresponden al grupo antes de la implantación del Programa de Educación, y 42 al grupo después. La estancia media cuando no se ofrecía educación sobre drenajes fue de 6,06 días (rango: 1-24 días) sin que se registraran diferencias estadísticamente significativas según las técnicas quirúrgicas aplicadas (Tumorectomía y LA: 5,69 días; mastectomía y LA: 6,73 días; mastectomía subcutánea+prótesis: 6,00 días). La estancia media después de la implantación del programa educativo fue de 2,30 días (rango: 1-6 días) con una estancia similar para cada una de las técnicas quirúrgicas (Tumorectomía y LA: 1,83 días; mastectomía y LA: 2,59 días; mastectomía subcutánea+prótesis: 2,00 días). Durante el seguimiento de estas enfermas no se registraron reingresos hospitalarios. Las diferencias registradas en las estancias medias globales y por técnicas quirúrgicas entre ambos grupos fueron estadísticamente significativas. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la aparición de complicaciones entre ambos grupos.

Conclusiones: La información especializada a la enferma, como puede ser la educación en el manejo de los drenajes en mujeres con cáncer de mama posibilita, además de reducir la ansiedad de la paciente, reducir la estancia hospitalaria, sin aumentar las complicaciones ni los reingresos.

HACIA LA EXCELENCIA EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO DE UN HOSPITAL TERCARIO

B. Valdiveiso Martínez, A. Bahamontes Mulio, E. Soriano Melchor, V. Ruiz García, V. Renovell y M.D. Rosales
Hospital Universitario La Fe.

P-230

Palabra clave: hospitalización a domicilio.

Metodología: Se introduce como metodología para la mejora en la Unidad de Hospitalización a Domicilio la técnica de "minicompañías" tratando el área como una pequeña compañía en búsqueda de la satisfacción de sus clientes internos y externos con el máximo de eficiencia. Se constituye inicialmente un Comité de Área al que se le realiza formación, se introduce en el Comité a un experto en calidad y se definen misión, visión y valores del área, se identifican sus procesos clave, se elabora la arquitectura de procesos y finalmente se priorizan los procesos clave para iniciar su estabilización. A partir de ese momento se nombran responsables de procesos y se crean grupos para estabilizar e implantar los procesos clave seleccionados - Admisión, valoración e ingreso y atención urgente -. Simultáneamente el Comité de Uhd elabora los procedimientos generales de su sistema de gestión, e inicia labores de gestión a través de reuniones estructuradas y prefijadas, seguimiento de cuadro de mandos y proyectos en marcha.

Resultados: En este proceso han participado 10 profesionales, destinado 250 horas de trabajo en equipo, se ha reforzado el actual sistema de gestión, documentado la misión, visión y valores, elaborado el mapa de procesos, priorizado la implantación de la gestión por procesos, introducido nuevas responsabilidades en el equipo, estabilizado e implantado dos procesos clave importantes en el área, resultados que representan los cimientos y el marco de referencia que nos guiarán el futuro en esta compleja tarea de orientar hacia la excelencia la Unidad de Hospitalización a Domicilio de nuestro Hospital.

Conclusiones: La técnica de minicompañías ayuda de una forma estructurada a reforzar el criterio liderazgo, personas, procesos y resultados. En nuestro caso está permitiendo introducir con rigor cambios en un área asistencial innovadora y en constante crecimiento desde su inicio e iniciar a la vez su transformación organizativa hacia una organización mucho más horizontal y participativa orientada al paciente y donde la gestión clínica y la carrera profesional serán claves de futuro.

CALIDAD DE LA CAPTACIÓN DE CASOS NUEVOS DE CÁNCER BRONCOPULMONAR POR EL REGISTRO DE TUMORES

J.P. García de la Torre, M. Pilas Pérez, F. Colina Ruizdelgado,
C. Enrique González y P. Ruiz López
Hospital Universitario 12 de Octubre.

P-231

Palabra clave: Registro, carcinoma pulmonar.

Objetivo: Evaluar la exhaustividad de la captación de casos nuevos de cáncer broncopulmonar del año 2000 por el Registro Hospitalario de Tumores (RHT) del Hospital 12 de Octubre.

Metodología: Se comparó la población registrada en la topografía C34 (bronquios y pulmón) en RHT con la población tumoral atendida por Neumología que proporcionó una base de datos que incluía todos sus pacientes con el diagnóstico de carcinoma broncopulmonar del año 2000. Las ausencias de caso del RHT en esta topografía fueron nombradas "falsos negativos provisionales". En la documentación clínica de estos casos se analizó la fecha de incidencia (fecha de entrada de primer espécimen con diagnóstico de malignidad en el laboratorio de Anatomía Patológica) para determinar si entre ellos existían casos registrados anteriores al período explorado. 2) Los restantes falsos negativos se buscaron entre los registrados en ese mismo año en otras topografías produciendo un número de "falsos negativos topográficos". 3) En éstos y en los no encontrados se analizó la discordancia en la historia clínica para determinar los "falsos negativos definitivos".

Resultados : Existen 13 falsos negativos provisionales. De estos 13 tumores, 5 constan en RHT pero registrados en 1999. Su fecha de diagnóstico es correcta según comprobación de informe anatopatológico. Otros dos tumores están registrados en el fichero de "prevaleentes" (casos anteriores a 1999). De los 7 casos restantes 5 están registrados en otra localización (por haber sido considerados por RHT como metastásicos de origen desconocido) por lo que son falsos negativos topográficos. El caso restante es considerado falso negativo definitivo ya que no consta en Registro.

Conclusión : El índice de captación del RHT es del 97,8% (índice de falsos negativos en RHT 2,2%), admitida como "gold standard" la base de datos de Neumología. No obstante este índice puede ser menor si tras una revisión de sus casos por el Servicio de Neumología se descubre algún diagnóstico no concluyente respecto de las discordancias entre tumor primario o tumor metastásico pulmonar observadas en los 5 falsos negativos topográficos y si se comprueba posible alta incorrecta en su base de datos.

PÓSTER VIII**Gestión de procesos**

Sala Navarra
Jueves 10 y viernes 11

GESTIÓN DE LA DEMANDA DE UNA UBA EN ATENCIÓN PRIMARIA

M.A. Nadal Bonet, E. Cano del Olmo y C. Aguilar Martín
SAP Terres de L'Ebre.

P-232

Palabra clave: Gestión, demanda, actividad asistencial, atención primaria.

Objetivos: Conocer la actividad asistencial de una UBA de un CAP. Detectar una oportunidad de mejora que permita con los mismos recursos y personas dar respuesta al aumento progresivo de la demanda.

Metodología: *Diseño:* Estudio descriptivo transversal. *Ámbito de estudio:* Atención Primaria. *Sujetos:* 432 usuarios atendidos en una consulta de medicina general y enfermería durante la semana del 15 al 19 de abril, del presente año 2002, en horario asistencial. *Mediciones:* La fuente de información son los datos obtenidos del SIAP reinformados por cada profesional. Se estudian: edad, sexo, día de la semana (de lunes a viernes), profesional, motivo de consulta (necesidad de asistencia o necesidad administrativa), tipo de visita (cita previa, espontánea, programada, domicilio y recetas de crónicos) y si la demanda es previsible o no.

Resultados: La edad media de los usuarios atendidos es de 60 años y de ellos, un 56% son mujeres. El día de la semana con mayor actividad es el lunes con un 27%. De toda la actividad asistencial registrada un 77,3% ha sido realizada por medicina general y un 22,7% por enfermería. Dentro de la actividad de enfermería: un 100% es por demanda asistencial, un 81% es visita programada y un 91,8% es previsible. Dentro de la actividad del médico se ha observado que solamente un 35% son demandas asistenciales frente al 64,4% de demandas burocráticas y de éstas a su vez, un 93,4% son recetas de crónicos; Que según el tipo de visita, un 25,4% son cita previa, un 15% son visitas espontáneas o incidencias, un 0,3% son programadas, un 0,6% son domicilios y un 58,1% son recetas de crónicos; Que un 67,1% es previsible que de las visitas tipo cita previa y espontáneas, un 89,7% y un 10,3% respectivamente serían previsibles.

Conclusiones: Mayor actividad asistencial, desde el punto de vista cuantitativo, por parte del médico. Las características de la demanda de la consulta de enfermería permiten una mayor organización de la actividad asistencial. Excesiva burocratización de la consulta del médico y escasa consulta programada, a pesar de un número relevante de visitas previsibles. Serían oportunidades de mejora disminuir la actividad burocrática y aumentar el número de visitas asistenciales y programadas por parte del médico. Para una adecuada gestión de los circuitos es preciso conceptualizar los procesos y adaptar los conceptos a cada realidad concreta, de manera que cada actividad se realice en el lugar y por parte del profesional que resulte más eficiente.

OPTIMIZACIÓN RECURSO CAMA A TRAVÉS DE LA REINGENIERÍA DE PROCESOS

M.A. Solera Requena, E. Gomez Gutierrez, C. Hernández Crespo, C. Trescoli Serrano, T. Quiros Morato y D. Cuesta Peredo
Hospital de la Ribera.

Palabras clave: Cama, monitorización, reingeniería, optimización recursos.

Introducción: El Hospital de la Ribera a finales de 1999 tiene planteados los problemas:

Hospital con índice actividad alto.

Índice ocupación > 98%.

Probleática diaria para ajustar ingresos.

Objetivo de mantener lista de espera a hospitalización = 0.

Objetivo: Optimización/adecuación recurso cama, agilizando ingreso del paciente, minimizando tiempos de espera, aumentando la capacidad del hospital para hacer frente a necesidades de áreas asistenciales.

Metodología: Se rediseñan los procesos de gestión de camas y se crea una unidad específica para gestión. La unidad establece la creación de herramientas de trabajo (monitorización de previsión de actividad/día siguiente, y monitorización de gestión diaria), que facilitan la actividad del servicio, y a su vez tiene un control exhaustivo de la ocupación del centro. Mantiene continua comunicación con las plantas de hospitalización. De manera que ante un aumento de ingresos urgentes, no previsibles, permite modificar la planificación del día optimizando: ingreso del paciente, recurso cama, y distribución del centro.

Estas herramientas, preveen, en función de las características del hospital hoy, la ocupación de mañana. La primera de las herramientas es la hoja comando previsión de ingresos/altas, del día siguiente. Esta contempla por una parte los ingresos programados junto con una media de ingresos urgentes (25/diarios), que se basa en un análisis retrospectivo de actividad de ingresos urgentes, y por otra parte la previsión de altas de las plantas del centro, añadiéndole factor de corrección, establecido también por análisis retrospectivo de actividad. De esta manera se establece y se prevé la situación y ocupación del día siguiente. La segunda herramienta es la hoja comando diaria. Contempla por un lado los ingresos programados, conocidos del día anterior, junto con situación real de ingresos urgentes, que se establecen de forma horaria, permitiéndolos establecer modificaciones y replanificar de nuevo, la ocupación.

Resultados: Previsión ocupación mediante monitorización. Planificación ingresos programados. Agilidad asignación de camas.

Conclusiones: a) Uso eficaz recurso cama. b) Disminución espera en ingreso. Capacidad de reacción en cuanto a ocupación disponible. c) Conocimiento constante de ocupación del centro. d) Flexibilidad de la disponibilidad en base a la ocupación del centro.

P-233

COSTE POR PACIENTE EN SERVICIOS HOSPITALARIOS

H. Robledo y K. Moreno
Universidad Pública de Navarra

Palabras clave: Coste, paciente, GRD, metodología.

Objetivo: Nuestra comunicación tiene por objeto contrastar a través de una aplicación práctica la distorsión que genera el GRD como unidad de gestión para medir los consumos de recursos en hospitales, frente a la objetividad que aporta el cálculo del coste por paciente. Se trata de profundizar en el debate abierto hace ya más de una década sobre la validez de la aplicación del GRD para la gestión hospitalaria frente al posicionamiento en costes mediante el conocimiento del mismo como herramienta de gestión.

Metodología: La metodología empleada se fundamenta en la combinación del sistema tradicional de coste completo (*Full-Cost*) y del sistema de costes basado en las actividades (*Activity Based Costing*), para llegar al coste final por paciente.

Resultados: Los resultados alcanzados han consistido en poder contrastar las diferencias entre el coste por paciente y la imputación de costes mediante los pesos relativos que asignan los correspondientes GRD del servicio quirúrgico objeto del estudio. Este contraste nos permite indagar en las desviaciones que se producen entre los consumos asignados según GRD y el coste por cada una de las intervenciones que agrupa un mismo GRD. Así mismo, hemos analizado las distorsiones que genera la asignación de recursos financieros, a través del Contrato - Programa, utilizando el GRD y la que se derivaría de la utilización del coste por paciente, hallando notables diferencias entre ambas asignaciones. En ambos casos, nuestro análisis se ha realizado con el estudio actualizado a 1999, de los nuevos pesos relativos de los GRD, publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad y Consumo español.

Conclusiones: Nuestro trabajo se ha ceñido a contrastar para una aplicación práctica sobre un servicio hospitalario concreto, utilizando una metodología de costes que asegure un cálculo objetivo, la distorsión que se produce para imputar consumos de recursos entre el empleo de los pesos relativos asignados a los GRD para tal fin y el cálculo del coste real por paciente. Sin duda la toma de decisiones, empleando uno u otro procedimiento, difiere sustancialmente lo que confirma, una vez más, el progresivo abandono del GRD como herramienta de gestión hospitalaria.

P-234

CUADRO DE PROCESOS E INDICADORES DE CALIDAD 2001 DEL SUMMA-061

P. Carrasco Garijo, C. Buey Mayoral, A. Pérez Hernando, M. Garrido Martín, I. Segovia Robles y C. Jiménez Domínguez

Palabras clave: Indicadores de calidad, Gestión por procesos.

Objetivo: Presentar el cuadro de procesos e indicadores de calidad de un Servicio de urgencias y emergencias extrahospitalario.

Metodología: El Área de Calidad junto con los Responsables de las diferentes Áreas del Servicio, han diseñado y elaborado el cuadro de procesos e indicadores de calidad. Dicho cuadro consta de los siguientes apartados:

1. *Proceso:* Identificación del proceso descrito en el Sistema de Gestión de la Calidad. 2. *Propietario:* Responsable del proceso en cuestión. 3. *Indicador:* Definición del indicador de calidad. 4. *Criterio de aceptación:* Límites superior e inferior (Rango) basados en un histórico. 5. *Registro:* Base documental de donde se extraen los datos. 6. *Seguimiento:* Período temporal definido como óptimo en la evaluación de los indicadores.

Resultados: En el SUMMA-061 se han definido 50 indicadores de calidad que monitorizan un total de 20 procesos críticos, de soporte y estratégicos:

1. Gestión de llamadas en el C.C.U. (Centro Coordinador de Urgencias).
2. Coordinación interhospitalaria y traslado secundario.
3. Gestión del Servicio de atención a las emergencias. Transporte primario.
4. Gestión del Servicio de atención Domiciliaria urgente.
5. Gestión de la formación externa.
6. Gestión de la formación interna.
7. Gestión de proveedores y contratistas.
8. Gestión de la facturación de la atención sanitaria.
9. Gestión del mantenimiento de equipos informáticos y de comunicaciones.
10. Gestión del mantenimiento de aparatos electromédicos.
11. Gestión del Servicio de farmacia.
12. Gestión del Parque de vehículos.
13. Gestión de Recursos Humanos.
14. Gestión de quejas y reclamaciones de los usuarios.
15. Gestión de solicitudes de información de los usuarios.
16. Control de los Registros de Calidad.
17. Gestión de incidencias y no conformidades.
18. Gestión de acciones correctivas y preventivas.
19. Medición del grado de satisfacción de clientes y usuarios.
20. Mejora continua.

Conclusiones: 1) La adecuación a la nueva Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 ha supuesto la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la gestión por procesos. 2) Se han establecido los indicadores de calidad 2001 que monitorizan los diferentes procesos y el seguimiento de dichos indicadores supone una fuente de información para la mejora continua.

P-235

EXPERIENCIA DE DOS AÑOS DE GESTIÓN POR PROCESOS ASISTENCIALES DE LA LÍNEA DE PROCESOS TRAUMATOLÓGICOS DEL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DE ADUJAR

J.L. Ruiz Arranz, P. González de la Flor, J. Delgado Ramírez y L. Sánchez Hospital Alto Guadalquivir.

Palabra clave: Proceso asistencial.

Introducción: El Hospital Alto Guadalquivir está organizado en 5 líneas de procesos: Línea de Procesos del adulto, de Procesos Materno infantiles, de Procesos Críticos y Urgentes, Línea de diagnóstico por imagen y Línea de Procesos Traumatológicos. Dentro de esta, se encuadra la actividad de especialistas en Traumatología y Cirugía Ortopédica, en Rehabilitación y Terapia física, y de fisioterapeutas. Esta organización rompe con la estructura tradicional de servicios independientes y permite una gestión por procesos de las patologías más prevalentes de la Línea: sustituciones articulares, patología quirúrgica del raquis dorso-lumbar, patología osteoarticular crónica, cirugía artroscópica de rodilla y hombro, hallux valgus.

Material y métodos: Se realiza un trabajo descriptivo y retrospectivo, evaluando la actividad asistencial de la línea en tres áreas de resultados, consultas externas, quirófano y hospitalización, a lo largo del año 2000 y 2001. Los datos de obtienen del cuadro de mandos, generado por la Unidad de Información del centro, a partir del programa AURORA de SMS.

Resultados:

	2000	2001
Quirófano		
Total Intervenciones	988	935
Índice de utilización	72,4	74,2
Intervención/cirujano	247	234
CMA	476	
Hospitalización:		
Ingresos	423	488
Ingresos urgentes	239	246
Estancia media	4	4,2
Consulta externa (sin rehabilitación)		
Total consultas	17.541	18.359
Primeras consultas	8.780	9.073
Consulta única	5.707	5.783
(Alta resolución)		
Demora media	3 días	3 días

Discusión: Con un índice casuística de 1,85, y una cartera de servicios que solo excluye la patología tumoral, la reimplantación de miembros, la cirugía delplexo braquial, y las graves deformidades raquídeas (escoliosis), la actividad de la Línea ha cumplido durante los años 2000 y 2001 sus objetivos asistenciales. La gestión por procesos asistenciales facilita una asistencia integral y de calidad a nuestros pacientes. Permite evaluar los resultados y facilita mejora continua.

P-236

DEMORA EN EL DIAGNÓSTICO CIERTO DE CÁNCER EN UN HOSPITAL COMARCAL

M. Torres Berdones, F.J. Lameiro Couso y M.S. Nájera García

P-237**Palabra clave:** Demora, cáncer, gestión de procesos.**Objetivos:** Determinar la demora entre el primer contacto con Atención Especializada (AE) y el diagnóstico cierto de cáncer en un Hospital Comarcal**Metodología:** La población se seleccionó de las altas de enero a septiembre del año 2001 cuyo diagnóstico principal era cáncer. Se recuperaron 289 registros, clasificados en 13 categorías según localización tumoral. Se excluyeron los tumores de próstata (por ser frecuente el diagnóstico casual), metastásicos (para recuperar casos nuevos) y otros (por escasos), y se depuraron los segundos ingresos de una misma persona. De los 177 registros restantes se revisaron 154, de los cuales se excluyeron 42 (40 diagnosticados antes de 2001 y 2 por ser el diagnóstico patológico posterior a cirugía). Como primer contacto con AE se consideró la asistencia a una consulta de especialista o a Urgencias por sintomatología que a posteriori resultó ser cáncer. Como fecha de diagnóstico cierto se consideró la fecha en que cada paciente conoció la confirmación anatomo-patológica de su enfermedad, y se tomó como tal la fecha en la que constaba la notificación, o, de no constar, la primera fecha de consulta, o la fecha del alta, tras la biopsia.**Resultados:** Resultaron válidos 112 registros, agrupados en 8 localizaciones; la categoría más abundante contaba 18 casos y la más escasa 7. Globalmente, la demora hasta el diagnóstico, en días, fue: Mínimo: 0; P5: 1,65; P25: 6; P50: 12; P75: 29,50; P95: 81,55; máximo: 185. Por localización, la mediana osciló entre 8 y 24,50 días; el P25 entre 2 y 9,25 y el P75 entre 17 y 49.**Conclusiones:** La mitad de los casos fueron diagnosticados con puntualidad (12 días). Existe un espacio para la mejora en la otra mitad que se demoraron más. Es necesario identificar los determinantes de la espera para corregirlos, por ello resulta imprescindible completar el presente estudio. Tres limitaciones podrían sobreestimar la demora: 1) La definición de la población sólo a partir de altas hospitalarias de cáncer, 2) La definición de la fecha de diagnóstico en el caso de no constancia de la notificación, y 3) La no inclusión de las sospechas descartadas tras biopsia.**GESTIÓN DEL PROCESO ASMA EN CONSULTAS EXTERNAS DE UNA UNIDAD DE ALERGOLOGÍA**

C. Vila, S. Lorenzo, A. Rosado, N. Cabañas, M.D. Alonso Díaz de Durana y M.A. Tejedor

P-238**Palabras clave:** Gestión de procesos, Asma, Alergia.**Introducción:** En la práctica asistencial participan profesionales que plantean pautas de actuación diferente ante una misma patología. La metodología de Gestión por Procesos permite diseñar el proceso de acuerdo con el entorno y los recursos disponibles, normalizando la actuación y la transferencia de información de todo el equipo que participa en el mismo, garantizando eficiencia, efectividad y calidad del servicio.**Objetivo:** Diseño e implantación del proceso ASMA en una Unidad de Alergía. **Ámbito:** Hospital de segundo nivel del Instituto Madrileño de la Salud, con una población de referencia de aproximadamente 400.000 habitantes.**Material y método:** Se elaboró mediante consenso entre los facultativos el diagrama de flujo del proceso clínico ASMA utilizando la metodología de gestión por procesos. Se definieron criterios e indicadores para su monitorización utilizando la guía del Global Strategy for Asthma Management and Prevention Workshop. Se diseñó un formulario informatizado para el registro de la información, a cumplimentar por el facultativo.**Resultados:** Se estableció como primer criterio de mejora asistencial la inclusión del grado de severidad de la patología en el informe de alta del paciente, y una pauta de tratamiento en caso de reagudización para aquellos casos más graves (asma moderado persistente y asma severo). En los primeros 6 meses de implantación del proceso se han incluido 255 pacientes; un 42% fue valorado como asma moderado persistente; y un 2% como asma severo. El 90% de los informes de asma moderado-severo recogía la pauta de tratamiento en reagudizaciones de la enfermedad.**Conclusiones:** La dificultad inicial encontrada para la monitorización de resultados ha sido resuelta parcialmente con el formulario desarrollado en la Historia Clínica Electrónica. El seguimiento desigual por los facultativos de la Unidad (80%) ha dificultado la implantación del proceso. Pensamos que la distribución de los resultados obtenidos a todos los facultativos facilitará la implicación de toda la unidad en el proyecto, y nos permitirá establecer estrategias comunes de actuación. Esta iniciativa abre la posibilidad de inclusión de nuevos indicadores para monitorizar otros criterios de calidad que contemplan actividades de otros profesionales implicados en el mismo.**PROCESO DE CUIDADOS PALIATIVOS: EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN**

C. Alba Fernández, M.M. Sanz Pérez, R. Oliveros Valenzuela, M.J. Cuadros Gómez, C. Rojano Colino y V. Santana López

P-239**Palabra clave:** Gestión por procesos; implantación.**Resumen:** El sistema sanitario público de Andalucía ha elegido el modelo de Gestión Por Procesos para abordar la atención sanitaria de los andaluces. Este modelo de gestión se basa en una serie de principios como orientar la organización a satisfacer las necesidades del paciente, agrupar los pacientes según requerimientos comunes, descentralizar los servicios sanitarios tanto como sea posible, extender la flexibilidad y polivalencia de los puestos de trabajo, simplificar y eliminar las actividades que no añaden valor, promocionar la autonomía y responsabilidad de los profesionales y asegurar la continuidad de la asistencia. En estos momentos, la estrategia de Gestión Por Procesos afronta la etapa decisiva de su implantación.

El proceso de cuidados paliativos ha sido considerado en nuestra organización un proceso clave a implantar durante el año 2002.

Metodología: Para la implantación de este Proceso se ha elegido la estrategia siguiente:

- constitución del equipo de implantación del Proceso.
- elección del responsable de Proceso
- elaboración de un cronograma de trabajo.
- análisis del documento que describe el proceso.
- identificación de puntos débiles y áreas de mejora.
- identificar indicadores de proceso.
- establecimiento de planes de mejora

Objetivo: Implantar el Proceso de Cuidados Paliativos en el Hospital Alto Guadalquivir.**Resultados y conclusiones:** En el último trimestre del año se publicará en el Cuadro de Mando de Proceso los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores a medir, así como el análisis de las áreas de mejora a introducir para 2003.**GESTIÓN DEL PROCESO ASMA EN CONSULTAS EXTERNAS DE UNA UNIDAD DE ALERGOLOGÍA**

C. Vila, S. Lorenzo, A. Rosado, N. Cabañas, M.D. Alonso Díaz de Durana y M.A. Tejedor

P-238**Palabras clave:** Gestión de procesos, Asma, Alergia.**Introducción:** En la práctica asistencial participan profesionales que plantean pautas de actuación diferente ante una misma patología. La metodología de Gestión por Procesos permite diseñar el proceso de acuerdo con el entorno y los recursos disponibles, normalizando la actuación y la transferencia de información de todo el equipo que participa en el mismo, garantizando eficiencia, efectividad y calidad del servicio.**Objetivo:** Diseño e implantación del proceso ASMA en una Unidad de Alergía. **Ámbito:** Hospital de segundo nivel del Instituto Madrileño de la Salud, con una población de referencia de aproximadamente 400.000 habitantes.**Material y método:** Se elaboró mediante consenso entre los facultativos el diagrama de flujo del proceso clínico ASMA utilizando la metodología de gestión por procesos. Se definieron criterios e indicadores para su monitorización utilizando la guía del Global Strategy for Asthma Management and Prevention Workshop. Se diseñó un formulario informatizado para el registro de la información, a cumplimentar por el facultativo.**Resultados:** Se estableció como primer criterio de mejora asistencial la inclusión del grado de severidad de la patología en el informe de alta del paciente, y una pauta de tratamiento en caso de reagudización para aquellos casos más graves (asma moderado persistente y asma severo). En los primeros 6 meses de implantación del proceso se han incluido 255 pacientes; un 42% fue valorado como asma moderado persistente; y un 2% como asma severo. El 90% de los informes de asma moderado-severo recogía la pauta de tratamiento en reagudizaciones de la enfermedad.**Conclusiones:** La dificultad inicial encontrada para la monitorización de resultados ha sido resuelta parcialmente con el formulario desarrollado en la Historia Clínica Electrónica. El seguimiento desigual por los facultativos de la Unidad (80%) ha dificultado la implantación del proceso. Pensamos que la distribución de los resultados obtenidos a todos los facultativos facilitará la implicación de toda la unidad en el proyecto, y nos permitirá establecer estrategias comunes de actuación. Esta iniciativa abre la posibilidad de inclusión de nuevos indicadores para monitorizar otros criterios de calidad que contemplen actividades de otros profesionales implicados en el mismo.**EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS ANDALUCES SOBRE EL PROCESO ASISTENCIAL DE LA DIABETES**

M.A. Prieto Rodríguez, M.J. Escudero Carretero, I. Fernández Fernández, J.C. March Cerda, M. Hernán García y E. Fernandez de la Mota Escuela Andaluza de Salud Pública.

P-240**Palabras clave:** Expectativas, Diabetes, Proceso asistencial.**Objetivo:** Conocer las expectativas de los ciudadanos andaluces sobre el proceso asistencial de la diabetes.**Metodología:** Se ha utilizado un abordaje cualitativo basado en grupos focales. Se han realizado 4 grupos: 2 con diabéticos tipo 1 y familiares y otros 2 grupos con diabéticos tipo 2 y familiares. La información ha sido analizada mediante análisis de contenido y sistematizada en cinco áreas: proceso asistencial experimentado, vivencia de la enfermedad, calidad percibida y expectativas en relación a los centros de salud, a las consultas de los endocrinistas, al resto de la atención especializada, a las unidades de hospitalización y en relación también con los servicios de urgencias.**Resultados:** Accesibilidad.

Acceso preferente en citas médicas por enfermedades comunes y para obtención de medicación y material para el control.

Atención en el mismo día y carnet de diabetico.

Teléfono 24 horas para resolver dudas.

Cita única y coordinada de pruebas complementarias.

Coordinación de la cita de pruebas complementaria y de consulta médica. Posibilidad de obtener una cita con el endocrino cuando el paciente lo necesite.

Comunicación.

Más información sobre avances y nuevos tratamientos.

Que los profesionales informen sin prisas, que les permitan (y preguntén) hablar sobre sentimientos y miedos.

Que se interesen por los aspectos psicológicos.

Que cuiden la forma de dar la noticia del diagnóstico.

Actividades grupales.

Competencia.

Un profesional especializado en diabetes en cada centro de salud.

Médicos y pediatras con conocimientos suficientes para saber qué hacer en las situaciones problema.

Que los médicos de cabecera y los endocrinistas se comuniquen entre ellos.

Apoyo y atención psicológica.

Que los profesionales que les atienden en urgencias sean endocrinistas.

Que los historiales de los pacientes estén informatizados.

Que los médicos reconozcan los conocimientos de los pacientes.

DEMORA DESDE EL DIAGNÓSTICO CIERTO DE CÁNCER HASTA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN UN HOSPITAL COMARCAL

F.J. Lameiro Couso, M.S. Nájera García y M. Torres Berdonces

P-241**Palabra clave:** Demora, cáncer, gestión de procesos.**Objetivos:** Determinar la demora entre el diagnóstico cierto de cáncer y el tratamiento quirúrgico inicial en los tumores subsidiarios del mismo en un Hospital Comarcal**Metodología:** La población se seleccionó de las altas de enero a septiembre de 2001 cuyo diagnóstico principal era cáncer. Se recuperaron 289 registros, correspondientes a 13 categorías tumorales. Se excluyeron los tumores de próstata (por ser frecuente el diagnóstico casual), metastásicos (para recuperar casos nuevos), hematológicos (por no ser en conjunto subsidiarios de tratamiento quirúrgico) y otros (por escasos), y se depuraron los segundos ingresos de una misma persona. De los 164 registros restantes se revisaron 141, de los cuales se excluyeron 77 (30 diagnosticados antes de 2001, 29 intervenidos en otro centro, 8 defunciones antes de intervención, 7 no subsidiarios de tratamiento quirúrgico curativo y 3 cuyo diagnóstico anatomopatológico fue casual tras cirugía por enfermedad benigna). Como fecha de diagnóstico cierto se consideró la fecha en que cada paciente conoció la confirmación anatomopatológica de su enfermedad, y se tomó como tal la fecha en la que constaba la notificación, o, de no constar, la primera fecha de consulta, o la fecha del alta, tras la biopsia. Como fecha de tratamiento se tomó la fecha de realización de cualquier procedimiento curativo sobre el tumor diagnosticado, bien por intervención abierta o endoscóptica.**Resultados:** Resultaron válidos 64 registros, agrupados en 6 localizaciones; la categoría más abundante contaba 17 casos y la más escasa solamente uno. Globalmente, la demora hasta la intervención, en días, fue: Mínimo: 1; P25: 9,25; P50: 12; P75: 21; máximo: 91. Por localización, la mediana osciló entre 10 y 21,50 días; el P25 entre 6,25 y 14,25 y el P75 entre 12,25 y 37,75.**Conclusiones:** La mitad de los casos fueron intervenidos con puntualidad, y tres cuartas partes de los mismos dentro de un plazo razonable. No obstante, existe un importante espacio para la mejora en el resto, por ello conviene completar el presente estudio para identificar los determinantes de la espera y corregirlos. Aunque sólo se analizaron 6 categorías tumorales de las 13 definidas, las conclusiones podrían generalizarse al resto por estar implicados los mismos servicios clínicos que tratan los tumores no representados.**VÍA CLÍNICA EN LA PANCREATITIS AGUDA. REPERCUSIÓN EN LOS INDICADORES CLÍNICOS**E.M. Alonso Fernandez, M.A. Leciñena, A. Cenarro, J. Roca, J.A. Martínez y F. García
*H. Can Misses.***P-242****Palabra clave:** TC, pancreatitis aguda, parámetros analíticos, índices de gestión hospitalaria.**Objetivos:** Desarrollar un circuito multidisciplinario médico-radiológico-quirúrgico que permita evaluar precozmente la gravedad del episodio pancreático. Evaluar la capacidad pronóstica del T.C frente a las escalas clínico-analíticas habituales. Implicar a médicos y administrativos en aportar la suficiente información para asignar correctamente el correspondiente GRD.**Metodología:** Estudio prospectivo de 313 pacientes, desde 1990-2001. Se clasificaron en leves 252 (81%) y graves 61 (19%), según la clasificación de Atlanta. Evaluamos la gravedad según las escalas de Ranson y Apache II. Utilizamos las clasificaciones tomográficas de Balthazar: grado e índice CT, y la clasificación quirúrgica de Van Kemmel. Indicadores clínicos: estancia hospitalaria, UCI, mortalidad y cirugía. Estudio uni y multivariante mediante análisis lineal discriminante.**Resultados:** Mortalidad 17/313 (5,43%). Cirugía 33/313 (10,54%). Distres respiratorio 39, (63,9%), sepsis 48, (78,7%), shock 29, (47,5%), e insuficiencia renal 37 (60,7%). La edad, el sexo, la etiología, el índice pancreático, la escala de Ranson ni de Apache II se correlacionaron con la mortalidad. El índice de Balthazar tampoco obtuvo significación estadística. Sólo la clasificación quirúrgica de Van Kemmel y el número de órganos afectados en el fallo multisistémico resultaron estadísticamente significativos ($p < 0,01$). Tras análisis discriminante lineal, la asociación de Ranson > 4, Apache > 8, índice de Balthazar > 4, y 4 órganos afectados por fallo multisistémico obtuvieron valor predictivo estadísticamente significativo para mortalidad. La estancia media fue notablemente inferior respecto a su grupo : 11,43 días/22,80 hasta 1998. Desde 1999, 10 días frente a 22,84 de su grupo. La implicación del personal administrativo contribuyó a una mayor calidad de los datos del informe de alta y de la codificación-GRD definitivo.**Conclusiones:** La determinación de la escala de Ranson junto con los índices tomográficos pueden orientar la gravedad del proceso y estimar adecuadamente la estancia hospitalaria y el tratamiento más precoz e idóneo en cada caso.**GESTIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO**C. Lema Devesa, J. Mariñas Dávila, J. Díaz Terrón, B. Candia Bouso, I. Vázquez López y S. Jorge Méndez
*Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo.***P-243****Palabra clave:** AIT, estancia media, hospitalización.**Objetivo:** El accidente isquémico transitorio (AIT) se caracteriza por la presencia súbita de un déficit neurológico que frecuentemente requiere ingreso hospitalario. En este estudio hacemos un análisis descriptivo de la hospitalización por AIT en nuestro centro en los últimos 5 años considerando la variabilidad de la práctica clínica.**Material y métodos:** Hemos utilizado los datos del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) a través del Sistema de Información de Análisis Complexos de Hospitalización de Agudos (SIAC-HA) del Servicio Galego de Salud (SERGAS) y los de la Unidad de Codificación Clínica del Complejo Hospitalario Juan Canalejo. Estudiamos los años 1997 al 2001 inclusive. Se realiza un estudio descriptivo univariante de variables de interés: episodios, edad, reingresos, factores de riesgo, pruebas diagnósticas, tratamientos y su asociación bivariante con la estancia media, utilizando el paquete estadístico SPSS.**Resultados:** En el periodo estudiado hubo 820 episodios correspondientes a 4346 estancias de 753 pacientes con una media de edad de 56,4 años; la estancia media fue 5,3 días. Se ha realizado tomografías computarizadas (TC) en 814 episodios, resonancias magnéticas (RM) en 357, ecocardiogramas en 782 y doppler de troncos supraaorticos en 756. Tuvieron reingresos por la misma razón 67 pacientes con una edad media de 62,4 años. Padecían diabetes mellitus 347 pacientes y 531 tenían hipertensión arterial. La estancia media de los pacientes con factores de riesgo fue 7,32 frente a 4,75 de los que no los tenían. Los pacientes a quienes se les realizó duplicidad de pruebas de neuroimagen (TC y RM) tenían una estancia media de 8,6 frente a 4,89 de los pacientes a los que se le realizó una de ambas técnicas.**Conclusiones:** La hospitalización por AIT supone un importante consumo de estancias y pruebas complementarias. Es deseable que se potencie la disminución de la variabilidad en la práctica clínica y las alternativas a la hospitalización tradicional (hospital de día, hospitalización domiciliaria) para el manejo de este proceso.**APLICACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN UN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN MÉDICA**J. Castilla Herrero, L.A. Sánchez Muñoz, C. Pascual Navajas, M. Blasco Ros, M.A. Torralba Cabeza y F. Sanjuán Portugal
*Fundación Hospital Calahorra, Dirección Área Médica.***P-244****Palabras clave:** Gestión por procesos, Hospitalización.**Resumen:** La Gestión por Procesos (G.P.) es una herramienta que permite, de forma ordenada y flexible, localizar, definir, implantar y mejorar los flujos de trabajo de una organización.**Material y métodos:** Siguiendo la metodología E.F.Q.M., el Área Médica de la Fundación Hospital Calahorra, ha diseñado el Proceso de Hospitalización Médica, con el fin de sistematizar todas las actividades propias de la hospitalización, adecuarlas a las necesidades de nuestros clientes, reducir las bolsas de inefficiencia y mejorar la interrelación con otros servicios proveedores del hospital. El proceso fue sometido a un periodo de consulta y auditoria de estabilización, que ha permitido unificar criterios y localizar áreas de mejora. La implantación tuvo lugar en Enero de este año.**Resultados (enero-abril de 2002):** Los primeros indicadores del proceso son: EM depurada 6,3 días; ocupación 62%; exodus 6%, altas voluntarias 0,2% (1); ulceras intraunidad 0%; caídas 0,2% (1); fugas 0%; satisfacción global de los usuarios 4,3 (sobre 5); proyectos de mejora obtenidos 2, relacionados con la información.**Conclusiones:** La G.P. permite conocer a fondo nuestra actividad, orientar el esfuerzo de todos hacia un mismo fin, evitar disfunciones y deficiencias, facilita la resolución de problemas y puede ser útil para incrementar la calidad percibida por el usuario.

PROCEDIMIENTOS HEMODINÁMICOS Y GÉNERO. ANÁLISIS DE LA REGIÓN HOSPITALARIA GRANADA-ALMERÍA

J.L. Navarro Espigares, A. Ortega Monfulleda, M.A. Padial Ortiz, P. González de la Flor y E. Hernández Torres
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

P-245

Palabra clave: Procedimientos Hemodinámicos.

Antecedentes: El objetivo de este trabajo es el estudio de la actividad de hemodinámica desarrollada en la región hospitalaria Granada-Almería. Este análisis se centra especialmente en el origen geográfico y sexo de los pacientes. Trataremos de determinar si existen unos patrones de comportamiento distintos respecto a la decisión de derivar a un paciente para la realización de un procedimiento cardíaco percutáneo en función de su lugar de residencia, así como la existencia de diferencias entre sexos para los distintos indicadores de actividad.

Métodos: El ámbito funcional se ha limitado al estudio de los GRDs 112, 808, 124 y 125 que recogen la totalidad de las intervenciones percutáneas cardíacas tanto diagnósticas como terapéuticas. El ámbito geográfico de nuestro estudio comprende la población de las ciudades de Granada, Almería y una parte de Jaén, aproximadamente 1.281.403 habitantes dependientes del Hospital Universitario Virgen de las Nieves para la realización de este tipo de procedimientos. El ámbito temporal recoge los años 1998, 2000 y 2001. La fuente de datos utilizada ha sido el CMBD del hospital durante los años señalados y su agrupación por GRDs. El análisis estadístico se ha centrado en la búsqueda de diferencias significativas entre hombres y mujeres, así como entre los distintos orígenes geográficos.

Resultados: El número total de pacientes tratados en el H.U. Virgen de las Nieves ha experimentado un notable aumento entre 1998 (809 pacientes) y el año 2001 (1.127 pacientes). Al mismo tiempo que aumentaba la oferta, la demanda superó con creces dicho aumento pasando la demora media en el registro de demanda de procedimientos percutáneos cardíacos de 38 días en diciembre de 1998 a 43 días en diciembre del año 2001. La tasa de frecuentación para los procesos estudiados ha aumentado notablemente en el caso de la población procedente de Almería. Respecto a la diferencia entre sexos se confirma una frecuentación mucho más reducida de las mujeres en este tipo de procedimientos, si bien han pasado de representar el 31% del total de procedimientos realizados en 1998 a un 35% en 2001.

Conclusiones: La utilización de sistemas de información hospitalarios puede ser una buena fuente para el estudio de la demanda hospitalaria. A través del análisis exhaustivo de todos los procesos, se ha detectado un incremento notable de la demanda para la población de Almería. Así como un aumento en el porcentaje de procedimientos en mujeres. Ambas cuestiones pueden ser la base para estudios posteriores donde se analicen la distribución territorial de los recursos y el posible aumento de la tasa de incidencia de la angina estable en mujeres.

RESULTADOS DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA GESTIÓN DE PROCESOS

M. Carreras Viñas

Fundación Hospital Calahorra.

P-246

Palabra clave: Gestión de procesos. Modelo EFQM. Indicadores de procesos. Cuadro de mando

Introducción: La fundación Hospital Calahorra, está realizando la puesta en marcha del Modelo de Gestión de calidad de la EFQM, para poder llevar a cabo este proyecto se propuso como objetivos entre otros: Qualificar a un conjunto de responsables de F.H.C. para que dirijan y lideren el desarrollo de un modelo de gestión moderno, basado en la referencia del modelo de E.F.Q.M. Definir y poner en marcha un conjunto de procesos clave estructurados y gestionados en base a principios de calidad. Desarrollar los Cuadros de mando de los procesos clave de F.H.C.

Metodología: Para desarrollar el trabajo se realizaron sesiones de formación al equipo directivo en Modelo Europeo de Excelencia. Se realizó el desarrollo de factores críticos de éxito y mapa de procesos de la Fundación. Se llevaron a cabo sesiones de trabajo conjunto con el equipo directivo para aprobar mapa de procesos y procesos clave. Se desarrollaron sesiones de trabajo para seleccionar procesos de desarrollo inicial y equipos de trabajo y se llevó a cabo la formación en Modelo Europeo de Excelencia a los equipos.

Resultados: Hasta el momento actual los resultados obtenidos han sido los siguientes: Se han realizado las siguientes acciones. a) Misión y Visión de FHC revisadas y aprobadas. b) Descripción del mapa de procesos de FHC. c) Un total de 24 procesos en desarrollo, de los cuáles: 21 han sido aprobados por el equipo directivo y ya han sido implantados. d) Un conjunto de aproximadamente 50 personas formadas en diseño e implantación de procesos. e) 21 equipos de procesos, con un total de 50 personas estructurando y poniendo en marcha procesos. f) Obtención y monitorización de indicadores de los procesos implantados. g) Puesta en marcha de acciones de mejora. h) Descripción del cuadro de mandos de la organización.

Conclusiones: La puesta en marcha del Modelo de Gestión de Calidad total de la E.F.Q.M. ha mejorado la organización de la institución, la coordinación entre unidades y nos ha permitido obtener un cuadro de mandos integral basado en la gestión de la calidad.

ESTRUCTURA DE PROCESOS DENTRO DE UN PLAN DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

J. San Miguel San Martín, M. Boqué Cavallé, M. Cruz Román, F. Oliver Robres, A. Palau Galindo y D. Villarreal Benítez

P-247

Palabra clave: Procesos.

Resumen: El Grupo Sagessa como empresa proveedora de servicios sanitarios, ha adoptado el modelo EFQM como modelo de excelencia en calidad total. Dentro del proceso de mejora continua del Equipo de Atención Primaria (EAP) de el área Básica de Salud (ABS) Reus-V adoptamos la gestión por procesos siguiendo el criterio número 5 del EFQM.

El primer paso era conocer y desarrollar la estructura de procesos de nuestra ABS, para ello el grupo de calidad del EAP, siguiendo la metodología clásica de evaluación y mejora continua de la calidad, detectó 102 oportunidades de mejora, como consecuencia de la actividad en nuestro centro, estos procesos se resumen de la siguiente manera: 1) Atención al Cliente: 10 procesos. 2) Consulta: 8 procesos. 3) Circuitos y derivaciones: 5 procesos. 4) Dirección y gestión: 6 procesos.

Tras priorizar los procesos más importantes obtuvimos el siguiente mapa de estructura de procesos de nuestra ABS:

Procesos clave: 1) Información al cliente. 2) Gestión de visitas. 3) Consultas: actividades preventivas, programadas, técnicas y burocráticas.

Procesos estratégicos: 1) Voz del cliente. 2) Gestión de agendas. 3) Implicación, formación y calidad. 4) Trabajo en equipo. 5) Gestión de presupuestos, recursos humanos e información. 6) Relaciones institucionales. 7) Liderazgo y seguimiento.

Procesos de apoyo: 1) Almacén administrativo. 2) Mantenimiento administrativo. 3) Prestaciones sanitarias. 4) Teléfono. 5) Circuitos: pruebas complementarias, derivaciones y correo. 6) Mantenimiento y reposición de consultas. 7) Programa informático OMI-AP. 8) Burocracia.

Este mapa de procesos ha supuesto la implicación de todas las personas el EAP en la gestión de calidad del centro, al conocer con definición las actividades llevadas a cabo y plantear soluciones concretas a las oportunidades de mejora.

OPTIMIZACIÓN DE LA SOLICITUD ANALÍTICA DE PRUEBAS REUMÁTICAS MEDIANTE UN CÁTALOGO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CONSENSUADO

M.A. Losa Ciganda, M.J. García Sánchez, M.I. Abad Becquer, I. García Martín, R. Pérez Albert y C. Pérez Sánchez
Laboratorio C.E.P. Carabanchel.

Palabra clave: Consenso interniveles, optimización solicitud analítica, pruebas reumáticas.

Objeto: Analizar el grado de implantación del Catálogo Básico de Pruebas Diagnósticas consensuado por una comisión paritaria entre Profesionales de Atención Primaria y Laboratorio, a través de la información clínica aportada en la solicitud analítica de Pruebas Reumáticas.

Método: Se revisan las 1.149 solicitudes de "Pruebas Reumáticas" recibidas durante tres meses consecutivos, clasificándolas en los cuatro grupos siguientes según el médico solicitante consigne ó no datos clínicos y/o diagnóstico presuntivo: A) No conste ningún dato; B) Diagnóstico no relacionado con las Pruebas solicitadas; C) Información de "control", "estudio" ó "revisión" sin mayor especificación ; D) Peticiones que cumplen las indicaciones del Catálogo , con indicación de diagnóstico/patología relacionado.

Resultados: En 44,8% de las peticiones no se consigna ningún dato (grupo A). Los grupos B y C representan 22% y 5% respectivamente. Solamente el 28,2% de las peticiones cumplen los requisitos del Catálogo (grupo D), siendo los datos clínicos/diagnósticos consignados: "artritis, artralgias, reumatismo" (19%); patologías estreptocócicas "amigdalitis ,faringitis, sinusitis..." (1,5%) síndrome constitucional; y/o astenia (5%) y patologías autoinmunes (Sjögren, Raynaud...) (0,5%).

Conclusiones: 1) El número de volantes de petición el los que no consta orientación/indicación diagnóstica alguna es similar en caso de solicitud de pruebas sujetas a protocolo de laboratorio que cuando son de "acceso libre" en Atención Primaria. 2) Se observa cierta contención a la hora de utilizar diagnósticos de tipo; control; revisión; o estudio; 3) Solamente la tercera parte de los volantes de petición son cumplimentados correctamente en cuanto a incorporar alguna indicación diagnóstica. 4) Es evidente que los médicos de Atención Primaria consideran innecesario incluir en la petición información clínica sobre el paciente. Este hecho podría deberse a que las "guías de uso" de estas pruebas, no han sido realmente consensuadas con los todos los clínicos, lo que dificulta que sean seguidos mayoritariamente por los médicos de Primaria.

VALORACIÓN POR ATENCIÓN PRIMARIA DEL INFORME DE ENFERMERÍA AL ALTA ESTANDARIZADO A LA PERSONA OSTOMIZADA

A. Jerónimo Fernández, C. Martín Almendros, I. Mingorance Aguilar, M.D. Navarro Ortiz, A. Ayala Muñoz, E. Abad Corpa y C. Pérez López
Hospital Morales Meseguer Servicio de Farmacia.

Palabra clave: Informe de Enfermería al Alta; Estomaterapia; Continuidad de cuidados

Antecedentes: El informe de enfermería al alta (IEA) está considerado como una herramienta útil para asegurar la continuidad de cuidados entre niveles asistenciales. Esta utilidad se vuelve casi imprescindible en situaciones como el alta de una persona ostomizada debido a la complejidad en asumir el auto-cuidado. Tras elaborar un IAE estandarizado debemos siempre asegurarnos de su utilidad real.

Objetivo: Conocer la opinión de la enfermería de Atención Primaria (AP) sobre el IAE del paciente ostomizado.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal. Población y Medio: Todos los Diplomados en Enfermería de los Centros de Salud adscritos al área de nuestro hospital. Durante el mes de mayo del 2002, se enviaron 110 encuestas que valoraban la utilidad, los contenidos y los circuitos de envío del informe mediante preguntas abiertas y cerradas. Análisis: Estadísticas descriptivas y análisis de contenido sobre las sugerencias propuestas.

Resultados: De las 110 encuestas se recibieron 49 (44,5%). Los enfermeros habían trabajado una media de $18,6 \pm 9,1$ años (Atención primaria durante $11 \pm 6,4$ años). El 39,6% no utiliza diagnósticos de enfermería en su práctica. El 95,8% considera útil para su trabajo el IEA propuesto. Aunque la formulación de los diagnósticos, la valoración del estoma y las recomendaciones son consideradas muy adecuadas (91,8%, 95,8% y 91,7% respectivamente) la valoración de la educación sanitaria sólo es considerada como adecuada por el 14,9%. El circuito actual de envío (paciente y fax a los centros inter-conectados) es considerado como adecuado por el 85,3% aunque se propone el envío de los informes por fax a "todos" los centros, el contacto telefónico con el enfermero responsable y el correo electrónico. Aunque el 43,9% no aporta ninguna sugerencia de cambio, un gran número de participantes expresa la necesidad de especificar más la situación familiar, el grado de autonomía y las necesidades, al igual que solicitan información sobre hábitos alimenticios. También demandan mayor hincapié en el apoyo psicológico y los cuidados del estoma.

Conclusiones: El incorporar la opinión de AP a las iniciativas para mejorar la continuidad de cuidados desarrolladas por especializada es básico para su éxito. El informe propuesto presenta una gran aceptación aunque necesita incorporar sugerencias de los receptores.

EL ÁREA RADIOLÓGICA DE MAMA COMO PUERTA DE ENTRADA PARA LA PACIENTE REMITIDA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

M.A. Martínez Mengual, M. Martínez Gálvez, F. García Vivancos, S. Torres del Río y M.A. Carrillo Almagro
Hospital Morales Meseguer.

Objetivo: Presentamos un circuito multidisciplinar interniveles integrado en una Unidad de Mama intrahospitalaria, de atención a pacientes remitidas desde Atención Primaria (AP) con patología mamaria, definido en función de minimizar el número de consultas, el tiempo diagnóstico y los recursos empleados, siendo la puerta de entrada el área radiológica de mama.

Material y método: La solicitud de estudio radiológico se remite a Radiología (SRx) y es revisada por la radióloga de la Unidad de Mama (UPM) que estima las pruebas complementarias necesarias, urgencia de las mismas y tiempo de ocupación de sala. La citación es telefónica, realizándose la primera consulta en el SRx donde el TER realiza una anamnesis y estudios de imagen según protocolo y edad. El radiólogo clasifica los hallazgos según el sistema BI-RADS (breast imaging reporting and data system) realizando las pruebas complementarias que estime necesarias: ecografía, PAAF, BAG. Las pacientes de la categoría BI-RADS 1,2 son remitidas de nuevo a AP con un informe radiológico y las pacientes BI-RADS 3,4,5 (seguimiento o comprobación cito/histológica) son remitidas a una segunda consulta en el Servicio de Cirugía una vez completado el estudio diagnóstico donde se decide tipo de tratamiento o alta y se redacta un informe para el médico de AP. El TER se responsabiliza de la citación de las pacientes en UPM y en Anatomía Patológica, y de la derivación de los estudios. Revisamos una muestra aleatoria de 12 pacientes procedentes del sistema de derivación anterior a la implantación del circuito (A) y 12 posteriores (B), midiendo la media del número de consultas (NC) y del tiempo hasta la técnica diagnóstica definitiva, PAAF (TD).

Resultados: Período A: NC = 3,8 (3-5), TD = 24,4 (5-63). Período B: NC = 2,1 (2-3), TD = 12,9 (5-25).

Conclusiones: La creación de un circuito de atención a pacientes con sintomatología mamaria derivadas desde AP a atención especializada, basado en la atención integral en una UPM con selección y valoración inicial en Radiología y su posterior derivación permite disminuir el tiempo diagnóstico y el número de consultas, controlando la variabilidad del proceso.

PROYECTO MULTICÉNTRICO DE CONTINUIDAD DE CUIDADO AL ALTA: INFORME DE ENFERMERÍA AL ALTA (IEA)

R. Oloriz Rivas, P. Herrera Carral, C. Vidal Monfort, L. Gutiérrez Padilla, M. Amparán Ruiz, Enfermeras Grupo Multicéntrico
Hospital Universitario Marques de Valdecilla.

P-251

Palabras clave: Continuidad Cuidados, Informe Enfermería, Grupo Trabajo Focal.

Objetivos: 1) Asegurar la calidad de la atención sanitaria por medio de la Continuidad-Provisión de cuidados de enfermería al alta. 2) Establecer un sistema de información. 3) Definir canales de comunicación entre niveles. 4) Disponer de información en las Historias Clínicas del estado de salud del paciente al Alta Hospitalaria.

Métodos: Se constituyó un Grupo de Trabajo Focal (GTF), donde están representados todos los Centros adscritos al Servicio Cántabro de Salud (SCS), que durante 21 reuniones, aplicando la metodología de Mejora Continua de la Calidad (MCC), analizó y priorizó los objetivos y necesidades existentes, quedando recogidas sus conclusiones en el documento mencionado. Antes de ser implementadas a través de las fases propuestas: difusión, formación y trabajo grupal, fue valorada su adecuación, y posteriormente validada.

Resultados: Elaboración del primer modelo de IEA. y su Manual de Cumplimentación, cuya implantación comenzó en enero de 2001. Consta de 3 copias, un original para el paciente, una para la Historia Clínica y otra para Atención Primaria. Contempla datos de identificación de las Necesidades Básicas, adaptado del Modelo de Virginia Henderson, los cuidados que ha de mantener al alta Hospitalaria, la capacidad para asumir el autocuidado y la necesidad de prestaciones sociosanitarias. En el reverso de la 2^a hoja, figuran los códigos, aplicables al subapartado de piel. Cada Hospital ha habilitado, en función de sus recursos y tomando en cuenta los informes éticos conocidos, sus propios canales de comunicación con Atención Primaria. Elaboración 2^º modelo de IEA e implantación en la segunda quincena de mayo 2002.

Conclusiones: La dinámica establecida por el GTF permite que salga a la luz el primer Proyecto Multicéntrico, donde están representados todos los centros del SCS. El empleo de la metodología basada en la MCC ha sido fundamental para realizar el presente Proyecto. El IEA asegura la continuidad de la Atención Sanitaria por medio de la provisión de cuidados. Esta dinámica nos permitirá una mejora de la comunicación, que bien pudiera concretarse en la elaboración conjunta del Informe de Enfermería al ingreso y/o Protocolos, acercándonos a la unificación del lenguaje enfermero. El IEA permite homogeneizar la práctica enfermera, sustentada en la experiencia, opinión e investigación.

EXPERIENCIA DE ATENCIÓN COMPARTIDA ENTRE NIVELES ASISTENCIALES: MEJORA DE LAS DERIVACIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA A LOS ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL Y VICEVERSA

J. Plana, E. Bayona, P. Sardaños, M. Vancells, J. Bisbe y M. Carreras
Hospital Sant Jaume.

Introducción: La importancia que los ciudadanos dan a la salud y la cantidad de recursos que estamos destinando, nos obliga a las diferentes organizaciones sanitarias, a realizar esfuerzos de mejora constantes. Con estas premisas fue iniciado un PROYECTO DE MEJORA CONTINUA a través de una coordinación entre niveles asistenciales, englobando los diferentes proveedores sanitarios de nuestra comarca.

Mediante técnica de grupo nominal se elige la Mejora de las derivaciones de atención primaria a los especialistas del hospital y viceversa.

Metodología: ¿Cuáles son los problemas? Tiempo de demora excesivo para acceder a los especialistas; flujo de información del especialista a primaria insuficiente o inexistente en algunos casos; circuito de derivación variable según población de origen; utilización de la vía de derivación preferente inadecuada; frecuentación inadecuada. ¿Cuáles son los objetivos? La citación al especialista con carácter "preferente", no debe exceder los 7 días. La citación al especialista con carácter "ordinario", no debe exceder los 30 días. Mejora de la percepción de la información que se recibe de primaria a especialista y de especialista a primaria. Las solicitudes de consulta al especialista tienen que llegar y ser programadas en 24 horas laborables en todos los casos. Adecuar las vías acceso ordinario - preferente. Adecuar la frecuentación a los estándares. ¿Cómo se evaluará? (indicadores): Demora de las visitas: analizar la lista de espera un día a la semana durante 4 semanas consecutivas para cada especialidad. Flujo de información primaria – especialista y viceversa: escala analógica visual. Valoración de las derivaciones desde primaria de toda una semana analizando información administrativa, información médica, adecuación de la vía preferente en base a la información suministrada en la petición, tiempo entre la solicitud y su llegada al centro hospitalario, por poblaciones de origen o ABS de procedencia. Comparación de la frecuentación de las derivaciones con los estándares. **Medidas correctoras propuestas** Conocimiento en tiempo real de la demora en citar a los pacientes para cada especialidad por parte de los médicos de atención primaria. Diseño e implantación de una hoja de informe de seguimiento de los enfermos en CE. Información de las hojas de consultas desde primaria a especialidades. Dar conocimiento de los circuitos burocráticos para las derivaciones. Disponibilidad de programar online desde primaria al hospital directamente para las visitas ordinarias. Diseño de las agendas de especialidades con dimensión suficiente para absorber el flujo de derivaciones según la frecuentación pactada para cada especialidad.

Resultados: Una vez realizadas las medidas propuestas, se vuelven a medir los indicadores y observamos los siguientes resultados: demora de las visitas: se consiguen los objetivos propuestos en un 40% de los casos. Escala analógica de la percepción de la información recibida por el médico de primaria: se consigue una mejoría en un % elevado. Escala analógica sobre la percepción de la información recibida por los especialistas: es un objetivo no conseguido, pues no hay mejoría en este indicador. Valoración de las derivaciones desde primaria de toda una semana y valoración del tiempo por programar visitas: mejoría espectacular en el tiempo de circuito en las ordinarias, pues se programa directamente desde las ABS; para las preferentes, el tiempo en llegar al hospital oscila de 1 a 3 días, que significa una mejoría destacable. Mejora importante para el cumplimiento de la información administrativa de las peticiones de derivación desde primaria, así como la adecuación de la vía preferente. Comparación de la frecuentación de las derivaciones con los estándares de CatSalut: es un indicador conseguido en un elevado % de casos, siendo el indicador más importante para el diseño de agendas de los especialistas así como los recursos humanos para destinar y conseguir los objetivos propuestos.

TUBERCULOSIS EN UN ÁREA SANITARIA: DEL PROTOCOLO A LA GESTIÓN DEL PROCESO

J. Ferrández Santos, A. Arce Arnáez, P. Martín-Carrillo
Domínguez, P. Urcelay Gentil, E. Palenque Mataix y C. Cámara González
Unidad de Calidad Área 11 Atención Primaria.

P-252

Palabra clave: Proceso asistencial, Mejora de la calidad, Área sanitaria, variabilidad clínica.

Objeto: Desarrollar la gestión del proceso de atención a pacientes con tuberculosis (TB) en un área sanitaria, a partir de la protocolización coordinada previa entre niveles asistenciales.

Metodología: Situación de origen: Intervenciones según aplicación del Protocolo de actuación por nivel asistencial (Atención Primaria, Atención Especializada), con actividades e indicadores específicos. **Áreas de mejora:** Deficiencia del abordaje integrado entre niveles. Intervenciones segmentadas centradas en el proceso de atención. Desagregación y heterogeneidad de la información por niveles. Ausencia de datos concluyentes sobre el resultado final de la atención al paciente. **Intervenciones:** (A) Consolidación de la Comisión de Tuberculosis del Área con participación de todos los servicios implicados (Atención Primaria, Salud Pública, Medicina Preventiva, Neumología, Medicina Interna, Pediatría, Microbiología, Unidad SIDA). (B) Delimitación de objetivos principales: Mantener una coordinación estructurada e integrada; Disponer de información epidemiológica básica para estimar medidas de frecuencia y evolución de la TB; Mejorar la atención clínica a los pacientes con TB; Mejorar la formación continuada. (C) Redefinición del circuito asistencial (año 2001), identificando la secuencia de las actividades, entradas y salidas del proceso, asignación de indicadores parciales/finales, metas, fuente de información, responsabilidades atribuidas y actualización de recursos.

Resultados: A Junio 2002 (6 meses implantación). Actualización/creación de procedimientos esenciales: Registro regional de casos de TB (datos del Área); registro de muestras positivas, resistencias y diagnósticos relacionados; registro del estudio de contactos e intervenciones aplicadas; sistema de notificaciones; base de datos homogénea para ambos niveles. Mejoras en indicadores sobre: Información hospitalaria hacia Atención Primaria, notificación de casos de TB (mayor número de fuentes de información y nº de notificaciones/caso), datos clínicos del sistema EDO, estudios de contactos (características y actividades realizadas), riesgos de mala adherencia terapéutica.

Conclusiones: La variabilidad clínica y la heterogeneidad asistencial pueden abordarse integralmente mediante la gestión del proceso, definiendo la secuencia gradual de actividades, y obteniendo un valor añadido orientado hacia la eficiencia y necesidades del paciente. La gestión del proceso precisa una redefinición explícita del problema, debiendo superar la resistencia al cambio entre niveles. La evaluación sistemática del proceso permite identificar las oportunidades de mejora en el conjunto del área sanitaria.

P-253**ACTUACIONES DE COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA - ESPECIALIZADA EN UN ÁREA DE SALUD**

V. Pedrera Carbonell, C.A. Arenas Díaz, A. Blasco Peñango, M.J. Martínez Riera, P. Soriano Cano y D. Orozco Beltrá
Dirección Atención Primaria Área 17.

P-254

Palabra clave: Interrelación entre niveles, atención continuada, continuidad asistencial, imagen corporativa.

Resumen: En el Área de salud 17 de la Comunidad Valenciana, durante este año 2002 se ha impulsado extraordinariamente la unión primaria especializada para conseguir alcanzar una sanidad sin niveles, mejor atención a la población y una política de actuación común. Partiendo de una voluntad decidida de unión las principales actividades han sido:

1) Puesta en marcha del Centro Sanitario Integrado de Villena. En las urgencias de este centro a partir de las 21 horas trabajan juntos e integrados personal de atención primaria y de atención especializada, integrándose el PAC en el centro, permitiendo una mayor capacidad resolutiva de las urgencias médicas de la zona. 2) Reuniones de Junta de Personal de Área conjuntas. Aunque legalmente son únicas de Área, históricamente se reunían por separado con las distintas direcciones. Hemos encontrado una extraordinaria reticencia sindical en volver a la legalidad por tener una estrategia de división y separación de niveles que les daba buen resultado. 3) Creación de una Guía de Interrelación Atención Primaria y Atención Especializada para la óptima integración asistencial. 4) Creación de grupos de trabajo conjuntos para la elaboración de guías de interrelación para diversas patologías y especialidades. Acaba de terminar su protocolo el grupo de Aparato Locomotor y comienza su actividad el de ORL. En ellos se consensuan criterios de derivación, nivel de resolución de Atención Primaria, etc. 5) Elaboración de una página Web corporativa común para el Área. 6) Elaboración de un Boletín Informativo corporativo común para el Área. 7) Extracciones periféricas de sangre y envío vía informática de resultados de laboratorio a los Centros de Salud. 8) Organización de jornadas científicas conjuntas de Área.

Creemos que estas actividades han supuesto una gran mejora de la calidad ofrecida al ciudadano, se han reducido demoras, en el área de locomotor donde está funcionando el protocolo de derivación. Se ha mejorado la satisfacción de los profesionales al trabajar conjuntamente y pueden ser más resolutivos, los resultados de las analíticas se entregan en el mismo día de la extracción para la mayoría de las pruebas y se percibe un sentimiento de unión en el Área que antes no existía.

IMPACTO DE LA POBLACIÓN INSTITUCIONALIZADA EN LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS. PROPUESTAS DE MEJORA

A. López Blasco, F.J. Pérez Rivas, C. Carrera Manchado, M. Beamud Lago, M.J. Gil de Pareja Palmero y J. Ferrández Santos

Palabra clave: Cartera de Servicios. Evaluación. Coordinación sociosanitaria. Residencias sanitarias.

Objeto: Conocer la influencia de la población institucionalizada en residencias sociosanitarias, sobre la cobertura de la prestación de servicios sanitarios de Atención Primaria. Definir las potenciales líneas de coordinación que faciliten la optimización de la prestación sociosanitaria.

Metodología: Análisis de la situación: diseño observacional, descriptivo: Ámbito del estudio: Área 11 de AP de Madrid. 39 Equipos de Atención Primaria (EAPs). Fuente de análisis: Cartera de Servicios de Atención Primaria (INSALUD) en los servicios potencialmente relacionados (Prevención y Detección de Problemas en el Anciano, Atención Domiciliaria a Pacientes Inmovilizados, Atención a Pacientes Terminales). Fuentes de información: Base de Datos de TSI (Tarjeta Sanitaria Individual), Evaluación del Programa de Atención Domiciliaria 2001 (INSALUD), Memorias Anuales (1994-2001) del Área, Evaluación de Cartera de Servicios INSALUD (1999-2001). Identificación de la población institucionalizada por el Servicio de Farmacia del Área mediante indicadores de población por cupo médico para asignación presupuestaria.

Resultados: Ritmo de envejecimiento poblacional del 1,3% (28.996 personas) en el periodo 1994-2001. Porcentaje de personas > 65 años superior en el Área respecto a media de la Comunidad Autónoma (19,8% vs. 15,1%). Coberturas (2001) del 65,6%, 43,5% y 41,3% respectivamente para la prestación de servicios de Atención al Anciano, Inmovilizados y Terminales. Corrección positiva de coberturas hasta el 67,5%, 54,4% y 74,3% respectivamente para los mismos servicios con exclusión en los casos esperados de la población institucionalizada, no accesible desde Atención Primaria. Ausencia de fiabilidad del registro de TSI para determinar las personas institucionalizadas, al identificarse déficits tanto en la asignación de cupo médico en el EAP adscrito por zona básica como en el propio sistema de registro de la TSI.

Conclusiones: La Administración Sanitaria competente en Cartera de Servicios tiene que tener en cuenta la población institucionalizada a la hora de definir los casos esperados en los Servicios de Atención Al Anciano, Inmovilizados y Terminales; bien disminuyendo el porcentaje, bien a través de la coordinación de instituciones sanitarias y sociales en la homogeneización de la provisión de servicios. Es necesario establecer un mecanismo de registro en la Base de Datos de TSI que permita identificar de manera inequívoca la población institucionalizada.

P-255**RETORNO DE LOS PACIENTES TRASLADADOS A OTROS HOSPITALES POR FALTA DE CAMAS EN LA UCI**

I. Roldán Bermejo, I. Forcadell Ferré, J. Luna Jarque, R. Claramonte Porcar, G. Masdeu Eixarch y J. Rebull Fatsini
Hospital Verge de la Cinta.

Palabras clave: Trasladados, UCI, retorno.

Objetos: Analizar la evolución y el retorno de los pacientes críticos trasladados a otros hospitales por falta de camas en la UCI del Hospital de Tortosa (HTVC), determinar el porcentaje de retorno y proponer medidas de mejora para evitar costes sociales en el entorno familiar como consecuencia del desplazamiento fuera de su Región Sanitaria.

Metodología: Estudio observacional descriptivo. Población de estudio: pacientes con criterios de ingreso en Unidades de Pacientes Críticos, trasladados a otros centros por falta de camas en la UCI del HTVC, durante el periodo del 1 enero del 2000 al 31 diciembre del 2001. El seguimiento de los pacientes trasladados se realizó mediante contacto telefónico hasta el momento del alta de la unidad de críticos del hospital receptor.

Resultados: Pacientes trasladados: 23 Principales diagnósticos iniciales: Síndrome Coronario Agudo (SCA) 8 (34,7%), Insuficiencia Respiratoria (IR) 5 (21,7%) Hospitales receptores: Hospital Joan XXIII Tarragona (HJXXIII) 17 (73,9%), Otros 6 (26,1%) Unidades receptoras: UCI 21 (91,3%), Coronarias 2 (8,6%) Destino al alta: UHC hospitales receptores 12 (52,1%), Semiintensivos hospitales receptores 4 (17,3%), Unidades hospital emisor (17,3%). Éxitos 3 (13%) Éxitos durante traslado: Ninguno Contactos previos con hospital receptor: 16 (69,5%), 15 (93,7%) HJXXIII. Contactos al alta con hospital emisor: 7 (30,4%) 100% HJXXIII. Principales diagnósticos pacientes ingresados UCI HTVC en mismo periodo: SCA 38,5%, IR 12,2% Mortalidad UCI mismo periodo: 14,3% Mortalidad hospitalaria: 16,4%

Conclusiones: Las características y la evolución de los pacientes trasladados son equiparables a la de los pacientes ingresados en la UCI HTVC. Todos los pacientes trasladados ingresaron en Unidades de Críticos. La mortalidad de los pacientes trasladados (13%) fue similar a la mortalidad de la UCI del HTVC y a la mortalidad hospitalaria. El hospital mejor intercomunicado fue HJXXIII. El porcentaje de pacientes retornados al hospital emisor es bajo. El 100% de los pacientes retornados procedía del HJXXIII. Propuestas de mejora: 1) Potenciar el sistema de comunicación utilizado, al trasladar los pacientes por falta de camas, para incrementar los pacientes retornados. 2) Evitar el traslado de este tipo de pacientes aumentando la dotación de la uci del HTVC.

P-257**DONANTES CADÁVER INTRA Y EXTRA- HOSPITALARIOS EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TEJIDOS. EL MODELO PAMPLONA**

E. Maraví-Poma, A. Martín Montero, E. Maraví-Aznar, R. Iturrealde, R. Teijeira y V. Martínez de Artola
Hospital Virgen del Camino Coordinación Transplantante.

Palabra clave: Trasplantes, Tejidos, Cadáver, Donantes, Córnea, Extranodal.

Introducción: El trasplante de tejidos constituye la única alternativa para pacientes afectados de un daño irreversible de alguno de ellos. La búsqueda de tejidos fuera del ámbito hospitalario es vital, especialmente si dicho hospital no genera donantes dentro del hospital.

Objetivo: Exposición y actividad de un modelo de coordinación y donación de tejidos de cadáveres intra y extra-hospitalarios.

Material y métodos: Datos procedentes del Hospital Virgen del Camino (HVC) del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea y Organización Nacional de Trasplantes de España. A partir de 1990 se organiza el equipo de trasplantes formado por un médico de la Unidad de Cuidados Intensivos y SOS-Navarra. En 1996 la Coordinación de Trasplantes del HVC es definido como centro de referencia para el Programa de Trasplantes de Tejidos de la Comunidad Autónoma de Navarra.

Resultados: Se desarrollan protocolos consensuados para la detección extra-hospitalaria de los fallecidos en parada Cardiorespiratoria:

- A. Alarma desde SOS-Navarra; Jueces y Médicos Forenses
 - B. Criterios de selección, búsqueda y contacto con familiares
 - C. Aviso a equipos de serología, extracción y transporte
 - D. Logística y reparto de los tejidos
 - E. Incentivos pactados: Económicos, administrativos y normativa al respecto
- Se expone el desarrollo y actividad del Programa de Trasplantes. De la totalidad de cadáveres detectados el 49% eran donantes potenciales y de éstos, el 43% se transformaron en reales. El 95% de los últimos donaron las Córneas y un 81% tejido Óseo en el quirófano del Centro extractor. El 82% de las cónicas fueron válidas para Queratoplastias y el resto se destinó a quirófano experimental.

Conclusiones: La coordinación extra-hospitalaria en un hospital de referencia, junto a un servicio público como SOS-Navarra, ha conseguido los avances científicos, organizativos, administrativos y la creación de equipos de actuación, haciendo posible que el trasplante de tejidos sea una práctica cotidiana en el hospital, con un mayor número de donantes y de pacientes que pueden acceder a esta modalidad terapéutica. El modelo navarro con el Hospital Virgen del Camino como referencia a los efectos resulta positivo.

P-256

DISPOSITIVOS HEMOSTÁTICOS FEMORALES MEJORA DE LA EFICIENCIA EN PROCEDIMIENTOS CARDIOLÓGICOS PERCUTÁNEOS

J.G. Galache Osuna, I. Calvo Cebollero, A. Marquina Marcos, E. Moreno Esteban y J.A. Diarte de Miguel

Palabra clave: Eficiencia, dispositivos hemostáticos, cateterismo cardiaco, angioplastia coronaria, estancia hospitalaria.

Objetivo: Evaluar el impacto de los dispositivos hemostáticos femorales sobre la estancia hospitalaria y la tasa de complicaciones vasculares mayores tras la realización de un cateterismo diagnóstico o una angioplastia coronaria.

Metodología: Estudio comparativo entre el grupo de pacientes sometidos a un procedimiento cardiológico percutáneo por vía femoral tras la implantación de los dispositivos hemostáticos de sellado utilizados de forma protocolizada entre el 13 de Mayo y el 13 de junio de 2002 y el mismo periodo del año 2001 antes de la implantación de dichos dispositivos. Criterios de exclusión: Prolongación de estancia por causas extracardíacas o implantación de DAI o Marcapasos. Análisis estadístico T de Student y U de Mannwhitney para variables cuantitativas y Chi cuadrado para variables cualitativas.

Resultados: Pacientes totales 116 en el 2001 (excluidos 7 el 6%) y 103 (6 el 6%) en el 2002. El porcentaje de pacientes en los que se utilizó el dispositivo fue de 35/54 (52%) en los procedimientos diagnósticos y 14/26 (45%) en los terapéuticos. En procedimientos terapéuticos se produjeron 2 complicaciones mayores en el año 2001 y una complicación mayor en el año 2002 esta última en paciente sin sellado vascular. No se produjo ninguna complicación mayor en pacientes tratados con sellado hemostático.

La estancia hospitalaria en función del tipo de procedimiento y del año se describe en la tabla siguiente.

	Proc. Diagnósticos	Proc. Terapéuticos	Total
Año 2001	2,6	4,31	3,1
Año 2002	1,9	3,1	2,3
IC y p	(0,04-1,4) P = 0,061	(0,3-2,6) P = 0,07	(0,13-1,45) P = 0,021

Valoramos la estancia media hospitalaria en función de la utilización de sellado hemostático. La estancia media en pacientes con procedimiento diagnóstico pasó de 2,4 a 1,6 días (IC 0,03-1,7) con $p < 0,05$. En procedimientos intervencionistas pasó de 4,2 a 2,54 (IC 0,5-2,8) con $p = 0,7$.

Conclusiones: La utilización de los dispositivos de sellado vascular se asocia a una mejora de resultados en el paciente por disminución de complicaciones vasculares mayores y disminución en la estancia media hospitalaria tras el procedimiento. El beneficio se produce tanto en procedimientos diagnósticos como terapéuticos.

ÉTICA DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS Y MODELOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

P. Simón Lorda, P. Hernando Robles, S. Martínez Rodríguez, J. González Cajal, A. Sainz Rojo y J. Rivas Flores
Corporació Sanitària Parc Taulí.

Palabras clave: Ética, acreditación.

Objeto: Analizar comparativamente cómo los criterios, subcriterios y estándares de los diferentes sistemas de evaluación y acreditación de la calidad de las instituciones u organizaciones sanitarias contemplan los aspectos éticos y emitir recomendaciones que permitan mejorarlos o modificarlos en el caso de que se plantea la posibilidad de desarrollar nuevos sistemas de acreditación en nuestro país.

Metodología y resultados: El grupo de trabajo analizó mediante sesiones de discusión con presencia física o revisión de documentos mediante correo electrónico, los siguientes modelos: *a)* Modelo europeo de EFQM; *b)* Modelo norteamericano de la JCIA; *c)* Modelo internacional ISO 9001, 9002 y 9004; *d)* Modelo británico del HQS – King's Fund; *e)* Modelo Canadiense del CCHSA; *f)* Modelo español de acreditación hospitalaria de Carrasco y Zurro; *g)* Modelo español de acreditación de centros sociales y sociosanitarios de De Santiago-Juárez y Zurro; *h)* Modelo español de acreditación docente de hospitales del MSyC.

En cada modelo se analizó su fundamentación, los contenidos éticos de los criterios o estándares y el peso de dichos criterios en el modelo en su conjunto. Se elaboraron recomendaciones para reforzar los aspectos éticos en los modelos de acreditación que vayan a utilizarse o diseñarse en nuestro país. El primer borrador consensuado se remitió a 14 expertos españoles en calidad para su revisión y sugerencias. El documento final de consenso del grupo se encuentra en proceso final de redacción.

UTILIDAD DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LOS INFORMES DE MEDICAMENTOS EN LA FORMACIÓN DEL RESIDENTE

E. Lasa Luaces, E. Arroabarren Alemán, S. Echechipía Madoz, B. Gómez Breñosa, B.E. García Figueroa y A.I. Tabar Purroy

Palabra clave: Self-Audit.

Objetivos: Evaluar la utilidad de los Estándares Mínimos de informes de Alergia a Medicamentos del Comité de Calidad Asistencial de la SEAC (EMM) como instrumento de medida objetivo y cuantificable en la valoración del SELF-AUDIT y demostrar la utilidad de éste en la formación del residente.

Métodos: Se seleccionan 10 informes de primera visita de Alergia a Medicamentos realizados por cada residente (R2 y R3). Se pactan unos criterios de revisión basados en los EMM (enfermedad actual, fármacos tolerados, otros problemas alérgicos, pruebas cutáneas, IgE específica, pruebas de provocación, diagnóstico, recomendaciones y seguimiento). Cada residente revisa el % de cumplimentación de cada ítem en sus informes, detallando los puntos a destacar y a mejorar y fijando objetivos para la próxima evaluación. Posteriormente se repite el proceso en las mismas condiciones. Mediante el SELF-AUDIT, evaluamos el grado de cumplimiento de estos EMM por los residentes y su grado de mejora.

Resultados: El R2 en el primer bloque de informes cumplió correctamente las pruebas de provocación y las recomendaciones en el 50%, los fármacos tolerados en el 70%, y el resto en el 100% de los informes. Los puntos a destacar fueron las pruebas inmunológicas, el juicio clínico y seguimiento, y los puntos a mejorar y objetivos, fueron las recomendaciones, pruebas de provocación y fármacos tolerados. En la segunda parte, el residente completó adecuadamente los fármacos tolerados en el 90%, las recomendaciones en el 60% y el resto en el 100% de los documentos. El R3 en el primer grupo de informes cumplió correctamente el 80% los fármacos tolerados y las recomendaciones, el 90% de las provocaciones y el 100% del resto. Los puntos a destacar fueron las exploraciones complementarias, el juicio clínico y el seguimiento, y los puntos a mejorar y objetivos fueron los fármacos tolerados y recomendaciones. En el segundo bloque de informes, el cumplimiento de todos los ítems fue del 100%.

Conclusiones: Se demuestra que el SELF-AUDIT, en estas condiciones, mejora la formación del residente y corrige deficiencias tanto en el R2 como en el R3(20%) en la elaboración de Informes Clínicos de Alergia a Medicamentos.

PÓSTER XI

Otros aspectos no contemplados

Sala Navarra
Jueves 10 y viernes 11

ESTUDIO COMPARATIVO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN TRADICIONAL VERSUS MÉTODO CAPILAR PARA TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES ORALES

M. Berrió Pecero, M.J. Blanco González y E. Púlido Mayoral
Fundación Hospital Alcorcón, Hospital de Día Médico.

Palabras clave: Anticoagulantes orales, Extracción capilar, Calidad percibida.

Introducción: El incremento del número de pacientes sometidos a tratamiento con anticoagulantes orales (Sintrom® o similares) en la actualidad, ha llevado a buscar e implantar, nuevos métodos de control más eficaces y cómodos para el paciente, como la determinación de Tiempo de Protrombina en sangre capilar. Por lo cual, en la Fundación Hospital Alcorcón (FHA) hemos comparado el método tradicional frente al capilar, buscando un mayor grado en la calidad diaria asistencial.

Objetivo: Determinar las Ventajas y desventajas del método de extracción capilar respecto al tradicional en cuanto a Tiempos, Recursos Humanos (RRHH) y Recursos Materiales (RRMM).

Material y métodos: Estudio prospectivo-descriptivo, se evaluaron desde 1 de octubre de 2001 hasta 10 de noviembre de 2001, 540 pacientes ambulatorios con tratamiento anticoagulante oral, controlados en nuestro centro, asignados aleatoriamente para recoger Tiempos de espera desde la hora de llegada hasta la entrega de Informe de Tratamiento y Recomendaciones. Comparación de Recursos Humanos y Recursos Materiales. Los datos obtenidos se recogieron y procesaron mediante programa informático (hoja cálculo Excel).

Resultados: El resultado obtenido después de valorar estos parámetros, es que en el método capilar se acorta el tiempo de espera de los pacientes. En el método tradicional desde que llega el paciente para realizarse la extracción de sangre hasta que se le entrega el informe del resultado es superior a las 2 horas, en cambio en el método capilar desde que se realiza hasta que recoge su pauta pasa ≥ 15 minutos. Si el resultado del I.N.R. es > 5 en el método capilar, se realiza el I.N.R. obtenido en plasma con el método tradicional. En cuanto a Recursos Humanos y Materiales las diferencias son significativas entre ambos procedimientos.

Conclusiones: Es menos traumático fundamentalmente en los pacientes de difícil acceso venoso. El tiempo de espera es sustancialmente inferior en el método capilar. Se observa que aunque los RRMM. son más costosos, al final de la prueba quedan equiparadas, ya que los RRHH. son menores de forma cuantitativa habiendo optimizado los recursos humanos.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LAS 5S EN EL SERVICIO DE ALMACÉN DEL HOSPITAL DE ZUMARRAGA

M.D. Blanco Pompeyo, M.A. Calleja Cepeda, G. Lopez Rodríguez, E. Martín Alcelay, L. Aguirre Alberdi y O. Moracho del Rio

Palabra clave: 5S, Almacén, Metodología de mejora.

Objetivo: Implantar en el área de almacén la metodología 5S, para mejorar de manera continuada las condiciones de organización, orden y limpieza, contribuyendo a aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.

Metodología: Partiendo de una guía de metodología 5S y un curso de formación/acción para su implantación en centros sanitarios se establecen los siguientes pasos:

- Experiencia piloto en un sector reducido del almacén (oficina).
- Identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios.
- Establecer plano de ubicación de los materiales para lograr una búsqueda fácil y rápida.
- Identificar las fuentes de suciedad y proceder a su eliminación.
- Establecer mediante sistemas sencillos la distinción de las situaciones normales de las que no lo son.
- Trabajar de forma permanente con las normas establecidas (mejora continua).

Resultados: Optimización de un 25% del espacio. Reducción del tiempo de búsqueda de productos. Reducción de la existencia de materiales. Aumento de la satisfacción y motivación de las personas. Mejora del trabajo en equipo. Mejora de la seguridad en los puestos de trabajo.

CALIDAD Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. PÁGINAS AMARILLAS IMAS

J. Esquerda Ribas, M. Marsal Serra, M.J. Villares García, N. Orla Tena, C. Barbat Llorens, M. Molinos Valles y J. Roig Aubach
Hospital del Mar.

Palabra clave: Conocimiento, talento, quien sabe que?, comunicaciones de interés.

Objetivo: Compartir una actividad de calidad y gestión del conocimiento, que permita a los hospitales conocer la gran cantidad de conocimiento disponible y ofrecer a sus profesionales un instrumento que permita conocer quien sabe que?. Este instrumento son las *páginas amarillas del Hospital*. Las páginas amarillas del IMAS pretende: a) Facilitar que las personas localicen experiencia y conocimiento de forma rápida. b) Comunicar el conocimiento disponible en el IMAS.

Metodología. A) Conocer la situación actual de la gestión del conocimiento en la organización a través de un cuestionario. B) Elaboración de un instrumento: páginas amarillas. C) Definir el proyecto y las fases necesarias para su implantación.

Fases: 1) Comunicación interna del proyecto; 2) Definición de un grupo de trabajo para la construcción de las páginas ficha modelo; 3) Diseño ficha/página amarilla; 4) Entrevistas con una muestra representativa; 5) Construcción de las categorías de conocimiento; 6) Validación; 7) Prueba piloto; 8) Implantación de las páginas amarilla; 9) Colaboración con el departamento de informática para definir funcionalidad; 10) Integración de las páginas amarillas en el Intranet del Hospital. 11) Seguimiento.

Resultados: Se confirmó que había una alta implicación de la dirección para el desarrollo de la gestión del conocimiento. Que la cultura era favorable para realizar el proyecto (páginas amarillas) y era necesario hacer énfasis en los procesos y las tecnologías de soporte.

Conclusiones: Es importante entender y respetar la cultura de la institución para que funcionen las páginas amarilla. La participación debe ser voluntaria. Cada persona es el propietario de sus datos. Énfasis en conocimiento no en experiencia. Los retos son culturales y de comportamiento, no tecnológicos. Es importante conocer que motiva los profesionales del IMAS a compartir conocimiento. Es importante compartir para poder crecer profesionalmente.

P-263**UTILIDAD DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LOS INFORMES DE ASMA EN LA FORMACIÓN DEL RESIDENTE**

E. Arroabarren Alemán, E. Lasa Luaces, B.E. García Figueroa, M. Anda Apiñaniz, M. Aldunate Muruzabal y A.I. Tabar Purroy

Palabra clave: Self-Audit.

Objetivos: Evaluar la utilidad de los Estándares Mínimos de informes de Asma del Comité de Calidad Asistencial de la SEAIC (EMA) como instrumento de medida objetivo y cuantificable en la valoración del SELF-AUDIT y demostrar la utilidad de éste en la formación del residente.

Métodos: Se seleccionan 10 informes de Primera Visita (PV) de Asma realizados por cada residente (R2 y R3). Se pactan unos criterios de revisión basados en los EMA: enfermedad actual, hábitat, otros problemas alérgicos, exploración física, exploración funcional respiratoria, diagnóstico, inmunoterapia y tratamiento medicamentoso. Cada residente realiza una revisión de cada ítem, detallando los puntos a destacar, y a mejorar y fija objetivos para la próxima evaluación. Posteriormente se repite el proceso en las mismas condiciones. Mediante el SELF-AUDIT, evaluamos el grado de cumplimiento de estos EMA por nuestro R2 y R3 y su grado de mejora.

Resultados: El R2 en el primer bloque de informes cumplió correctamente el juicio clínico en el 60%, el tratamiento inmunoterápico y farmacológico en el 80%, la exploración física en el 90% y el resto de ítem en el 100% de los informes. Los puntos a destacar fueron la anamnesis y las pruebas complementarias, y los puntos a mejorar, y objetivos, fueron la exploración física, juicio clínico y tratamiento. En la segunda parte del trabajo, el residente completó adecuadamente en el 80% el juicio clínico e inmunoterapia, y en el 100% el resto de los ítem. El R3 en el primer grupo de informes cumplió correctamente el 60% de las pruebas funcionales, el 90% de los tratamientos farmacológicos y hábitat y el 100% del resto de los ítem. Los puntos a destacar fueron la anamnesis y tratamiento, y el punto a mejorar y objetivo fue la exploración funcional. Tras la aplicación del SELF-AUDIT, este ítem se informó adecuadamente en el 90% de los documentos del segundo bloque y el resto en el 100%.

Conclusiones: Se demuestra que el SELF-AUDIT, en estas condiciones, mejora la formación del Residente de Alergología, corrigiendo deficiencias tanto en el R2 (30%) como en el R3 (20%).

P-265**UTILIZACIÓN DE VÍAS CLÍNICAS. ¿QUÉ OPINAN NUESTROS PROFESIONALES?**

R.M. Simón Pérez, M. Briansó Florencio y J.M. Carbonell Riera

P-264

Palabra clave: Vías clínicas, opinión de profesionales.

Resumen: Las vías clínicas son planes asistenciales que se aplican a usuarios con una determinada patología y que presentan un curso clínico predecible. Esta nueva metodología de trabajo asistencial se viene desarrollando en nuestro centro desde 1999, actualmente se hallan desarrolladas e implantadas un total de 14 vías clínicas que abarcan tanto patologías médicas como quirúrgicas. Con la finalidad de valorar la opinión de los profesionales en el desarrollo y utilización de vías clínicas como metodología de trabajo se decide la realización de una encuesta autoadministrada al total de profesionales que han participado en la elaboración y al total de profesionales que utilizan las vías clínicas implantadas (26 médicos y 49 enfermeras). La encuesta diseñada a tal fin está compuesta de 10 ítems que exploran el grado de acuerdo en la utilización de vías clínicas y dos preguntas abiertas que exploran las ventajas e inconvenientes de su utilización.

Resultados: Tasa de respuesta: 65%. Considero que para desarrollar el trabajo en una organización sanitaria es necesario unificar criterios de actuación. Acuerdo 95,9%, Ni acuerdo ni desacuerdo 4%. La utilización de vías clínicas limita mi autonomía profesional. Acuerdo 12,4%, Ni acuerdo ni desacuerdo 8,1%, Desacuerdo 79,5%. Trabajar con vías clínicas me da seguridad en mi trabajo. Acuerdo 97,9%, Ni acuerdo ni desacuerdo 2%. Trabajar con vías clínicas permite mejorar la calidad de la asistencia. Acuerdo 51%, Ni acuerdo ni desacuerdo 28,6%, Ns/Nc 20,4%. Utilizar las vías clínicas permite adecuar los recursos disponibles a los pacientes. Acuerdo 32,6%, Desacuerdo 36,7%, Ns/Nc 30,7%. Trabajar con vías clínicas ha permitido coordinar mejor las actividades a realizar. Acuerdo 97,9%, Ns/Nc 2%. Considero que las actividades a desarrollar en las vías clínicas que se utilizan en mi servicio han sido correctamente consensuadas. Acuerdo 80%, Ni acuerdo ni desacuerdo 6,6%, Ns/Nc 13,4%. Ventajas: siempre va bien sistematizar el trabajo para que todos hagan lo mismo, disminuye el tiempo ineficiente a la espera que te hagan el tratamiento o soliciten las pruebas, me da tranquilidad si en el servicio hay profesionales de nueva incorporación. Inconvenientes: es un sistema poco ágil para introducir nuevos tratamientos, algunas de las variaciones de la vía son por problemas de demoras internos y esto hace que no sigamos lo establecido..., la vía facilita el no pensar de los profesionales.

Conclusiones: La implicación de los profesionales es un factor clave para la implantación de esta metodología de trabajo. Conocer su opinión después de su utilización debería ser un indicador más para la evaluación de las vías clínicas implantadas.

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN HOSPITALES ESPAÑOLES

C. Madorrán García e I. de val Pardo
Universidad Pública de Navarra, Dpto. Gestión.

P-266

Palabra clave: Evaluación de la calidad, grupos de hospitales.

Objetivo: Descripción de algunos aspectos de las prácticas de calidad en centros hospitalarios de la red asistencial española.

Metodología: A través de una encuesta dirigida a los gerentes de centros hospitalarios se han extraído las variables que permiten identificar ciertas prácticas de calidad en la asistencia, a partir de la cual se han realizado análisis descriptivos de las mismas. Además se ha podido analizar por tipología de hospitales públicos y privados así como por su tamaño detectando analogías y diferencias significativas gracias a contrastes no paramétricos como los test de Kruskal-Wallis y la U Man -Whitney.

Resultados: Los análisis realizados permiten identificar las prácticas de calidad analizadas y el diagnóstico por grupos de hospitales indica las pocas diferencias significativas entre los mismos en cuanto a la titularidad y el tamaño salvo en las variables referentes a los análisis de tiempos de espera e implicación de la Dirección.

Conclusiones: La calidad asistencial es una de las preocupaciones clave en la gestión hospitalaria y debe tratarse de extender e intensificar en las distintas acciones. La investigación permite apuntar que no existe una política de calidad en los centros estudiados, si bien en algunos casos se ha detectado una elevada implicación de la Dirección al respecto. La calidad técnica de la que se parte redundará en un mayor "outcome" de los cuidados de la salud gracias a la extensión de la calidad integral en las prestaciones asistenciales y no asistenciales.

Palabra clave: Atención Primaria. Diversidad de población. Incremento poblacional.

Objetivos: Con motivo del décimo aniversario de la apertura de nuestro centro, evaluamos el cambio cualitativo/cuantitativo de la población atendida en estos últimos 10 años, y el proceso de adaptación del personal administrativo.

Metodología: Se ha realizado un muestreo aleatorio comparando 150 historiales abiertos en el Centro el primer año (1992) y el último año (2002). Se han extraído datos poblacionales como: edad, sexo y nacionalidad.

Resultados: Observamos aumento de la población atendida del 41,3% (2.053 historiales abiertos en el 1992 a 4.942 en el 2002). A continuación cabe destacar ($p < 0,001$): una disminución del 51,2% de mujeres (en el año 1992 fueron 89,8%, y actualmente 38,6%); un aumento del 18,7% de hombres (del 42,6% al 61,3%); un aumento del 39,3% de inmigrantes (del 13,3% al 52,6%); una disminución del 41,2% de nacionales (del 98,6% al 57,4%); una disminución del 17,3% en pacientes mayores de 65 años (del 41,3% al 58,6%) y un aumento del 32,4% en pacientes menores de 65 años (del 58,6% al 91%).

Conclusiones: El cambio en la población atendida tanto en número como en diversidad, ha requerido un proceso de adaptación, reflejado en un aumento de personal administrativo de 4 a 7 personas por turno, clases de inglés, protocolos y descentralización de la atención al público.