

Resúmenes de la jornada de investigación 2011

7. Actuar político y cáncer

Supervivencia a 5 años de las mujeres con cáncer de mama de Bucaramanga y su área metropolitana, según el estadio clínico

Autores: Sonia Osma, Claudia J. Uribe, Luis A. Díaz

Grupo o dependencia: Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia

Correo electrónico: sosma3@unab.edu.co, curibep@unab.edu.co

Objetivo: Determinar la tasa global y las tasas específicas y estimar su asociación con estadio clínico, considerando que se desconoce la supervivencia por cáncer de mama.

Métodos: Estudio analítico observacional; cohorte retrospectiva. Con casos incidentes RPC-AMB 2001-2004 se estimaron la supervivencia y la asociación a estadio clínico (TNM) utilizando regresión de Cox, ajustando por factores pronóstico, y estratificando por seguridad social.

Resultados: Cohorte (n=719). Tasa letalidad=7,0/1.000 persona mes. Tasa global supervivencia=66,8%, tempranos (I, IIA, IIB) 84,2%, avanzados (IIIA, IIIB) 64,8%, metastásico 17,6%. La letalidad mostró asociación significativa a estadio y tiempo de inicio del tratamiento.

Conclusiones: La supervivencia se asocia independientemente a estadio clínico y a tiempo de inicio del tratamiento.