



## FE DE ERRORES

### Fe de errores de «Prevalencia y principales características de la incontinencia urinaria en la población anciana institucionalizada de Madrid»

Begoña Prado Villanueva<sup>a,\*</sup>, Cornelia Bischoffberger Valdés<sup>b</sup>, Emiliana Valderrama Gama<sup>c</sup>, Carlos Verdejo Bravo<sup>d</sup> y Javier Damián<sup>e</sup>

<sup>a</sup> Servicio de Geriatría, Hospital Guadarrama, Madrid, España

<sup>b</sup> Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Guadarrama, Madrid, España

<sup>c</sup> Centro de Salud Campo de la Paloma, Área 1 de Atención Primaria, Madrid, España

<sup>d</sup> Servicio de Geriatría, Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid, España

<sup>e</sup> Área de Epidemiología Aplicada, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España

En el artículo «Prevalencia y principales características de la incontinencia urinaria en la población anciana institucionalizada de Madrid», de B. Prado Villanueva, C. Bischoffberger Valdés, E. Valderrama Gama, C. Verdejo Bravo y J. Damián, publicado en Rev Esp Geriatr Gerontol. 2011;46(1):7-14 se han detectado los siguientes errores que detallamos a continuación:

#### Resumen

Donde dice “funcional seguido por dificultad de caminar” debería decir “seguido de funcional por dificultad para caminar”.

#### Introducción

Donde dice:

Existen evidencias de que la IU es un problema de salud importante, sobre todo en el medio residencial, tanto por su frecuencia como por sus consecuencias médicas<sup>6</sup>, psicosociales<sup>9,10</sup>, funcionales<sup>11</sup> y económicas<sup>7</sup>.

Debería decir:

Existen evidencias de que la IU es un problema de salud importante, sobre todo en el medio residencial, tanto por su frecuencia como por sus consecuencias médicas<sup>6</sup>, psicosociales<sup>2</sup>, funcionales<sup>\*</sup> y económicas<sup>7</sup>.

\* La referencia correcta es la siguiente:

Buttar A, Blaum C, Fries B. Clinical characteristics and six-month outcomes of nursing home residents with low activities of daily living dependency. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2001;56:M292-297.

#### Resultados:

Donde dice:

En cuanto a la frecuencia, el 42,6% de los incontinentes presentaban incontinencia total (tabla 2).

Debería decir:

En cuanto a la frecuencia, el 42,6% de los incontinentes presentaban incontinencia total (tabla 3).

#### Discusión

Donde dice: «Los fármacos psicotrópicos...» debería decir “«Los fármacos psicotrópicos...»

#### Tablas

En la última columna de la tabla 2 falta incluir 1,00 (ref.) en las filas correspondientes a infección urinaria no, úlceras por presión no, e ictus no.

#### Bibliografía

Faltaba completar los autores de las siguientes citas:

4. Aggazzotti G, Pesce F, Grassi D, Fantuzzi G, Righi E, De Vita D et al. Prevalence of urinary incontinence among institutionalized patients: a cross-sectional epidemiologic study in a midsized city in northern Italy. *Urology* 2000; 56:245-249.

13. Morris JN, Hawes C, Fries BE, Philips CD, Mor V, Katz S et al. Designing the national resident assessment instrument for nursing homes. *Gerontologist* 1990; 30:293-307.

Véase contenido relacionado en DOI:10.1016/j.regg.2010.08.004.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [bpradov@hotmail.com](mailto:bpradov@hotmail.com) (B.P. Villanueva).