



Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular



0 - MODELO MURINO DE EPOC INDUCIDO POR HUMO DE TABACO: POTENCIAL ROL DEL PET/CT EN DIAGNÓSTICO DE LA EPOC Y ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA DE LA DEXAMETASONA CON 18F-FDG

L. Díaz Platas¹, A. Serrano Gimeno², M. Romero Otero¹, P. Bañuls Merino³, S. González Hervás⁴, J. Milara Payá⁴ y J. Cortijo Gimeno⁴

¹Unidad de Radiofarmacia. Hospital Clínico Universitario de Valencia. ²CIBERES, Instituto de Salud Carlos III. Valencia. ³Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. ⁴Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia.

Resumen

Objetivo: Demostrar la utilidad diagnóstica del PET/TC con ¹⁸F-FDG en un modelo murino de EPOC inducido por humo de tabaco y valorar su sensibilidad para medir la respuesta farmacológica. Valorar si la dexametasona a dosis altas (10 mg/kg) puede afectar a la calidad de la imagen por ser hiperglucemiantre.

Material y métodos: Se utilizaron 32 ratones hembra C57BL/6 de 12 semanas de edad divididos en cuatro grupos homogéneos (n = 8): Control, EPOC, dexametasona y EPOC+ dexametasona. Se realizó una instilación intranasal a dosis única de LPS de *Salmonella typhimurium* para exacerbar la respuesta inflamatoria pulmonar. A las 24 horas fueron expuestos al humo de tabaco durante 5 días consecutivos. La dexametasona se administró por vía oral forzada una hora antes de la exposición al tabaco. La evolución se valoró mediante realización de PET/TC con ¹⁸F-FDG a día 0 y a día 6 del procedimiento (micro PET/SPECT/TC Albira II Oncovisión S.A.) El procesado de las imágenes con el software PMOD 3.2, calculando el SUV (Standard Uptake Value). Para el seguimiento animal se midió la Enhanced Pause (Penh) utilizando un pleitismógrafo de cuerpo entero. A día 6 se realizaron las necropsias y lavado broncoalveolar (BAL) para valorar la fórmula leucocitaria. El análisis estadístico de datos se realizó mediante one-way ANOVA con el test Bonferroni (media ± SEM) utilizando el programa GraphPad Software Inc. Siendo estadísticamente significativo (p 0,05).

Resultado: Control (tabla). En el BAL solo se observa aumento de células inflamatorias en el grupo EPOC sin tratamiento.

		Control	Dexametasona	EPOC	EPOC+Dexametasona
Penh	Día 0	0,78±0,12	0,73±0,18	0,71±0,06	0,79±0,17
	Día 6	0,64±0,081	0,71±0,19	1,37±0,18*	0,84±0,24

SUV	Día 0	0,65±0,25	0,61±0,38	0,65±0,19	0,72±0,26
	Día6	0,69±0,28	0,74±0,11	1,44±0,38*	0,69±0,44

*p 0,05.

Conclusiones: El PET/CT con ^{18}F -FDG es útil para diagnóstico y seguimiento animal en modelos murinos de inflamación pulmonar. A dosis altas, los corticoides no influyen en la calidad de imagen.