



67 - VALORACIÓN Y CORRELACIÓN DE MARCADORES DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO CON EL PET CEREBRAL CON 18F-FLORBETAPIR EN PACIENTES CON DETERIORO COGNITIVO

M. Ysamat¹, J.M. González¹, C. Lorenzo², P. Pastor³, M. Aguilar³, I. Álvarez³, J.P. Tartari³, M. Almería³ y S. Arribas³

¹Centre de Tecnología Diagnòstica. Hospital Universitari Mútua Terrassa. Cetir-Eresa. Barcelona. ²Servicio Medicina Nuclear. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona. ³Servicio de Neurología. Hospital Universitari Mútua Terrassa. Barcelona.

Resumen

Objetivo: Validación y correlación de marcadores de líquido cefalorraquídeo (mLCR) con el PET de amiloide con 18F-florbetapir (PET) y establecimiento de puntos de corte para su utilización clínica.

Material y métodos: Se determinó A-beta-42, tau y p-tau en LCR y se realizó estudio PET con 18F-florbetapir a un grupo de pacientes con deterioro cognitivo ligero ($n = 45$), demencia leve ($n = 10$) y moderada ($n = 7$).

Resultado: El PET fue positivo en 33 p (PET+, 53,3%), negativo en 23 p (PET-, 37%) y no concluyente en 6 p (PET+/-, 9,7%). Considerando la positividad del PET, los puntos de corte de acuerdo con valores óptimos de sensibilidad (S) y especificidad (E) fueron: A-beta-42: 535 (S: 55%, E: 78%), tau: 532 (S: 76%, E: 82%), p-tau: 89 (S: 71%, E: 82%) y tau/A-beta-42: 0,58 (S: 91%, E: 82%). La comparación de medias de mLCR mostró diferencias significativas mayoritariamente entre PET- y PET+ ($p < 0,0001$) (media, IC-95%): A-beta-42: PET+ = 545,4 (130-1076), PET+/- = 905,3 (559-1459), PET- = 991,7 (319-1724), tau: PET+ = 833,5 (142-2186), PET+/- = 525,5 (394-752), PET- = 358,8 (126-900), p-tau: PET+ = 107,6 (21-220), PET+/- = 72,8 (48-93), PET- = 58,7 (20-117). Observamos una fuerte correlación de tau con p-tau ($R^2 = 0,86$) y moderada entre tau/A-beta-42 con tau ($R^2 = 0,70$) y tau/A-beta-42 con p-tau ($R^2 = 0,56$).

Conclusiones: Para el uso clínico de mLCR es necesaria la validación interna. Los marcadores más predictivos de depósitos fibrilares de amiloide fueron tau y p-tau, seguidos de tau/A-beta-42 y de la A-beta-42. El PET+/- se asocia a valores intermedios en mLCR de tau y p-tau.