



Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular



P-26 - INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE PRECURSOR Y DE LA TEMPERATURA DE REACCIÓN EN EL RENDIMIENTO RADIOQUÍMICO DE LA SÍNTESIS DEL RADIOFÁRMACO PET ^{11}C -PIB

M. de Arcocha-Torres, I. Banzo-Marraco, I. Martínez-Rodríguez, R. Quirce-Pisano, J. Jiménez-Bonilla, A. Rubio-Vassallo, N. Martínez-Amador y J.M. Carril

Servicio de Medicina Nuclear. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Universidad de Cantabria. Santander.

Resumen

Objetivos: Determinar la influencia de la concentración de precursor y de la temperatura de reacción en el rendimiento radioquímico de la síntesis del radiofármaco PET ^{11}C -PIB

Material y métodos: La síntesis del ^{11}C -PIB se lleva a cabo mediante la metilación con triflato de metilo del precursor 6-OH-BTA-0. En primer lugar, se determinó la influencia de la concentración del precursor, para lo cual se llevaron a cabo 3 series de 3 síntesis radioquímicas cada una con las siguientes concentraciones del precursor 6-OH-BTA-0; 0,5 mg, 1 mg y 1,5 mg, disueltos en 400 ml de acetona anhidra a temperatura ambiente (25°C). Una vez determinada la concentración de precursor con la que se obtuvo un mayor rendimiento radioquímico, se llevó a cabo el estudio de la influencia de la temperatura de reacción realizando 3 series de síntesis cada una a temperaturas distintas; 25°C , 60°C , 80°C y 100°C .

Resultados: Se muestran en las tablas.

Tabla 1. Rendimiento radioquímico medio obtenido en la tres síntesis realizadas con cada una de las concentraciones de precursor empleadas

Concentración precursor (mg/400 ml)	Rendimiento (%)	Rango
0,5	$23,4 \pm 0,66$	23-24,2
1	$27,6 \pm 0,41$	27,3-28,1
1,5	$24,8 \pm 0,43$	24,3-25,1

Tabla 2. Rendimiento radioquímico medio obtenido en la tres síntesis realizadas con cada una de las temperaturas de reacción empleadas

Temperatura reacción (°C)	Rendimiento (%)	Rango
25	$27,6 \pm 0,41$	27,3-28,1
60	$28,16 \pm 0,20$	28-28,4
80	$32,4 \pm 1,21$	31,1-33,5
100	$28,7 \pm 0,36$	28,6-29,1

Conclusiones: El mejor rendimiento de síntesis para la obtención del radiofármaco ¹¹C-PIB se obtiene cuando se emplea 1 mg del precursor 6-OH-BTA-0 y la reacción química se lleva a cabo a una temperatura de 80 °C.