

Índice de materias

Adultos mayores

El tratamiento fisioterapéutico ¿es efectivo en el mantenimiento físico y en la reducción del declive cognitivo de las demencias? (Christofolletti G, et al), 2008;11(1):11-6.

Alteración linfática y venosa

Caso clínico de síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber (Bernal Márquez M, et al), 2008;11(2):93-7.

Ancianos

Efectividad del uso combinado de varias escalas para medir el riesgo de caídas en ancianos (Aceituno Gómez J), 2008;11(2):60-7.

Balneología

La fisioterapia en los centros de agua urbanos (Molina Rueda F, et al), 2008;11(2):98-105.

Caídas

Efectividad del uso combinado de varias escalas para medir el riesgo de caídas en ancianos (Aceituno Gómez J), 2008;11(2):60-7.

Calcaneodinia

Telalgia. Revisión bibliográfica (Bravo Acosta T, et al), 2008;11(1):26-31.

Calidad percibida

Calidad percibida en la fisioterapia de atención primaria: situación y oportunidades de mejora en la atención a la cervicalgia (Meseguer Henarejos AB), 2008;11(2):68-80.

Cervicalgia

Calidad percibida en la fisioterapia de atención primaria: situación y oportunidades de mejora en la atención a la cervicalgia (Meseguer Henarejos AB), 2008;11(2):68-80.

Demencia

El tratamiento fisioterapéutico ¿es efectivo en el mantenimiento físico y en la reducción del declive cognitivo de las demencias? (Christofolletti G, et al), 2008;11(1):11-6.

Dolor de espalda

Lumbalgia. Prevalencia y programas preventivos en la infancia y adolescencia (Cardoso Ribeiro C, et al), 2008;11(1):32-8.

Enfermedad de Parkinson

Programa de fisioterapia mejora a largo plazo las habilidades motoras en pacientes con enfermedad de Parkinson (Gago Fernández I, et al), 2008;11(2):81-92.

Equilibrio

El tratamiento fisioterapéutico ¿es efectivo en el mantenimiento físico y en la reducción del declive cognitivo de las demencias? (Christofolletti G, et al), 2008;11(1):11-6.

Escala de valoración UPDRS

Programa de fisioterapia mejora a largo plazo las habilidades motoras en pacientes con enfermedad de Parkinson (Gago Fernández I, et al), 2008;11(2):81-92.

Escalas

Efectividad del uso combinado de varias escalas para medir el riesgo de caídas en ancianos (Aceituno Gómez J), 2008;11(2):60-7.

Esclerosis múltiple

Actividad acuática adaptada en el tratamiento rehabilitador interdisciplinario de la esclerosis múltiple (Sánchez Pous S, et al), 2008;11(1):3-10.

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

Programa "Essentials": innovación docente en fisioterapia (Valeara Garrido F, et al), 2008;11(2):51-9.

Espolón calcáneo

Telalgia. Revisión bibliográfica (Bravo Acosta T, et al), 2008;11(1):26-31.

Estrés

Conceptos de estrés relacionados con fisioterapia (Corral de Eusebio B), 2008;11(1):39-47.

Evaluación de la calidad

Calidad percibida en la fisioterapia de atención primaria: situación y oportunidades de mejora en la atención a la cervicalgia (Meseguer Henarejos AB), 2008;11(2):68-80.

Fascitis plantar

Telalgia. Revisión bibliográfica (Bravo Acosta T, et al), 2008;11(1):26-31.

Fisioterapia

Calidad percibida en la fisioterapia de atención primaria: situación y oportunidades de mejora en la atención a la cervicalgia (Meseguer Henarejos AB), 2008;11(2):68-80.

Conceptos de estrés relacionados con fisioterapia (Corral de Eusebio B), 2008;11(1):39-47.

La fisioterapia en los centros de agua urbanos (Molina Rueda F, et al), 2008;11(2):98-105.

Programa de fisioterapia mejora a largo plazo las habilidades motoras en pacientes con enfermedad de Parkinson (Gago Fernández I, et al), 2008;11(2):81-92.

Funciones cognitivas

El tratamiento fisioterapéutico ¿es efectivo en el mantenimiento físico y en la reducción del declive cognitivo de las demencias? (Christofolletti G, et al), 2008;11(1):11-6.

Hidroterapia

Actividad acuática adaptada en el tratamiento rehabilitador interdisciplinario de la esclerosis múltiple (Sánchez Pous S, et al), 2008;11(1):3-10.

La fisioterapia en los centros de agua urbanos (Molina Rueda F, et al), 2008;11(2):98-105.

Higiene postural

Lumbalgia. Prevalencia y programas preventivos en la infancia y adolescencia (Cardoso Ribeiro C, et al), 2008;11(1):32-8.

Índice de materias

108 Hipertrofia de tejidos

Caso clínico de síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber (Bernal Márquez M, et al), 2008;11(2):93-7.

Institucionalización

El tratamiento fisioterapéutico ¿es efectivo en el mantenimiento físico y en la reducción del declive cognitivo de las demencias? (Christofolletti G, et al), 2008;11(1):11-6.

Lesión tendinosa

Flexores. Avances en fisioterapia (Cantero Téllez R), 2008;11(1):17-25.

Mancha vascular cutánea

Caso clínico de síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber (Bernal Márquez M, et al), 2008;11(2):93-7.

Metodología docente

Programa "Essentials": innovación docente en fisioterapia (Valeara Garrido F, et al), 2008;11(2):51-9.

Movilidad

Actividad acuática adaptada en el tratamiento rehabilitador interdisciplinario de la esclerosis múltiple (Sánchez Pous S, et al), 2008;11(1):3-10.

Movilización inmediata

Flexores. Avances en fisioterapia (Cantero Téllez R), 2008;11(1):17-25.

Niños

Lumbalgia. Prevalencia y programas preventivos en la infancia y adolescencia (Cardoso Ribeiro C, et al), 2008;11(1):32-8.

Prevención

Lumbalgia. Prevalencia y programas preventivos en la infancia y adolescencia (Cardoso Ribeiro C, et al), 2008;11(1):32-8.

Psicosomático

Conceptos de estrés relacionados con fisioterapia (Corral de Eusebio B), 2008;11(1):39-47.

Rehabilitación

Actividad acuática adaptada en el tratamiento rehabilitador interdisciplinario de la esclerosis múltiple (Sánchez Pous S, et al), 2008;11(1):3-10.

Flexores. Avances en fisioterapia (Cantero Téllez R), 2008;11(1):17-25.

Salud para la salud

Lumbalgia. Prevalencia y programas preventivos en la infancia y adolescencia (Cardoso Ribeiro C, et al), 2008;11(1):32-8.

Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber

Caso clínico de síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber (Bernal Márquez M, et al), 2008;11(2):93-7.

Sistema de evaluación

Programa "Essentials": innovación docente en fisioterapia (Valeara Garrido F, et al), 2008;11(2):51-9.

Telalgia

Telalgia. Revisión bibliográfica (Bravo Acosta T, et al), 2008;11(1):26-31.

Tratamiento fisioterapéutico

El tratamiento fisioterapéutico ¿es efectivo en el mantenimiento físico y en la reducción del declive cognitivo de las demencias? (Christofolletti G, et al), 2008;11(1):11-6.

Valoración

Efectividad del uso combinado de varias escalas para medir el riesgo de caídas en ancianos (Aceituno Gómez J), 2008;11(2):60-7.