



IMÁGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA

Neoplasia maligna palpebral

Malignant neoplasm of eyelid

René Hernán Parada Vásquez



Residente de tercer año de Oftalmología, Escuela Superior de Oftalmología, Guatemala, Guatemala

Paciente de 67 años que refiere que hace 2 años se le había realizado la extirpación de un lunar en el párpado inferior del ojo derecho; posteriormente refiere el crecimiento de la lesión.

En el examen físico (fig. 1) se observa lesión ulcerada, extensa, con bordes sobreelevados, que ocupa el párpado inferior, la región cantal interna y la pirámide nasal, con compromiso del punto lagrimal inferior. En el segmento anterior: en el ojo derecho se observa pterigión nasal GII y queratitis epitelial punctata; resto, sin alteraciones.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. El autor declara que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. El autor declara que ha seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.



Figura 1 Lesión extensa de párpado inferior, canto interno y pirámide nasal.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. El autor ha obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

Correo electrónico: rene.hernan@hotmail.com

<http://dx.doi.org/10.1016/j.mexoft.2015.07.004>

0187-4519/© 2015 Sociedad Mexicana de Oftalmología. Publicado por Masson Doyma México S.A. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Financiamiento

El autor no recibió patrocinio para llevar a cabo este artículo.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener ningún conflicto de intereses.