

pacientes habían fallecido en el momento de realización del estudio.

Discusión/Conclusiones: La derivación de pacientes esplenectomizados para vacunación en nuestro centro es superior a la de otros estudios consultados. No obstante, contamos con un alto porcentaje de vacunados de forma incompleta según las recomendaciones actuales, debido a la cual valoraremos un rescate de estos pacientes para actualizar su calendario vacunal.

Palabras clave: Esplenectomía; Programas de inmunización; Cobertura de vacunación

<https://doi.org/10.1016/j.vacun.2019.08.016>

IO-58

Vacunación de la gripe en trabajadores de un hospital de tercer nivel: ¿qué estrategias se asocian con mayores coberturas?



G. Mena Pinilla, I. Casas García,
R.M. Guerola Fernández, M.G. Esteve Pardo

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol,
Badalona, Barcelona, España

Objetivos: Identificar la asociación entre coberturas de vacunación antigripal en el personal sanitario con las estrategias de promoción de la vacuna en el hospital durante las últimas siete temporadas.

Material y métodos: Se describieron las estrategias y coberturas desde la campaña 2013–2014 hasta la del 2018–2019. Se analizó el porcentaje de trabajadores vacunados por categoría laboral. Se compararon las coberturas del hospital con las alcanzadas en los centros sanitarios de la comunidad autónoma.

Resultados: La cobertura de vacunación antigripal ha alcanzado un máximo de un 30,4% durante la temporada 2018–2019. Las categorías con mayor proporción de vacunados fueron la de los facultativos y la de los MIR, con un máximo de vacunados del 49,8% durante la temporada 2018–2019. Las categorías con menor proporción de vacunados fueron la de los auxiliares de enfermería y la de los celadores, alcanzando mínimos del 6,1% (2012–2013) y del 4,2% (2013–2014). Las estrategias empleadas en campañas con coberturas superiores a la media de la comunidad autónoma fueron la implantación de una unidad móvil de vacunación (médico-enfermera) que se desplazaba a todos los servicios del hospital, la difusión de la campaña a través de la intranet y sesiones *ad-hoc*, así como el sistema de incentivos.

Discusión/Conclusiones: La facilitación al acceso de la vacuna de la gripe a todo el personal, en combinación con estrategias de promoción multicomponente, se asocian a mejores coberturas. Ante la dificultad del estudio de efectividad de las estrategias por separado, se plantea un análisis de aceptación de estas en próximas temporadas, con especial atención a las categorías con menor porcentaje de vacunados.

Palabras clave: Personal sanitario; Gripe; Vacuna

<https://doi.org/10.1016/j.vacun.2019.08.017>

IO-59

¿Cómo se enfrentan los sanitarios a las reticencias vacunales?



M. González Jiménez¹, J. Torres Puig-gros¹,
P. Estany Almirall², G. Mirada Masip¹

¹ Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, Universitat de Lleida. Agència de Salut Pública de Catalunya, Departament de Salut, Lleida, España

² Institut Català de la Salut, Catalunya, España

Objetivos: Conocer cómo los sanitarios identifican y afrontan las reticencias a la vacunación (RV).

Material y métodos: Encuesta transversal (marzo de 2019) a enfermeras y médicos del centro de salud de Tàrrega (Lleida). Las variables fueron: profesión, edad, consideración sobre la eficacia y seguridad de las vacunas, opinión sobre la formación en vacunas, conocer los diferentes discursos de los RV y estrategias para contrarrestarlas.

Resultados: Respondieron la encuesta el 80% (16/20); el 68,8% (11) eran enfermeras/os y el 50% (8) tenían de 36 a 45 años de edad. El 68,8% (11) consideraron las vacunas eficaces y seguras, el 56,3% (9) opinaban que poseían una buena formación en vacunas, el 81,3% (13) conocían los discursos de los RV. Las estrategias propuestas para contrarrestar las reticencias fueron múltiples (mensajes basados en la evidencia científica —argumentos—, materiales educativos, herramientas interactivas y otros). Ante el discurso «prefiero que los hijos pasen la enfermedad de manera natural», el argumento más utilizado por los sanitarios (37,5% [6]) fue la protección de las personas que no se han podido vacunar, argumento también más utilizado (43,8% [8]) ante los que esgrimen «poblaciones vacunadas no tiene mayor protección». Ante el discurso «los componentes de las vacunas son tóxicos» el argumento más empleado fue (37,5% [6]) que los beneficios de la vacunación superan a los riesgos. No se observó asociación entre la profesión y la edad con el resto de variables.

Discusión/Conclusiones: Afrontar la RV requiere un buen conocimiento de los discursos de los reticentes y una estrategia multifactorial.

Palabras clave: Vacunación; Reticencia vacunal; Profesionales sanitarios

<https://doi.org/10.1016/j.vacun.2019.08.018>

IO-60

Seguridad del paciente: incidentes en el proceso de vacunación en atención primaria



E. Suárez Magaña¹, P. Estany Almirall¹,
G. Mirada Masip²

¹ Institut Català de la Salut, Atenció Primària àmbit Lleida, Lleida, España

² Agència de Salut Pública de Catalunya, Departament de Salut, Catalunya, España

Objetivo: Analizar la notificación de incidentes (NI) relacionados con la seguridad del paciente en el proceso de vacunación de 23 centros de atención primaria (AP) entre junio de 2015 y mayo de 2019.