

C0015 UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS; VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE RIESGO

Itziar Iturralde Orive¹, Marina Sanchez de Medina²

¹Hospital Universitario Cruces, Osakidetza, Bizkaia, España

²Enfermera Infectología Pediátrica, HU Cruces, Bizkaia, España

Objetivos

La vacunación antigripal en los grupos pediátricos de riesgo debiera ser prioritaria y estar en el foco de atención de todos los profesionales sanitarios.

El objetivo de esta investigación es evaluar si todos los profesionales sanitarios están implicados en la vacunación antigripal de éstos y si su recomendación activa consigue aumentar la adhesión.

Metodología

Estudio analítico experimental prospectivo de pacientes de distintas categorías de riesgo atendidos en las consultas de especialidades pediátricas de un hospital terciario.

Estas categorías fueron seleccionadas por existir censos actualizados.

Diabetes mellitus

Fibrosis Quística

Trasplante hepático

Trasplante renal

Patología nefrourológica con inmunodepresión

Se comprobó estado vacunal a mitad de campaña, realizando dos clases de intervención;

1. Pacientes diabéticos; información a sus especialistas de pacientes no inmunizados
2. En los 3 últimos grupos; los pacientes no inmunizados recibieron una recomendación activa por parte de Infectología Pediátrica mediante llamada telefónica personalizada

Al finalizarla campaña se re-comprobó el estado vacunal

Conclusiones

Los resultados fueron los siguientes

Patología	Nº pacientes	% Vacunación antigripal 30/10/24	Nº pacientes vacunados tras intervención 30/03/25	% total de vacunación 30/03/25	Incremento vacunal
Diabetes mellitus tipo I	184	29.34%	25	42.93%	13.59%
Fibrosis quística	75	88.88%	6	96%	7.12%
T. Hepático	5	0%	4	80%	80%
T. Renal	48	62.5%	12	87.5%	25%
Patología renal con inmunosupresión	25	40%	8	72%	32%

Recomendaciones

Los resultados obtenidos evidencian que:

Es más correcto ofrecer datos de vacunación antigripal por patología específica

Existe una diferente sensibilización en este tema según patología y especialistas

La recomendación activa de vacunación por parte de un profesional sanitario aumenta su aceptación y aumenta las coberturas vacunales.

Todos los profesionales tienen una responsabilidad en la protección de sus pacientes frente a la gripe.

Es importante trabajar en la elaboración de un censo que identifique la población de riesgo para garantizar la protección frente a gripe y otras patologías

doi:10.1016/j.vacun.2025.500522

C0017 2X1. LA IMPORTANCIA DE LAS SINERGIAS; INMUNIZACIÓN FRENTE A VIRUS RESPIRATORIO SINICIAL (VRS) Y GRIPE EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA

Itziar Iturralde Orive¹, Marina Sanchez De Medina², Ines Urruticoechea Garcia³, Imanol Urreta Juarez³

¹Infectología Pediátrica, Hospital universitario de Cruces, Bizkaia, España

²Enfermería infectología pediátrica, Hospital Universitario de Cruces, Bizkaia, España

³MIR Pediatría, Hospital universitario de Cruces, Bizkaia, España

Objetivos

La inmunización frente a VRS en población pediátrica presenta una aceptación elevada (superior al 90%), no así la vacunación antigripal (cobertura vacunal media en España el año pasado 36.1%)

Ambas estrategias coinciden prácticamente en el tiempo

El objetivo es valorar si, la recomendación activa por parte del personal sanitario de la vacunación antigripal aprovechando el acto de inmunización con Nirsevimab aumenta la adhesión a la vacunación antigripal en estos pacientes.

Metodología

Estudio analítico experimental prospectivo que incluyó a todos los menores inmunizados en septiembre con Nirsevimab en la consulta de Infectología Pediátrica de un hospital terciario

Las familias recibieron en ese momento recomendación activa sobre la vacunación antigripal y el inicio en octubre de su campaña.

Resultados

134 pacientes de riesgo fueron inmunizados en Infectología pediátrica frente a VRS

Prematuros; 81

33-35 semanas de gestación: 36 pacientes

<33 semanas de gestación: 45 pacientes

Menores de 24 meses con patología de riesgo; 53

Al finalizar la campaña, se comprobó el cumplimiento de nuestra intervención:

Prematuros; 71

31 RNPT 33-35 semanas de gestación (86,11%)

40 RNPT < 33 semanas de gestación (88,88%)

Menores de 24 meses con patología de riesgo 49 (92,45%)

El **89,55%** de los pacientes inmunizados frente VRS en esta consulta están correctamente protegidos frente a la gripe (porcentaje más del doble que el obtenido en el resto de población pediátrica de nuestra comunidad)

Recomendaciones

Estos datos deben invitar a las autoridades competentes a la reflexión para que, en futuras temporadas, diseñen una estrategia en la que ambas campañas vayan de la mano, ya que las 2 campañas vacunales se desarrollan en el mismo lapso y están dirigidas a un mismo grupo poblacional. De este modo, el profesional sanitario