

(33,3% en el grupo de 6-59 meses). En el resto de grupos etarios, ninguno había sido vacunado.

En la 2024-2025, 65,0% fueron por gripe A y 35,0% por gripe B. En 19 hubo coinfección viral (30,1%). 29,3% había recibido la vacuna antigripal (30,2% en el grupo de 6-59 meses, 29,2% en el de 5-9 años).

Las coberturas vacunales en niños de 1-5 años hospitalizados fueron significativamente menores que las de la población general de esa edad en ambas temporadas (51,7% y 50,4% respectivamente).

Conclusiones / Recomendaciones

A pesar del número de ingresos por gripe, esta enfermedad sigue siendo percibida socialmente y por algunos sanitarios como una infección leve, lo que contribuye a subestimar la importancia de la vacunación y a que las coberturas vacunales sigan siendo mejorables.

La concienciación sobre la gravedad de la gripe, a la que puede contribuir la difusión de los resultados de este estudio, junto a la promoción de la vacunación, siguen siendo fundamentales para aumentar coberturas.

doi:[10.1016/j.vacun.2025.500608](https://doi.org/10.1016/j.vacun.2025.500608)

C0163 ANÁLISIS DE LAS COBERTURAS VACUNALES EN PERSONAS CON TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO (TOS) EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Roberto Botella Mira¹, Rocio Gregori Illueca², Eulalia Gregori García³, Laura Rioja Rioja⁴, Juan Juaneda⁵, Ana Míguez Santiyá⁴

¹Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario del Vinalopó, Elche, España

²Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital Universitario Politécnico La Fè, Valencia, España

³Servicio de Medicina Preventiva, Hospital General Universitario de Castellón, España

⁴Servicio de Vacunación e Inmunización Sistemática en Grupos de Riesgo, Dirección General de Salud Pública, Valencia, España

⁵Dirección General de Salud Pública, Comunidad Valenciana, España

Objetivos

Estimar el grado de cumplimiento de la vacunación recomendada en personas con trasplante de órgano sólido (TOS) en la Comunidad Valenciana.

Método

Estudio descriptivo que incluyó a todas las personas con diagnóstico activo de TOS (según codificación CIE-10) en la historia clínica ambulatoria desde 1996 hasta agosto de 2024. Se excluyeron aquellas con SIP inactivo o exitus registrado. Los datos de vacunación se extrajeron del registro nominal vacunal autonómico. Se analizaron sexo, edad, tipo de trasplante y estado vacunal frente a neumococo, herpes zóster, gripe y COVID-19. El estado vacunal se clasificó como completo, incompleto o no administrado según los protocolos vigentes. Se estratificó por grupos de edad para explorar la influencia de esta variable en las coberturas. El análisis se realizó con el software estadístico R (versión 4.3.1).

Resultados

Se incluyeron 5.061 pacientes: 64% hombres y 36% mujeres, mediana de edad de 63 años (RIQ: 54–71). El trasplante más frecuente fue el renal (57%), seguido del hepático (24%), combinados (6,6%), cardíaco (6,4%) y pulmonar (4,8%). La vacunación frente a neumococo fue completa en el 57%, incompleta en el 16,1% y no

administrada en el 25%. Un 60,1% no recibió vacunación frente a herpes zóster; el 35% tenía pauta completa y el 4,9% incompleta. En la campaña 2024–25, el 64% se vacunó frente a gripe y el 53% frente a COVID-19. Se observaron diferencias significativas en la cobertura vacunal en función del grupo de edad.

Conclusiones / Recomendaciones

La infravacunación en personas con TOS concuerda con lo descrito en la literatura internacional. Este estudio aporta datos relevantes en un grupo para el que habitualmente no se dispone de denominadores poblacionales, ofreciendo una estimación orientativa extrapolable a otras regiones.

Las coberturas vacunales en personas con TOS presentan márgenes de mejora, lo que subraya la necesidad de reforzar estrategias de captación en este grupo.

doi:[10.1016/j.vacun.2025.500609](https://doi.org/10.1016/j.vacun.2025.500609)

C0164 EVOLUCIÓN EN LA DERIVACIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDADES INFLAMATORIAS MEDIADAS POR LA INMUNIDAD A LA CONSULTA DE VACUNACIÓN

Émely García Carrasco, Carmen Medina Bailón, Aitana Carla Morano Vázquez, María Mercedes Aguilar Basterra, Guillermo Yovanny Ordoñez León, Nieves López Fresneña

Servicio de Medicina Preventiva, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

Objetivos

Describir la evolución de la derivación de los pacientes con enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad a la consulta de vacunación de nuestro centro.

Método

Estudio descriptivo de corte-transversal de los pacientes con enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad derivados a la consulta de vacunación del Servicio de Medicina, realizadas desde enero de 2021 a enero 2025. El registro de la actividad asistencial se realizó en una base de datos para este fin. Las variables de estudio fueron sexo, fecha de nacimiento, prestación de la consulta, servicio que deriva, fecha de la consulta. Los porcentajes y frecuencias se calcularon utilizando el paquete de Microsoft Office y el programa estadístico SPSS 26®.

Resultados

Del total de 4.994 consultas realizadas, 1.344 han sido primeras y 3.650 sucesivas, de las cuales 2.814 fueron presenciales y 836 telefónicas. Los servicios que con mayor frecuencia derivan pacientes a nuestra consulta fueron Reumatología, seguidos de Aparato Digestivo, Farmacia y Dermatología.

El año con mayor derivación de pacientes fue 2022 con 390 nuevos, seguido de 2024 con 377 y 2023 con 252 pacientes nuevos. La media de edad de los pacientes fue de 51,4 años, mínima de 16 y máxima de 89,7. El 42,3% (N=569) fueron hombres y el 57,7% (N=775) fueron mujeres.

Recomendaciones

Al igual que aumenta el uso de fármacos inmunosupresores como los biológicos o inmunomoduladores, se observa un aumento progresivo de las derivaciones de pacientes con EIMI a nuestra consulta. Por lo que es fundamental mantenernos actualizados con