

Novedades Avent

La compañía Avent, dedicada a comercializar sistemas de alimentación infantil, presenta los nuevos esterilizadores eléctricos y de microondas, así como el calienta biberones y comida.

Las características de los productos son:

- **Esterilizador Eléctrico Expres.** Es capaz de esterilizar 6 biberones Avent en aproximadamente 8 min. Con 90 ml de agua del grifo puede eliminar todos los gérmenes gracias al intenso calor del vapor.
- **Esterilizador a Vapor de Microondas Expres.** Ofrece los mismos beneficios que la esterilización a vapor si se utiliza un microondas convencional. Se pueden esterilizar 4 biberones usando 200 ml de agua.
- **Calienta Biberón y Comida Expres.** Puede calentar los biberones Avent en 4 min. Contiene, además, un tarrito conservero de 125 ml y una cuchara.



Novedades de Laboratorios SVR



Laboratorios SVR nos comunica sus últimas novedades en el mercado farmacéutico:

- **Xerial Visage.** Emulsión hidrolipídica de larga duración destinada a las pieles secas, sensibles, o sometidas a agresiones climáticas o medicamentosas. Asocia una galénica innovadora y una fórmula completa con un poder hidratante intenso, emoliente y relipidante.
- **Spirial Gel.** El primer gel espumante desodorante, destinado a las pieles sensibles y sujetas a sudación excesiva. Inhibe los olores molestos. El nuevo principio activo quitosán resulta más eficaz, menos irritante y, por tanto, mejor tolerado. También posee una gran acción bacteriostática.
- **Spirial Roll-On.** Tratamiento antitranspirante desodorante especialmente adaptado para axilas y pliegues. Además de su galénica roll-on, su poder antitranspirante se ha reforzado con 2% de trietil citrato, que tiene poder desodorante y calmante gracias al 0,3% de alantoína (no alergizante).

Xerial Visage
Emulsión de 50 ml
CN 237909

Spirial Gel
Gel de 125 ml
CN 350678

Spirial Roll-On
Esfera dosificadora
de 75 ml
CN 350629



Saforelle, jabón para la higiene íntima

Farmadiet Group Holding (FDG) y Laboratoires IPRAD presentan *Saforelle*, un jabón líquido suave para la higiene íntima que ofrece una buena solución para combatir las infecciones ginecológicas, ya que está especialmente indicado para la higiene íntima y de las pieles sensibles y delicadas.

El pH 8 (alcalino suave) de *Saforelle* respeta la flora bacteriana vaginal y protege las mucosas de posibles infecciones como la micosis, ya que los hongos no pueden desarrollarse en medios alcalinos. Además, gracias a su fórmula hipoalergénica, puede utilizarse a diario.

Saforelle
Envase de 250 ml.

Novedades Kin para las encías y la halitosis

Laboratorios Kin presenta *Kin Forte Encías*, formulado con una original combinación de principios activos. Incorpora clorhexidina (0,05%), triclosán y una sal de cinc, que aporta la misma eficacia que



las clorhexidinas al 0,12% pero minimiza los efectos colaterales que éstas producen. Gracias a ello, se podrá emplear *Kin Forte Encías* hasta finalizar el tratamiento y evitar las tinciones que producen los tratamientos a base de clorhexidina al 0,12%.

Otra de las novedades que presenta

Laboratorios Kin es *Kin Spray Halitosis*. Formulado a base de peróxido de carbamida al 3%, este producto actúa directamente sobre el origen de la halitosis y no en los síntomas. El peróxido de carbamida presente en *Kin Spray*

Halitosis, al degradarse en la cavidad bucal, desprende elevadas concentraciones de oxígeno alterando el medio de vida de las bacterias responsables de la halitosis, y proporciona así una desaparición efectiva y duradera del mal aliento.



Kin Forte Encías
Enjuague de 500 ml
CN 155531

Kin Forte Encías
Pasta de 75 ml
CN 219196

Kin Spray Halitosis
Aerosol de 40 ml
CN 251496

Aloe Babé, nueva crema con propiedades protectoras y regeneradoras

Laboratorios Babé comunica el lanzamiento de su nuevo producto *Aloe Babé*, que con propiedades protectoras y regeneradoras, refresca, hidrata y suaviza todo tipo de pieles. *Aloe Babé* está especialmente recomendado para pieles

castigadas y agredidas por el sol, así como para pieles hipersensibles y reactivas. No contiene alcohol.

Este nuevo producto actúa como coadyuvante en dermatitis irritadas y foliculitis, y también está indicado para después de la exposición solar y para después de las depilaciones y del afeitado.



Aloe Babé
Envase de 300 ml
CN 265777

Ezor Gotas Orales en Solución



Lainco anuncia la comercialización de un nuevo laxante en gotas: *Ezor Gotas Orales en Solución*. Este nuevo producto está indicado para el alivio sintomático y ocasional del estreñimiento.

Fácilmente ajustable a la necesidad de cada persona al ser en gotas, estimula el peristaltismo del colon con acumulación de fluidos y electrolitos en el lumen intestinal.

Ezor Gotas Orales en Solución
Estuche con 1 frasco de 25 ml
CN 713560

Ezor Gotas Orales en Solución
Envase clínico con 100 frascos de 25 ml
CN 606301



Ampliación de la línea Arkocápsulas

Laboratorios Arkopharma continúan innovando en el campo de la fitoterapia con la ampliación de su conocida línea Arkocápsulas. En esta ocasión, han lanzado al mercado cuatro novedades importantes dentro del marco de los trastornos digestivos:

- **Alga Coralina.** De la familia de las rodophytas, posee un alto contenido en carbonato cálcico, que ejerce una acción neutralizante sobre los ácidos del estómago. Ideal para casos de acidez y ardor de estómago.
- **Angélica.** Planta en cuya raíz se concentra un aceite esencial de extraordinarias propiedades antiespasmódicas para casos de colitis, dolor abdominal o digestiones difíciles.
- **Rábano negro.** Su raíz contiene numerosos glucosinolatos, de propiedades hepatoprotectoras, coleréticas y colagogas que favorecen la síntesis y posterior vertido de las sales biliares. Al provocar, además, un ligero aumento de los movimientos peristálticos es un detoxificante ideal en casos de trastornos dispépticos asociados a estreñimiento.
- **Melisa.** Es una planta tradicionalmente conocida por sus virtudes sedantes y antiespasmódicas debidas a su aceite esencial, que le confiere ese agradable aroma a limón. Está recomendada en caso de trastornos digestivos de origen nervioso.

Alga Coralina
Envase de 50 cápsulas
CN en curso

Angélica
Envase de 50 cápsulas
CN 299321

Rábano negro
Envase de 50 cápsulas
CN 267799

Melisa
Envase de 50 cápsulas
CN 392753

NOTA IMPORTANTE

La información publicada en esta sección no ha sido contrastada por la redacción de OFFARM, que se limita a adaptar las notas de prensa recibidas a los criterios de estilo de la revista, por lo que los únicos responsables del contenido son las propias empresas. Para la inserción de las novedades farmacéuticas es imprescindible que las empresas interesadas envíen una nota de prensa que incluya: características generales del producto, tipo de presentación y código nacional.

...es un parche que se pega en el pecho y que el día siguiente ayuda a RESPIRAR 1000 veces más

Fluiorespira
PARCHES BALSÁMICOS

Aplicación sobre el pijama
Con eucalipto
Efecto descongestionante inmediato
Año a toda la noche

A PARTIR DE LOS DOS AÑOS.

Fluiorespira Parches Balsámicos.
Respira confluencia toda la noche

Zambon

Dos nuevos lanzamientos de la línea Fat Control



Tras el gran éxito obtenido con el lanzamiento de *Fat Control con Chitoclear*, Chefaro presenta esta temporada una línea completa de Fat Control, que incorpora dos importantes novedades:

- *Fat Control Triple Acción*. Es una innovadora fórmula, basada en los últimos avances en el control de peso, que reduce la absorción de grasa, ayuda a eliminar líquidos y toxinas y favorece un efecto de vientre plano.

- *Fat Control Saciante*. Pensado para aquellas personas que deseen controlar su apetito. Son comprimidos masticables ricos en ingredientes con alto poder saciante, que retrasan la sensación de vacío y proporcionan una rápida sensación de saciedad.

Fat Control Triple Acción
Caja de 30 comprimidos
CN 352906

Fat Control Saciante
Caja de 30 comprimidos masticables
CN 353722

Nuevo Cepillo Dental PHB Plus

Laboratorios PHB, especializados en salud bucodental, ha ampliado su gama de productos con el lanzamiento del nuevo *Cepillo Dental PHB Plus*.

Gracias a su mayor número de mechones (71

micromechones, más de 1.800 filamentos) el cepillo proporciona máxima eficacia en la eliminación de placa bacteriana y mayor precisión en la limpieza interdental. Su cabezal, redondeado y de pequeño tamaño, permite realizar una limpieza adecuada en las zonas más recónditas sin riesgo de lesiones. Consta, además, de un capuchón protector de los filamentos y mango ergonómico con sistema grip antideslizante.

Los filamentos de tynex tienen tres durezas distintas: sensible, suave y medio.

Cepillo Dental PHB Plus Sensible
CN 339853

Cepillo Dental PHB Plus Suave
CN 339861

Cepillo Dental PHB Plus medio
CN 338640



Nuevo formato de *Fluimucil*

Boost Healthcare ha lanzado un nuevo formato de *Fluimucil de 200 mg* comprimidos bucodispersables. Gracias al uso de las más avanzadas tecnologías para su fabricación, Fluimucil 200 mg bucodispersables se toma sin agua,

disolviéndose rápidamente en la boca, lo que facilita a su administración en personas que, por su actividad diaria, necesitan la máxima disponibilidad y comodidad posológica. Tres comprimidos al día, en el momento y lugar que mejor convengan a los pacientes, facilitan un correcto cumplimiento del tratamiento y la tranquilidad de una correcta adhesión a éste.

Por su acción integral, *Fluimucil 200 mg* bucodispersables facilita una mejor y más rápida recuperación de la actividad normal tras una infección respiratoria aguda, ya sea de origen viral o bacteriano. Está indicado en procesos catarrales y gripales que cursan con mucosidad, así como en otras afecciones respiratorias agudas como rinofaringitis, sinusitis y otitis, que se acompañan de sintomatología mucosa reaccional.

Fluimucil comprimidos bucodispersables
Envase de 200 mg
CN 808501



4.3.2.1. *en línea*, para controlar el peso

Arkopharma lanza su última gran novedad para el control de peso: *4.3.2.1. en línea*. En este novedoso producto, presentado en forma líquida, se combinan 10 plantas medicinales coadyuvantes en las dietas de control de peso, a saber:

- Cuatro plantas para eliminar la grasa acumulada: citrus, té verde, té de yunnan y guaraná, que favorecen la salida de las grasas acumuladas en los adipocitos para su posterior combustión, ejerciendo un efecto lipolítico y termogénico.
- Tres plantas para depurar: hinojo, apio y cebada, que gracias a su efecto diurético, ayudan a eliminar el exceso de líquidos retenidos en el organismo.
- Dos plantas para purificar: achicoria y mate que ejercen un efecto detoxificante al favorecer la filtración glomerular.
- Una planta para tonificar: la cola, una semilla que ejerce un efecto tonificante y defatigante, para contrarrestar el posible decaimiento originado con una dieta hipocalórica.

4.3.2.1. *en línea*
Envase de 200 ml



Innéov Masa Capilar

Desarrollado por Investigación Nutricional Nestlé & Investigación Dermatológica L'Oréal, *Innéov Masa Capilar* es el primer complemento alimenticio y estimulante capilar que asocia taurina y catequinas. Más que un simple aporte de nutrientes, este producto ha sido concebido para actuar en el bulbo y favorecer el nacimiento de un cabello espeso, denso y luminoso, reforzando así la masa capilar.

Innéov Masa Capilar está indicado en caso de deficiencia de la masa capilar ocasional o permanente, especialmente en caso de caída diaria y excesiva del cabello y cabellos finos, lacios y sin brillo.

Con *Innéov Masa Capilar*, desde los 3 meses se ralentiza la caída del cabello; a los 6 meses, la caída se ve significativamente frenada. También a partir de los 3 meses se obtiene una mejora significativa del volumen y del brillo del cabello.

Innéov Masa Capilar
Caja de 60 comprimidos en blíster
CN 305250

Línea Bergasol, gama de productos solares con un programa de bronceado en tres fases

Chefaro Española ha comenzado 2004 presentando nuevos productos y lanzamientos que causarán gran sensación en el mercado. Uno de ellos es Bergasol, una revolucionaria línea de productos solares que ofrece un completo programa de bronceado en tres fases (preparar, proteger y prolongar) para obtener un bronceado más seguro y duradero con la mínima exposición solar.

Además, por la compra de dos productos Bergasol, Chefaro regala un exclusivo pareo.



Dermablend Cosmética Correctiva

Barrera eficaz frente a todas las agresiones externas, la piel es el reflejo directo y visible de una buena salud. Por ello, cuando alteraciones temporales o definitivas la marcan, muchas personas sufren problemas psicológicos.

Por primera vez en Europa, Laboratorios Vichy lanza su línea Dermablend Cosmética Correctiva, que proporciona una cobertura inmediata y total de los defectos cutáneos, incluso los más graves. Además, mantiene la piel perfecta durante 16 horas, incluso en condiciones

extremas: transpiración, baños o roces.

Esta nueva línea se compone de los siguientes productos: *Corrector Tono Alto Poder Cubriente*, dos veces más opaco que un fondo de maquillaje clásico, y *Polvo Fijador*, que refuerza la duración del corrector.



Corrector Tono Alto Poder Cubriente

Tarro de 6 g con estuche
CN 219519

Polvo Fijador

Tarro de 35 g con estuche
CN 162966

Motiván baja a precio de referencia sus presentaciones

Todas las presentaciones de medicamento *Motiván*, indicado en el tratamiento antidepresivo de primera línea y con más de 10 años de experiencia, igualan su precio al nuevo precio de referencia, que ha entrado en vigor en enero de 2004.

Motiván ayuda a controlar los síntomas de la depresión y a evitar recaídas y hospitalizaciones, ahorrando, además, costes globales a la sociedad.

Motiván
Envase de
14 comprimidos
CN 767566
14,38 euros

Motiván
Envase de
28 comprimidos
CN 767574
28,76 euros

Motiván
Envase de
56 comprimidos
CN 858936
57,52 euros



Si fuera más pequeño lo perderías.



Disneumon Mentol

Fenilefrina

Despeja rápidamente la nariz tapada.



Solvay Pharma

No administrar más de tres días seguidos sin consultar con el médico.
No administrar a menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
IF 5614-03/03

Línea Korff Retinol + Tensilift Anti-Age Repair

De la investigación Korff nace Retinol + Tensilift Anti-Age Repair, una línea de productos para combatir los signos del envejecimiento, para usar como tratamiento diario o como tratamiento intensivo y devolver a la piel un aspecto luminoso, liso y joven.

Los productos que componen la gama son los siguientes:

- *Crema Lifting*

Antiarrugas Efecto Barrera. Para el rostro, esta crema es ideal como tratamiento diario y para utilizarla día y noche.

• *Crema Lifting Contorno de Ojos.* Con esta crema las arrugas y los signos de expresión aparecen atenuados y la piel del contorno de los ojos recupera la suavidad y la elasticidad. Es ideal como tratamiento diario, para utilizar día y noche.

• *Lift Kit Suero + Patch Regenerador Contorno de Ojos Acción Profunda.* Es un suero para aplicar con un patch transdérmico directamente sobre la zona del contorno de los ojos. Es ideal como tratamiento intensivo: en tan sólo 5 min alisa la piel y reduce visiblemente las arrugas y los signos de expresión. El resultado es una regeneración profunda de esta delicada zona, y una piel lisa, firme y luminosa.

**Crema Lifting
Antiarrugas Efecto
Barrera**

**Envase de 30 ml
sistema air-less.**

**Crema Lifting
Contorno de Ojos**

Tubo de 15 ml.

**Lift Kit Suero +
Patch Regenerador
Contorno de Ojos
Acción Profunda**

**Envase de 25 ml +
40 patch.**



Panadol.

paracetamol 1g



PARADOL 1000 mg. Sobres para succionar. Porcentaje mol. **COMPOSICIÓN.** Cada sobre contiene: Paracetamol (C₉H₉NO₂) 1000 mg, Excipiente: sacarina sódica 23 mg, sacarosa 993,1 mg, bicarbonato sódico, ácido cítrico anhidro, carbonato sódico, polidiona, aroma de limón y de naranja, e.s. **FORMA FARMACÉUTICA Y CONTEINIDOR DEL ENVASE.** Envase con 12 sobres de granulado a línea sencilla. **ACCIONES.** Analgésico y Antipirético. **TITULAR Y FABRICANTE.** Titular: STERLINGHEALTH CO. YCA, S.R.L. Calle de la Fuente, 3.2803 Madrid. Fabricante: SMITHKLINE BEECHAM, S.A. Avda de Alcalá, km. 25. ALCALÁ DE HENARRES (Madrid). **INDICACIONES.** Alivio del dolor leve o moderado, como dolores de cabeza y dentales. Esiado. Efeitos. **CONTRAINDICACIONES.** Alergia a alguno de sus componentes. Enfermedades hepáticas. **PRECAUCIONES.** No exceder de la dosis recomendada. Se aconseja consultar al médico paracetamol en tratamientos de más de 10 días. **INTERACCIONES.** Puede aumentar la toxicidad del cloranfenicol. En caso de tratamientos con anticoagulantes oales se puede administrar ocasionalmente como analgésico de elección. **ADVERTENCIAS.** En pacientes con insuficiencia hepática y renal, anemia, afecciones cardíacas o pulmonares, evitar tratamientos prolongados. Este preparado contiene 123,1 mg de sodio por sobre, lo que deberá tenerse en cuenta para las personas que deben controlar la cantidad de sal ingerida (dieta baja en sodio). Este medicamento contiene 993,1 mg de sacarosa por sobre, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos. Evitar alcohol y lactancia. Las mujeres en período de lactancia deben consultar al médico antes de tomar este medicamento. **IMPORTANTE PARA LA MUJER:** Si usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medio embudo durante el embarazo puede ser peligroso para el feto y el parto y debe ser vigilado por su médico. No se debe utilizar en niños sin consultar al médico. Debido a su capacidad de conductividad, no se han desecho. **POSOLUCIÓN.** Vía oral. Adultos: 1 sobre (1000 mg) 3 veces al día, pudiendo tomarse o no, o necesario a las 4 y 8 de cada día de dependiendo de la intensidad del dolor. Niños: Este preparado en sobres no se recomienda para uso en niños. La administración de este preparado está sujeta a la aparición de los síntomas dolorosos o fiebre, a medida que estos desaparezcan debe suspenderse la medicación. **INDICACIONES PARA LA CORRECCIÓN DE LA DISTORSIÓN DEL PREPARADO.** Vea el contenido de un sobre de PARADOL 1000 mg sobres e llévese a la boca en un uso de agua y obtendrá rápidamente una disolución del preparado con el fin de beber y saborear limón. Tómese mientras dura la línea sencilla. **SOBREDOSES.** La sintomatología por sobredosis incluye: mareos, vómitos, pérdida de apetito, fiebre y dolor abdominal. Si se ha ingerido una sobredosis de este producto rápidamente a un Centro Médico aunque no haya síntomas, ya que estos muy a menudo se manifiestan generalmente a partir del tercer día después de su ingestión. Se considere sobredosis de paracetamol la ingestión de una sola forma de más de 6 g (6 sobres) en adultos y más de 100 mg por kg de peso en niños. Puede ser en tratamiento con barbitúricos o alcoholicos crónicos pueden ser más susceptibles a la toxicidad de una sobredosis de paracetamol. El tratamiento consiste en aspiración y lavado gástrico, carbón activado oral administración intravenosa de N-Acetilcisteína a dosis adecuadas y, si es necesario, hemodiálisis. El período en que el tratamiento ofrece la máxima garantía de eficacia se encuentra dentro de las 12 horas siguientes a la ingestión de las sobredosis. **REACCIONES ADVERSAS.** Hepatotoxicidad con dosis altas o tratamientos prolongados, raramente pueden aparecer erupciones cutáneas y alteraciones sanguíneas. Si se observa cualquier reacción adversa no descrita anteriormente consulte con su médico farmacéutico. **CADUCIDAD.** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. **OTRAS PRECAUCIONES.** Panadol 500 mg comprimidos recubiertos, envase con 12 comprimidos. Panadol 500 mg comprimidos e líneas sencillas, envase con 12 comprimidos. **LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** TERCERO REVISED ACP 1996.

Bibliografía: 1. De-Kun Li, Lynn Liu, Roxana Odell. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and risk of miscarriage. *BMJ* Volume 327, 2. Daniel Siegel. Exploring the link between Gastrointestinal complications and Over-the-Counter Analgesic. *Current Issues and Considerations American Journal of Therapeutics* 7, 91-99 (2000).

Ampliación de las gamas Nuvo Dermo y Theavit Renova

Para prevenir y corregir la sequedad cutánea, Dermathea, División Dermatológica de Laboratorios Thea, amplía la gama Nuvo Dermo con el lanzamiento de dos productos para el cuidado diario de las pieles secas y atópicas: *Nuvo Dermo Crema* y *Nuvo Dermo Corporal*. Ambas son emulsiones relipidantes, hidratantes y antipruriginosas de acción prolongada, lo que representan un notable avance en el cuidado de las pieles secas, pruriginosas y atópicas, gracias a la incorporación en su fórmula de toda una serie de componentes destinados a corregir y prevenir el conjunto de manifestaciones que presentan este tipo de pieles.

Laboratorios Thea nos informa también de la ampliación de la gama Theavit Renova con el lanzamiento de *Theavit Renova Forte*, tratamiento intensivo de última generación que combate de forma intensa los signos del envejecimiento y fotoenvejecimiento cutáneo. Se trata de una emulsión gel-crema de textura muy ligera y rápida absorción muy enriquecida con sustancias renovadoras y antioxidantes. Está pensada para prevenir y corregir los signos del envejecimiento en pieles especialmente expuestas a situaciones de estrés oxidativo, a través de tres acciones específicas: renovadora, antirradicales libres y dermoprotectora.

Nuvo Dermo Crema
 Envase de 150 ml
 CN 169086

Nuvo Dermo Corporal
 Envase de 200 ml
 CN 169094

Theavit Renova Forte
 Envase dosificador air-less de 30 ml
 CN 39872



Paroxetina Bayvit EFG

NOMBRE DEL MEDICAMENTO Paroxetina Bayvit 20 mg comprimidos reabiertos EFG. Cada comprimido contiene 20 mg de paroxetina. **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS** Paroxetina pertenece al grupo farmacoterapéutico de los anti-depresivos. Mecanismo de acción: Es un inhibidor potente y selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS). Presenta baja afinidad por receptores colinérgicos, muscarínicos. Carece de propiedades hipotensoras y depresoras del SNC. **INDICACIONES** Tratamiento de la depresión. Tratamiento preventivo de las recaídas y recidivas de la depresión. Tratamiento de los trastornos obsesivo-compulsivos. Tratamiento del trastorno por ansiedad. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. **POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN** En Adultos: Depresión: Dosis recomendada, 20 mg/día. En pacientes que no respondan a la dosis de 20 mg, puede ser necesario aumentar la dosis con incrementos de 10 mg/día hasta máximo 50 mg/día. Trastornos obsesivo-compulsivos: Dosis recomendada, 40 mg/día. Iniciar el tratamiento con 20 mg con incrementos de 10 mg (cada semana). Puede ser necesario aumentar la dosis hasta 60 mg/día. Trastorno por ansiedad: Dosis recomendada, 40 mg/día. Iniciar el tratamiento con 10 mg/día, con incrementos de 10 mg (cada semana), de acuerdo con la respuesta obtenida. Puede ser necesario aumentar la dosis hasta 60 mg/día. Trastorno de fobia social: Dosis recomendada, 20 mg/día. Puede ser necesario aumentar la dosis, con incrementos de 10 mg (cada semana) hasta 50 mg/día. Trastorno de ansiedad generalizada: Dosis recomendada, 20 mg/día. Puede ser necesario aumentar la dosis, con incrementos de 10 mg hasta 50 mg/día. Se recomienda administrar paroxetina una vez al día, por la mañana (a primera hora), con algo de alimento. El comprimido se debe deglutir y no masticar. Se recomienda continuar el tratamiento hasta asegurarse que el paciente está libre de síntomas. Este período puede ser de varios meses en el caso de depresión, o más en los trastornos obsesivo-compulsivos y por ansiedad. El tratamiento debe continuarse al menos 3 meses (normalmente 6 meses) tras la respuesta clínica. Al finalizar el tratamiento, es recomendable suspender la terapia gradualmente debido a la posible aparición de reacción de retirada. La administración matutina de paroxetina no altera ni la calidad ni la duración del sueño, los pacientes suelen experimentar una mejora del sueño, medida que responde al tratamiento con paroxetina. **ANÁLISIS:** Las dosis iniciales recomendadas son las mismas que en el adulto. Esta dosis puede incrementarse gradualmente hasta 40 mg/día. **NIÑOS:** No se recomienda el empleo de paroxetina en menores de 18 años. **Advertencias:** Con insuficiencia renal o hepática. Los pacientes con insuficiencia renal o hepática grave o hepática grave muestran un aumento de la concentración plasmática, por lo que la dosis se debe reducir al límite inferior del rango terapéutico (20 mg). **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO** Inhibidores de la MAO: El tratamiento con paroxetina deberá iniciarse al menos 2 semanas después de finalizar el tratamiento con inhibidores de la MAO y la dosisación se aumentará hasta alcanzar la respuesta óptima. Paroxetina debe utilizarse con precaución en paciente en tratamiento con neurolépticos, ya que con esta combinación se han reportado casos con síntomas que sugieren Síndrome Neuroléptico Maligno. Manía: Se debe utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de manía. **Triptófano:** No se debe administrar conjuntamente paroxetina con medicamentos que contengan triptófano o sean precursores de la serotonina (L-tryptófano, oxitriptán). **Enfermedad Corónica:** Es necesario tomar las precauciones habituales en los pacientes con cardiopatías. **Epilepsia:** Debe emplearse con precaución en los pacientes epilépticos, paciente con antecedentes de epilepsia o historial de convulsiones. **COMBINACIONES:** El tratamiento debe interrumpirse en todo paciente que desarrolle crisis convulsivas. **GLAUCOMA:** Produce infrecuentemente miopía y debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. **Trastornos endocrinos:** En raras ocasiones se ha comunicado hiponatremia, predominantemente en pacientes ancianos que requiere al interrumpir el tratamiento. **Trastornos hepato-biliares:** Se ha notificado aumento de las enzimas hepáticas. Muy raramente también se han comunicado casos de hepatitis, algunas veces asociados con ictericia y/o insuficiencia hepática. La interrupción de la administración deberá considerarse si se detecta un aumento prolongado de los resultados de las pruebas de funcionalidad hepática. **Trastornos del sistema nervioso:** Se han recibido informes de trastornos extrapiramidales incluyendo distonias orofaciales, en pacientes que a veces padecen trastornos subyacentes del movimiento o en aquellos tratados con neurolépticos. **Alcohol:** No se recomienda tomar simultáneamente paroxetina y alcohol. **Trastornos hematológicos:** Se han descrito algunos casos de hemorragias con los ISRS. Debe tenerse en cuenta en aquellos pacientes que reciben concomitantemente anticoagulantes, fármacos que afectan la función plaquetaria o que puedan incrementar el riesgo de hemorragia. **INTERACCIONES:** La combinación con inhibidores no selectivos de la MAO está contraindicada. La absorción y farmacocinética de paroxetina no se modifican o disminuyen por: alimentos, antibióticos, digoxina, propranolol. **Uñas:** Debe realizarse con precaución debido al riesgo leve de síndrome serotoninérgico. El metabolismo y farmacocinética de paroxetina pueden estar afectados por la inducción o inhibición de enzimas metabolizantes. Cuando se administra conjuntamente con un inhibidor del metabolismo enzimático debe considerarse la administración de dosis del límite inferior del rango terapéutico. No se consideran necesarios ajustes iniciales de dosis cuando se administra conjuntamente con inductores metabólicos enzimáticos. La administración concomitante de paroxetina y antihipertensivos puede estar asociada a un mayor número de reacciones adversas. El uso concomitante de paroxetina con anti-depresivos tricíclicos y neurolépticos se debe realizar con precaución. Puede producirse una interacción entre paroxetina y triptófano dando como resultado la aparición de un "Síndrome serotoninérgico" caracterizado por agitación, insomnio y síntomas gastrointestinales que incluyen diarrea. Paroxetina no aumenta el efecto o el efecto de la confusión asociada al haloperidol, amilobarbital y oxazepam. La administración diaria de paroxetina incrementa significativamente los niveles plasmáticos de pricididina. La administración concomitante de paroxetina con anticonvulsivos: carbamazepina, fenitoína, valproato sódico, no altera el perfil farmacocinético/farmacodinámico en pacientes epilépticos. La administración conjunta con fármacos serotoninérgicos puede llevar a una incidencia de efectos serotoninérgicos asociados. Se aconseja tener precaución si es necesario la administración concomitante con otros fármacos activos del Sistema Nervioso Central. **EMBARAZO Y LACTANCIA** No debe utilizarse. **EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR VEHÍCULOS Y MANTENER MÁQUINAS** Posibilidad de que se produzcan alteraciones en la capacidad para conducir vehículos y para manipular máquinas automáticas. **REACCIONES ADVERSAS** Son, en general, de naturaleza leve. Algunas reacciones adversas pueden disminuir en intensidad y frecuencia, al continuar el tratamiento y, en general, no obligan a suspender la medicación. (Ver Reacciones Adversas en Ficha Técnica completa). La interrupción de la administración de paroxetina puede dar lugar a una reacción de retirada consistente tales como mareo, alteraciones sensoriales (incluyendo parestesia y sensación de calor/frío), cefalea, alteraciones del sueño, agitación o ansiedad, náuseas y sudoración. Estas reacciones son generalmente de carácter moderado y disminuyen espontáneamente. Se aconseja reducir la dosis gradualmente. Los datos clínicos y preclínicos disponibles no indican que los ISRS causen dependencia. **SOBREDOSIIFICACIÓN** Es evidente un amplio margen de seguridad de paroxetina en sobredosisación. La experiencia en casos de sobredosis indica que, además de los síntomas mencionados en el apartado Reacciones adversas, se han notificado vómitos, náuseas, fiebre, cambios en la presión arterial, cefalea, contracciones musculares involuntarias, agitación, ansiedad y taquicardia. De forma ocasional se ha informado de reacciones tales como coma o cambios en el ECG, muy raramente con un resultado fatal, y en general cuando se tomó paroxetina en sobredosisación conjuntamente con otros fármacos psicótopos. No se conoce antídoto específico. El tratamiento comprende las medidas generales habituales utilizadas frente a los sobredosis por cualquier anti-depresivo. Cuando sea aplicable, se procederá al vaciamiento del contenido gástrico mediante la inducción del vómito, el lavado gástrico o ambas. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN BAYVIT S.A.** R. Mompou, S. 08980 Sant Just Desvern (Barcelona). **REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DE PENSACIÓN** Con receta médica. Financiable por el SNS. **PRESENTACIONES** Paroxetina Bayvit 20 mg comprimidos reabiertos EFG, envase con 28 comprimidos, (CN 767632), envase con 56 comprimidos (CN 767756).

