A. Borrell^{a,c}
 E. Casals^b
 A. Fortuny^{a,c}
 A. Goncá^{a,c}
 I. Mercadé^b
 A. Serés^a
 C. González^a
 V. Cararach^{a,c}
 J.A.. Vanrell

Cribado de trisomía 21 en el primer trimestre mediante test combinado de bioquímica y ecografía. Estudio prospectivo de intervención

First trimester screening for trisomy 21 with the use of the biochemistry-ultrasound combined test. A prospective intervention trial

^aUnidad Diagnóstico Prenatal. Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. ^bServicio de Bioquímica. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. ^cIDIBAPS. Investigación en Medicina Fetal. Universidad de Barcelona. Barcelona. España.

Este estudio fue realizado en parte mediante subvención del Ministerio de Sanidad. Becas FIS 99/0274 y FIS 02/0627.

Correspondencia:

Dr. A. Borrell.
 Unidad Diagnóstico Prenatal.
 Instituto de Ginecología, Obstetricia y Neonatología.
 Hospital Clínic-Sede Maternitat.
 Sabino de Arana, 1. 08028 Barcelona. España.
 Correo electrónico: aborrell@medicina.ub.es

Fecha de recepción: 10/12/04

Aceptado para su publicación: 27/2/05

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la efectividad del Test Combinado (bioquímica y ecografía en el primer trimestre) para la detección prenatal del síndrome de Down en la población general.

Material y métodos: Se determinaron los marcadores bioquímicos de primer trimestre (proteína plasmática A asociada al embarazo y fracción β libre de la gonadotropina coriónica) en suero materno a las 7-12 semanas. La translucencia nucal fetal y la edad gestacional se determinaron mediante ecografía a las 10-14 semanas. Se estimó el riesgo combinado el mismo día de la ecografía y se ofreció el diagnóstico citogenético mediante biopsia de corion si el riesgo era de 1:250 o superior.

Resultados: La edad gestacional media en la determinación bioquímica fue de 9,5 semanas y de

12,1 para la ecografía. En las 4.447 gestaciones estudiadas con seguimiento completo, los índices de detección fueron del 91% (10/11) para la trisomía 21 y del 83% (5/6) para la trisomía 18 o 13, con una tasa de falsos positivos del 3,8% (167/4.423).

Conclusión: El Test Combinado, al determinar los valores de marcadores bioquímicos y de translucencia nucal en intervalos gestacionales óptimos durante el primer trimestre, mostró una tasa de detección del 91% para la trisomía 21 con una reducción en la tasa de falsos positivos al 3,8%.

PALABRAS CLAVE

Test Combinado. Translucencia nucal. Marcadores bioquímicos. Cribado. Primer trimestre. Síndrome de Down.

224 ABSTRACT

Objective: To assess the effectiveness of the Combined Test (first-trimester biochemistry and ultrasound) in the prenatal detection of Down syndrome in the general pregnant population.

Material and methods: First-trimester biochemical markers (pregnancy associated plasma protein-A and free β -hCG) were determined in maternal serum at 7-12 weeks. Nuchal translucency and the gestational age were assessed in a 10-14 weeks scan. The estimated combined risk was delivered the same day of the scan, and when it was 1:250 or above, cytogenetic diagnosis was offered by means of chorion villus sampling.

Results: The mean gestational age at biochemistry was 9.5 weeks and 12.1 for ultrasound. In the 4,447 studied pregnancies with a complete follow-up, detection rate for trisomy 21 was 91% (10/11), 83% (5/6) for trisomies 18-13, with a 3.8% (167/4423) false-positive rate.

Conclusion: The Combined Test, with the assessment of biochemical markers and nuchal translucency in their optimal gestational periods during the first trimester, showed a 91% detection rate for trisomy 21 with a reduced false-positive rate of 3.8%.

KEY WORDS

Nuchal translucency. Down syndrome. Biochemical markers. First trimester screening. Combined Test.

INTRODUCCIÓN

La combinación de marcadores bioquímicos y ecográficos para el cribado del síndrome de Down (SD) en el primer trimestre fue motivo de diversos estudios retrospectivos a finales de los años noventa del siglo pasado. La combinación más utilizada empleaba 2 marcadores bioquímicos de primer trimestre, la proteína plasmática A asociada al embarazo

(PAPP-A) y la fracción β libre de la gonadotropina coriónica ($f\beta$ -hCG), conjuntamente con la translucencia nuchal (TN) y los resultados de cada uno de los marcadores modificaban el riesgo epidemiológico basado en la edad materna¹⁻⁵. Este método de cribado de trisomía 21 en el primer trimestre ha recibido el nombre de Test Combinado, y sus resultados se han publicado desde el año 2000, cuando se ha aplicado prospectivamente en la población general⁶⁻¹⁵.

En nuestro centro, desde el año 1991, se evaluaron retrospectivamente los marcadores bioquímicos de primer trimestre y la TN en la predicción del riesgo de aneuploidía, en las gestaciones programadas para biopsia de corion^{16,17}. En octubre de 1999 se inició en nuestra unidad un programa prospectivo de intervención para el cribado poblacional en el primer trimestre de la gestación basado en el Test Combinado¹⁸. Una característica específica de nuestro programa reside en la práctica de las determinaciones bioquímicas y ecográficas en edades gestacionales, diferenciadas basándose en un análisis previo de nuestros datos retrospectivos, mostrando que en los casos no detectados de trisomía 21 las muestras de suero materno para la determinación bioquímica se habían obtenido después de las 12 semanas, o la ecografía para valoración de la TN se había realizado a las 10-11 semanas. Por esta razón, el estudio fue diseñado para determinar la bioquímica alrededor de las 10 semanas y la ecografía alrededor de las 12 semanas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde octubre de 1999 hasta diciembre de 2003, se estudiaron 4.712 gestaciones únicas consecutivas, de bajo riesgo para aneuploidía, durante el primer trimestre. Para las gestantes de 38 o más años, el programa público de diagnóstico prenatal establecido por el Departamento de Sanidad en Cataluña, ofrece un procedimiento invasivo, pero se informó a las gestantes en este grupo de edad que podían también optar por el test previo de cribado para una mejor definición del riesgo, en el marco del presente estudio. Entre las 9 y las 10 semanas de gestación por amenorrea, se realizó una extracción de sangre materna para determinación sérica de PAPP-A y $f\beta$ -hCG, en muestras no congeladas y mediante un ensayo inmunofluorométrico (Delfia, Wallac, PerkinEl-

mer®) previamente descrito¹⁶. Debido a que en el 98% de las gestaciones el decalaje entre la edad gestacional por amenorrea y por ecografía es inferior a 2 semanas, sólo en un 2% del total de gestantes se determinó la bioquímica fuera del período 7-12 semanas.

El protocolo de este estudio de intervención fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica de nuestro hospital y el consentimiento informado se obtuvo antes del análisis materno durante la primera visita con el genetista clínico de nuestra unidad. Se programó una exploración ecográfica a las 12 semanas por amenorrea (Eccocee SSA 340A/EA, and Power-Vision 400, Toshiba Medical Systems; Tokio, Japón), asumiendo que podría corresponder a una ventana entre las 10 y 14 semanas en edad gestacional real. Se midió la longitud craneocaudal (CRL) y la TN, inicialmente en un corte transversal como se ha descrito previamente¹⁷, y desde 2001 en un corte sagital siguiendo los criterios establecidos por la Fetal Medecine Foundation¹⁹. Inmediatamente después de la ecografía, los datos ecográficos fueron transmitidos al Servicio de Bioquímica, y se ajustó la edad gestacional en el momento de la extracción de sangre en función de la CRL¹⁸. Los valores obtenidos de PAPP-A, β -hCG y TN se convirtieron en múltiplos de la mediana (MoM) para la correspondiente semana gestacional, y el riesgo para el síndrome de Down se calculó con el software Delfia (Delfia, Wallac, PerkinElmer®), sin aplicar un algoritmo específico para la trisomía 18.

El mismo día de la ecografía, el genetista clínico informó y comentó los resultados obtenidos, y ofreció la práctica de una biopsia corial el mismo día, siempre que el riesgo a término para trisomía fuera 1:250 o superior. En casos de bajo riesgo, se comentaron las limitaciones del test de cribado, con la obtención del documento firmado de conformidad o, en su caso, de rechazo para la práctica del procedimiento invasivo.

En los casos en que el parto no fue atendido en nuestro centro, los datos más relevantes relacionados con el resultado perinatal se obtuvieron por consulta telefónica o, en su defecto, se contactó con su obstetra. Los casos sin seguimiento o de pérdida fetal sin cariotipo conocido se excluyeron del estudio. Sin embargo, para minimizar la posibilidad de un falso negativo desconocido, en los casos excluidos se consultó el Registre de Defectes Congènits de

la Ciutat de Barcelona, que recoge datos de las gestaciones afectadas de cromosopatía observadas, tanto en recién nacidos vivos como en los casos de muerte intrauterina, aborto o interrupción voluntaria.

RESULTADOS

De las 4.712 gestantes con muestra para bioquímica, 141 no completaron el Test Combinado, 83 (1,8%) de ellas porque la edad gestacional estaba fuera de los límites previamente establecidos para el estudio y 58 (1,2%) no se presentaron para realización de ecografía por motivos diversos. Completaron el test 4.571 gestaciones, de las cuales 99 (2,2%) fueron excluidas por falta de seguimiento perinatal y 25 (0,5%) por pérdida fetal sin cariotipo conocido. En las restantes 4.447 gestaciones, la edad materna osciló entre 14 y 45 años, con una media de 31,1 años. El rango de la edad gestacional el día de la extracción de la muestra de sangre fue de 7 a 12 semanas después de la corrección por ecografía (aunque programada entre las 9-10 semanas por amenorrea), con una media de 9,5 semanas (fig. 1).

La ecografía se realizó entre las 10 y las 14 semanas, con una media de 12,1 semanas (aunque programada a las 12 semanas por amenorrea). El lapso medio entre bioquímica y ecografía fue de 2,3 semanas. La tasa de cribados positivos (verdaderos + falsos) fue del 4,2% (186/4.447), y todas las gestantes con "test

Figura 1. Distribución de la edad gestacional en el momento de la realización de los estudios bioquímico y ecográfico.

Tabla 1 Valores de los diferentes marcadores, cronología en su determinación, riesgo estimado y seguimiento en los 23 casos de anomalía cromosómica

Caso	Cariotipo materno (años)	Edad gestacional a la bioquímica (semanas)	Edad	PAPP-A (MoM)	$\beta\beta$ -hCG (MoM)	Edad gestacional a la ecografía (semanas)	TN (mm)	Riesgo estimado	Seguimiento
1	Trisomía 21	31	10,5	0,56	3,33	12,4	7,0	1:10	IVE
2	Trisomía 21	31	12,6	1,02	1,04	12,6	5,7	1:10	IVE
3	Trisomía 21	32	11,5	0,23	1,12	11,5	1,5	1:207	IVE
4	Trisomía 21	33	9,0	0,34	1,34	12,0	2,4	1:102	IVE
5	Trisomía 21	33	10,0	0,26	0,93	12,0	9,0	1:10	IVE
6	Trisomía 21	34	11,3	0,48	4,05	12,0	7,5	1:10	IVE
7	Trisomía 21	34	10,3	0,21	1,86	10,3	2,2	1:10	IVE
8	Trisomía 21	35	11,3	0,14	1,36	12,5	5,7	1:10	IVE
9	Trisomía 21	37	10,6	1,06	1,26	12,1	4,1	1:30	IVE
10	Trisomía 21	37	12,3	1,41	1,52	12,3	1,0	1:5.301	IVE*
11	Trisomía 21	37	12,0	0,39	3,74	12,0	11,3	1:10	RN vivo
12	Trisomía 18	27	10,1	0,81	0,43	11,5	5,8	1:63	Óbito fetal
13	Trisomía 18	35	8,4	0,55	0,42	10,6	6,1	1:10	IVE
14	Trisomía 18	36	11,2	0,10	0,22	13,2	1,2	1:1.146	Óbito fetal
15	Trisomía 18	36	10,4	0,27	0,13	12,2	3,7	1:10	IVE
16	Trisomía 18	37	9,3	0,42	0,23	12,3	4,4	1:55	IVE
17	Trisomía 13	35	9,0	0,18	0,27	11,6	4,3	1:10	IVE
18	Monosomía X	36	9,1	0,28	1,61	12,2	0,7	1:80	IVE
19	Mosaico monosomía X	30	12,0	0,51	1,73	12,2	4,7	1:10	IVE
20	Triploidía	30	9,0	0,16	0,17	11,5	2,2	1:810	Óbito fetal
21	Triploidía	30	9,4	0,12	0,17	12,0	1,1	1:10.000	IVE
22	Anillo (15)	37	8,0	0,47	0,57	11,2	4,4	1:10	IVE
23	Translocación (X;9)	37	9,0	0,19	0,96	11,6	1,9	1:62	IVE

IVE: interrupción voluntaria de la gestación; RN: recién nacido. *T21 detectada a las 22 semanas debido a un canal A-V.

positivo” optaron por la práctica de una biopsia corial. Se observaron 23 anomalías cromosómicas (el 0,5% de la población estudiada) por análisis citogenético prenatal o por seguimiento neonatal, 12 de las cuales estaban entre las 987 gestantes con edades a partir de los 35 años (el 1,2% en este grupo de edad).

Las 23 anomalías cromosómicas observadas correspondían a trisomía 21 (11), trisomía 13 o 18 (6) y anomalías cromosómicas estructurales desequilibradas (6). Los valores obtenidos para cada uno de los marcadores y los riesgos estimados para trisomía 21 se recogen en la tabla 1. Los valores de los marcadores en las gestaciones trisómicas estaban alterados como era previsible: a) la PAPP-A estaba disminuida en las trisomías 21 con un valor medio de 0,55 MoM y en las trisomías 13 o 18 con un valor medio de 0,39 MoM; b) la $\beta\beta$ -hCG estaba aumentada en las trisomías 21 con un valor medio de 1,95 MoM

Tabla 2 Valores medios de edad materna, marcadores bioquímicos, translucencia nuchal y riesgo estimado en los casos de trisomía 21, trisomía 18-13 y con cariotipo normal

	Trisomía 21	Trisomías 13-18	Normal
Edad materna (años)	34,0	34,3	31,0
PAPP-A (MoM)	0,55	0,39	1,21
$\beta\beta$ -hCG (MoM)	1,95	0,28	1,27
TN (mm)	5,2	4,2	1,6
Riesgo estimado (1:X)	10	10	6.300

y disminuida en las trisomías 13 y 18 con un valor medio de 0,28 MoM; c) la TN estaba elevada en ambas trisomías, en la 21 con un valor medio de 5,2 mm y en la 18 de 4,2 mm (tabla 2).

Tabla 3 Distribución del número de casos con cariotipo normal y tasas de falsos positivos según los grupos de edad materna

Edad materna (años)	N (%)	Cribados positivos	Tasas de falsos positivos (%)
14-25	462 (10,5)	10	2,2
26-30	1.367 (30,9)	38	2,8
31-34	1.619 (36,6)	50	3,1
35-45	974 (22,0)	69	7,1
Total	4.422 (100)	167	3,8

Las tasas de detección alcanzadas con el algoritmo fue del 91% (10/11) para la trisomía 21, del 83% (5/6) para la trisomía 13-18 y del 67% (4/6) para las restantes cromosopatías. En uno de los 10 casos detectados de trisomía 21, la pareja optó por proseguir el curso la gestación, y mediante cesárea se obtuvo un recién nacido a las 37 semanas. En el único caso de trisomía 21 no detectado mediante el Test Combinado, se diagnosticó un canal atrioventricular en el estudio ecográfico a las 22 semanas y la pareja optó por una interrupción (caso 10 en tabla 1). En las restantes anomalías cromosómicas se procedió a una interrupción inducida o se produjo la muerte fetal espontánea (tabla 1).

La tasa global de falsos positivos fue del 3,8% (167/4.423) y del 7,1% si se restringe al grupo de edad materna más elevada (35-45 años) (tabla 3). De las 99 gestaciones sin seguimiento excluidas del estudio, ninguna estaba incluida en el Registre de Defectes Congènits de la Ciutat de Barcelona, donde constan todas las anomalías cromosómicas en recién nacidos, muertes intrauterinas y abortos espontáneos o inducidos, por lo que razonablemente pueden descartarse los falsos negativos en este reducido grupo.

DISCUSIÓN

En los años setenta del siglo pasado, se estableció la edad materna avanzada como el criterio principal en la selección de la población con mayor riesgo de cromosopatía y se fijó, un tanto arbitrariamente, en los 35 años. Este criterio ha pervivido hasta la actualidad a pesar de haber demostrado sus grandes limitaciones, ya que permite detectar sólo

lo un 30% de las gestaciones afectadas de síndrome de Down. Por otra parte, el aumento progresivo en la edad de la población gestante ha generado un incremento notable del número de procedimientos invasivos basándose en una edad materna avanzada. Así pues, en Cataluña, el porcentaje de gestantes de 35 o más años en el año 2004 fue del 22%.

La implementación del cribado bioquímico del síndrome de Down en el segundo trimestre de la gestación, descrito en 1988²⁰, ha permitido aumentar el índice de detección hasta el 65%. En nuestro centro se realizó durante 6 años (1993-1998) el estudio piloto²¹ que permitió la recomendación para su aplicación en 1998 por el Servei Català de la Salut como programa público de cribado en Cataluña. En la actualidad ya existen datos epidemiológicos concluyentes que reflejan el impacto poblacional que el cribado bioquímico ha tenido sobre la disminución en la prevalencia de recién nacidos afectados de síndrome de Down^{22,23}. Como inconvenientes del cribado bioquímico de segundo trimestre se han señalado el alto número de falsos positivos, traducido en amniocentesis innecesarias (el 11% en nuestra experiencia²¹) y el relativamente dilatado lapso de tiempo que transcurre entre el cribado y una eventual interrupción de la gestación, habitualmente entre las 15 y 20 semanas de gestación.

El Test Combinado de primer trimestre ofrece mayor precocidad y fiabilidad en el cribado del síndrome de Down. Comparando los presentes resultados con los previamente publicados en 9.401 cribados de segundo trimestre en una población de características similares de nuestro centro²¹, el índice de detección aumenta del 65 al 91%, paralelamente a una remarcable reducción de los falsos positivos, que pasan del 11 al 3,8%. Mientras que la tasa de detección observada es coherente con las cifras publicadas en la bibliografía, que oscilan entre el 80 y el 93%, la tasa de falsos positivos en nuestra serie (3,8%) es la más reducida de todas las series prospectivas publicadas, que oscilan entre el 5 y el 10%^{6-12,14,15} (tabla 4). Esta reducción en los falsos positivos adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el 22% de las gestantes en la serie presentada tiene una edad superior a los 34 años. La implementación del Test Combinado en España tiene grandes potencialidades: por un lado, la capacidad de aumentar la tasa de detección de trisomía 21 en zonas que todavía utilizan la edad materna como criterio principal

228 **Tabla 4** Resultados de las series prospectivas publicadas de Test Combinado

Autor	N	Edad gestacional	Tasa detección T21	Tasa detección T18	Tasa falsos positivos
Krantz et al, 2000 ⁶	5.809	10,4-13,6	91% (30/33)	100% (13/13)	8,7%
Niemimaa et al, 2001 ⁷	1.602	10-13	80% (4/5)	100% (2/2)	5,4%
Schuchter et al, 2002 ⁸	4.939	10,0-12,6	86% (12/14)	-	5,0%
Von Kaisenberg et al, 2002 ⁹	3.864	11-14	84% (16/19)	93% (13/14)	6,6%
Bindra et al, 2002 ¹⁰	14.383	10-13	91% (75/82)	97% (31/32)	6,8%
Spencer y Nicolaides, 2003 ¹¹	12.339	11-13,6	92% (23/25)	100% (15/15)	5,2%
Wapner et al 20,03 ¹² (BUN)	8.216	10,4-13,6	85% (52/61)	64% (7/11)	10,7%
Bach et al, 2004 ¹⁴	3.492	11-13	83% (10/12)	86% (18/21)	5,4%
Stenhouse et al, 2004 ¹⁵	5.084	11-14	93% (14/15)	100% (11/11)	5,9%
Serie presentada	4.447	8-14	91% (10/11)	83% (5/6)	3,8%
Total	64.175	-	89% (246/277)	92% (115/125)	6,3%

T21: trisomía 21; T18: trisomía 18.

de cribado²⁴; por otro, permitiría disminuir el número excesivo de procedimientos invasivos que se realizan en otras zonas (en Barcelona, la tasa de procedimientos invasivos es del 30%; http://www.aspb.es/quefem/docs/REDCB_informe2003.pdf).

En series ya publicadas sobre el Test Combinado, la determinación bioquímica materna y la ecografía se realizan en el mismo día, dentro del período gestacional óptimo para la ecografía. En el método OSCAR (one stop clinic assessment of risk)⁵, los resultados se comunican a la gestante el mismo día, pero en la mayoría de las series se difiere algunos días. Nuestra estrategia de realizar los estudios bioquímicos y ecográficos en 2 momentos diferenciados (*two-stop*) se diseñó basándose en el análisis previo de datos retrospectivos de nuestra unidad, que mostraba que en todos los casos de trisomía 21 no detectables por Test Combinado la bioquímica se realizó demasiado tarde (> 12 semanas) o la ecografía demasiado pronto (< 11 semanas). En este sentido, está bien establecido que el valor discriminativo de la PAPP-A disminuye progresiva y significativamente desde la semana 6 hasta la 14²⁵. Dado que nuestra serie es la única en la que bioquímica y ecografía se han aplicado en las edades gestacionales razonadamente distintas, parece también razonable que esta diferencia metodológica pueda explicar la tasa más baja de falsos positivos, equivalente a una disminución de procedimientos invasivos. Aun aceptando la posible inconveniencia de acudir 2 veces al centro (alrededor de la 9 y la 12 semanas), nuestro enfoque permite por otro lado disponer de los resultados el mismo día de la

ecografía (como en la metodología OSCAR), sin necesidad de posponerlo hasta unos días después, como es el caso de la mayoría de las series.

Finalmente, merecen un comentario aparte los resultados del amplio estudio colaborativo europeo SURUSS (serum, urine and ultrasound screening study) Trial, publicados en 2003¹³ y que han tenido un considerable impacto en el diseño de las políticas sanitarias de cribado en diversos países. En este estudio se realizó la bioquímica y la ecografía en un mismo día entre las semanas 8 y 14 en 47.053 gestantes. Estos datos no fueron desvelados hasta obtenerse el resultado de la bioquímica de segundo trimestre para su integración en un cálculo de riesgo global. Con ello se excluyeron todos los casos de pérdida fetal espontánea (con cariotipo normal o cromosomopatía) previa a la obtención de los datos de bioquímica del segundo trimestre. Los resultados mostraron que, asumiendo un 5% de falsos positivos, el Test Combinado hubiera detectado el 83% de las trisomías 21 y que, esperando el resultado del Test Integrado de primer y segundo trimestres, la detección se eleva al 93%. Sin embargo, en nuestra opinión, esta mejora en la tasa de detección del Test Integrado sobre el Combinado no compensa su más dificultosa aplicación clínica y su menor aceptabilidad por parte de la gestante, porque pospone cualquier resultado hasta el final del estudio.

Un programa de cribado destinado a seleccionar a la población de alto riesgo no puede desligarse de las pruebas diagnósticas a aplicar en aquellos resultados positivos. La ventaja de la precocidad que ofrece el Test Combinado no es coherente con una espera has-

ta la semana 15 para la práctica de una amniocentesis en la semana 15 y un resultado citogenético a las 18 semanas. La biopsia corial, al contrario, permite optimizar las ventajas del cribado de primer trimestre ya que puede practicarse cuando se conoce el resultado del cribado y se dispone de un resultado citogenético

en un plazo de 3-7 días²⁶. Las ventajas de obtener un diagnóstico de cromosomopatía en el primer trimestre ya han sido suficientemente señaladas, pero también deben tenerse en cuenta los beneficios de la precocidad en un diagnóstico de cariotipo normal que permite avanzar la plena aceptación de la gestación.

229

BIBLIOGRAFÍA

1. Orlandi F, Damiani G, Hallahan TW, Krantz DA, Macri JN. First-trimester screening for fetal aneuploidy: Biochemistry and nuchal translucency. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 1997;10:381-6.
2. Biagiotti R, Brizzi L, Periti E, D'Agata A, Vanzi E, Cariati E. First trimester screening for Down syndrome using maternal serum PAPP-A and free b-hCG in combination with fetal nuchal translucency thickness. *Br J Obstet Gynaecol.* 1998;105:917-20.
3. DeGraaf IM, Pajkrt E, Bilardo CM, Leschot NJ, Cuckle HS, Van Lith JMM. Early pregnancy screening for fetal aneuploidy with serum markers and nuchal translucency. *Prenat Diagn.* 1999;19:458-62.
4. DeBasio P, Siccardi M, Volpe G, Famularo L, Canini S. First-trimester screening for Down syndrome using nuchal translucency measurement with free-b hCG and PAPP-A between 10 and 13 weeks of pregnancy. The Combined Test. *Prenat Diagn.* 1999;19:360-3.
5. Spencer K, Soultter V, Tul N, Sniijders R, Nicolaides K. A screening program for trisomy 21 at 10-14 weeks using fetal nuchal translucency, maternal serum free b-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-A. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 1999;13:231-7.
6. Krantz DA, Hallahan TW, Orlandi F, Buchanan P, Larsen JW, Macri JN. First-trimester Down syndrome screening using dried blood biochemistry and nuchal translucency. *Obstet Gynecol.* 2000;96:207-13.
7. Niemimaa M, Suonpaa M, Perheentupa A, Seppala M, Heinonen S, Laitinen P, et al. Evaluation of first trimester maternal serum and ultrasound screening for Down's syndrome in Eastern and Northern Finland. *Eur J Hum Gen.* 2001;9:404-8.
8. Schuchter K, Hafner E, Stangi G, Metzenbauer M, Hofinger D, Philipp K. The first trimester "combined test" for the detection of Down syndrome pregnancies in 4939 unselected pregnancies. *Prenat Diagn.* 2002;22:211-5.
9. Von Kaisenberg CS, Gasiorek-Wiens A, Bielicki M, Bahlmann F, Meyberg H, Kossakiewicz A, et al. Screening for trisomy 21 by maternal age, fetal nuchal translucency and maternal serum biochemistry at 11-14 weeks: a German multicenter study. *J Mat Fetal Neonat Med.* 2002;12:89-94.
10. Bindra R, Heath V, Liao A, Spencer K, Nicolaides KH. One-stop clinic for assessment of risk for trisomy 21 at 11-14 weeks: a prospective study of 15030 pregnancies. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2002;20:219-25.
11. Spencer K, Nicolaides KH. Screening for chromosomal abnormalities in the first trimester using ultrasound and maternal serum biochemistry in one-stop clinic: a review of three years prospective experience. *Br J Obstet Gynaecol.* 2003;110:281-6.
12. Wapner R, Thom E, Simpson JL, Pergament E, Silver R, Filkins K, et al. First-trimester screening for trisomies 21 and 18. *N Engl J Med.* 2003;349:1405-13.
13. Wald NJ, Rodeck C, Hackshaw AK, Walters J, Chitty L, MacKinson AM. First and second trimester antenatal screening for Down's syndrome: the results of the Serum, Urine and Ultrasound Screening Study (SURUSS). *Health Technol Assess* 2003;7:1-94.
14. Bach C, Torrent S, Cabrero D, Sabrià J. Cribado bioquímico-ecográfico de las aneuploidías en el primer trimestre. *Metodología y resultados.* *Progr Obstet Ginecol.* 2004;47:5-19.
15. Stenhouse EJ, Crossley JA, Aitken DA, Brogan K, Cameron AD, Connor JM. First-trimester combined ultrasound screening for Down syndrome in routine clinical practice. *Prenat Diagn.* 2004;24:774-80.
16. Casals E, Aibar C, Martínez JM, Borrell A, Soler A, Ojuel J, et al. First-trimester biochemical markers for Down syndrome. *Prenat Diagn.* 1999;19:8-11.
17. Borrell A, Costa D, Martínez JM, Delgado RD, Farguell T, Fortuny A. Criteria for fetal nuchal thickness cut-off: A re-evaluation. *Prenat Diagn.* 1997;17:23-9.
18. Borrell A, Casals E, Fortuny A, Farré MT, Gonce A, Sánchez A, et al. First-trimester screening for trisomy 21 combining biochemistry and ultrasound at individually optimal gestational ages. An interventional study. *Prenat Diagn.* 2004;14:541-5.
19. Nicolaides KH, Brizot ML, Sniijders RJM. Fetal nuchal translucency: ultrasound screening for fetal trisomy in the first trimester of pregnancy. *Br J Obstet Gynaecol.* 1994;101:782-6.
20. Wald NJ, Cuckle HS, Densem JW, Nanchahal K, Royston P, Chard T, et al. Maternal serum screening for Down's syndrome in early pregnancy. *Br Med J.* 1988;297:883-7.

- 230**
21. Fortuny A, Farré MT, Borrell A, Casals E, Mercade I, Seres A, et al. Cribado bioquímico y ecografico de aneuploidia fetal en el segundo trimestre de la gestacion. *Progr Obstet Ginecol.* 2004;47:257-63.
 22. Verloes A, Gillerot Y, Van Maldergem L, Schoos R, Herens C, Jamar M, et al. Major decrease in the incidence of trisomy 21 at birth in south Belgium: mass impact or triple test. *Eur J Hum Genet.* 2001;9:1-4.
 23. Prats R, Armelles M, Salleras L, Fortuny A. Catalonia: the effect of the screening and prenatal diagnosis program on Down's syndrome trends. *Down's Screening News.* 2002;9:32-3.
 24. Ramos-Corpas D, Santiago JC, Gallo M, Salamanca A. Cribado del síndrome de Down en Andalucía: se precisa una estrategia más eficaz. *Progr Obstet Ginecol.* 2004;47:446-51.
 25. Cuckle HS, Van Lith JMM. Appropriate biochemical parameters in first-trimester screening for Down syndrome. *Prenat Diagn.* 1999;19:505-12.
 26. Fortuny A, Borrell A, Soler A, Casals E, Costa D, Puerto B, et al. Chorionic villus sampling by biopsy forceps. Results in 1580 procedures from a single center. *Prenat Diagn.* 1995;15:541-50.