Daniel M. Campagne^{a,b}
Ghislaine Campagne^b

Nuevos parámetros clínicos del síndrome premenstrual

^aDepartamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. España.

^bClínica Bella Médica. Altea. Alicante. España.

Correspondencia:

Dpto. Personalidad. Universidad a Distancia (UNED). Ciudad Universitaria, s/n. 28040 Madrid. España.
Correo electrónico: danplaton@hotmail.com

Fecha de recepción: 22/4/05.

Aceptado para su publicación: 16/3/06.

New clinical parameters in premenstrual syndrome

RESUMEN

Los síntomas premenstruales conforman, probablemente, la alteración física y psíquica que a más personas afecta, tanto a las mujeres como a los varones de su entorno. Se estima que hasta un 90% de las mujeres en edad reproductiva percibe uno o más síntomas en los días antes de la menstruación que pueden alterar su comportamiento y bienestar y, por tanto, afectar a su entorno familiar, social y laboral.

A pesar de esta prevalencia generalizada, el síndrome premenstrual como entidad clínica aún carece de un contenido concreto y validado, así como de métodos diagnósticos consensuados y comprobados, y sólo tímidamente empieza a disponerse de recomendaciones de tratamiento sobre la base de evidencia experimental y clínica.

Esta revisión comentará nuevos datos de investigación en cuanto a la posible etiología de la alteración premenstrual. Propondrá un nuevo perfil premenstrual, registro de síntomas de obligado cumplimiento para el diagnóstico de las 3 formas clínicas en que puede manifestarse la alteración. Finalmente, incluirá una compilación de las recomendaciones de fuentes fidedignas y basadas en la evidencia en cuanto al tratamiento de los síntomas «normales» y «no normales».

PALABRAS CLAVE

Síndrome premenstrual. Trastorno disfórico premenstrual. Ciclo ovárico. Hormonas. Fase lútea. Perfil premenstrual. Psicometría.

ABSTRACT

Premenstrual symptoms probably constitute the physical and psychological alteration that affects more people than any other, including both women and the men in their environment. Up to 90% of women of childbearing age report one or more symptoms during the days before menstruation. These symptoms can alter women's behavior and well-being and can therefore affect their family, social and work circles.

Despite its widespread prevalence, premenstrual syndrome as a clinical entity has not been clearly defined, and consensuated and proven diagnostic methods are lacking. Treatment recommendations supported by experimental and clinical evidence are only slowly beginning to appear.

In the present review, we discuss recently published experimental data on the possible etiology of premenstrual syndrome. We propose a new symptom register, the Premenstrual Profile, to

494 be used for the diagnosis of the three forms in which this alteration can manifest itself. Finally, we review evidence-based recommendations from reliable sources on the treatment of «normal» and «abnormal» premenstrual symptoms.

KEY WORDS

Premenstrual syndrome. Premenstrual dysphoric disorder. Ovarian cycle. Hormones. Luteal phase. Premenstrual profile. Psychometry.

INTRODUCCIÓN

Los síntomas premenstruales, en determinadas ocasiones categorizados como síndrome premenstrual (*premenstrual syndrome*, PMS), son casi omnipresentes en la mujer en edad reproductiva; se han descrito al menos 200 síntomas premenstruales, entre físicos o fisiológicos y psicológicos. Casi todos los aspectos del funcionamiento de la mujer pueden verse afectados por los cambios que en ella se producen durante el ciclo menstrual. Cambios «positivos» a veces, cambios «negativos» otras veces, y tanto positivos como negativos la mayoría de las veces, dependiendo de la vivencia subjetiva de cada mujer (tabla 1).

En otras palabras, es normal percibir síntomas premenstruales, ya que la mayoría de las mujeres los experimenta. Sólo en los casos en que estos sínto-

mas afectan negativamente la funcionalidad física, psíquica y/o social de la mujer, o sea, cuando en su conjunto provocan una reducción o merma notable de la calidad de vida, podemos hablar de un síndrome premenstrual. Exclusivamente en los casos en que esta merma de la calidad de vida de la persona llega a ser un impedimento funcional psíquico absoluto temporal, estamos ante un trastorno disfórico premenstrual (*premenstrual dysphoric disorder*, PMDD) (tabla 2).

Durante los últimos 70 años se han propuesto muchas teorías acerca de las causas de los síntomas. Empezando por la obvia causa intuitiva, que es un supuesto desarreglo hormonal. Pero rápidamente se incluyeron supuestos factores psicológicos para poder explicar por qué una mujer sufre, cuando otras en las mismas circunstancias y con los mismos valores hormonales no lo hacen. La investigación no ha podido identificar ninguna alteración biológica como causa única del síndrome o del trastorno, lo cual apunta a un problema multicausal.

Algunas teorías acerca de los supuestos factores psicológicos van muy lejos. Relacionan el PMS con el neuroticismo, con trastornos afectivos o con una personalidad anormal, propuestas todas ellas en línea con la nunca demostrada relación entre el PMS y una supuesta alteración mental.

El mero hecho de incluir, de forma provisional, el PMDD en el DSM-IV¹ fue criticado por ginecólogos, psiquiatras, neurólogos y psicólogos de renombre ya que, en el caso de que tuviera una causa biológica concreta, no sería un trastorno mental. El PMDD es

Tabla 1 Algunos síntomas premenstruales

<i>Síntomas negativos más frecuentes</i>	<i>Síntomas positivos más frecuentes</i>
Distensión abdominal	Más energía
Ansiedad o tensión	impulso a terminar cosas pendientes
Dolor y tensión mamaria	Mejor rendimiento laboral
Episodios de llanto	Más interés por las cosas
Depresión	Más sensación de control sobre su vida
Fatiga, falta de energía	Más hábil socialmente
Disminución de la libido	Incremento de la libido
Ira o irritabilidad no provocadas	Pecho más atractivo
Dificultad para concentrarse	Cara más guapa
Cefalea	Más cariñosa
Cambios en patrones de sed y apetito	Más relajada
Edema en las extremidades	Más autoconfianza

Tabla 2 Identidades clínicas de la vivencia premenstrual

1. Normalidad: síntomas premenstruales
2. Anormalidad: síndrome premenstrual, con merma de la calidad de vida por afección física y psicológica
3. Anormalidad: trastorno disfórico premenstrual, con incapacidad funcional por afección anímica o psicósomática

un trastorno psicológico que se distingue del PMS, donde los síntomas psicológicos están siempre acompañados de alteraciones físicas y biológicas.

Según el DSM-IV, para el trastorno disfórico premenstrual los síntomas psicológicos son determinantes y deben haberse presentado con regularidad durante la última semana de la fase lútea, y haber remitido a los pocos días del inicio de la menstrua-

ción. Estos síntomas tienen que ser de la suficiente gravedad como para interferir notablemente en el trabajo, los estudios o las actividades habituales y estar completamente ausentes durante al menos una semana después de la menstruación. De esta forma, el DSM confirma que en el PMDD los síntomas psicológicos son determinantes. El DSM advierte que se debe distinguir el PMS del PMDD (tabla 3).

Los estudios endocrinos y ginecológicos anteriores a 1983 sobre el PMS son inexactos y heterogéneos porque no utilizaron criterios diagnósticos uniformes y adecuados. Los estudios psicológicos adolescían y adolecen del mismo fallo.

De los estudios posteriores no todos cumplen los requisitos científicos actuales, con lo cual parte de sus conclusiones deben tomarse como probabilidades y no como datos ciertos.

Tabla 3 Criterios del trastorno disfórico premenstrual (PMDD) del DSM-IV¹**Manifestaciones clínicas**

- A. Cinco (o más) de los siguientes síntomas durante la mayor parte del día de la última semana de la fase lútea de la mayoría de los ciclos menstruales del último año, que empiezan a remitir 2 días después del inicio de la fase folicular y que desaparecen completamente en la semana siguiente a la menstruación, teniendo en cuenta que al menos uno de estos síntomas debe ser alguno de los 4 primeros:
1. Estado de ánimo deprimido, sentimientos de desesperanza e ideas de autodesaprobación acusadas
 2. Ansiedad, tensión, sensación de agobio o de estar «al límite»
 3. Labilidad emocional evidente (p. ej., ataques de tristeza, llanto o hipersensibilidad ante el rechazo)
 4. Enfado, irritabilidad o aumento de conflictos interpersonales de forma acusada y persistente
 5. Pérdida de interés por las actividades cotidianas (p. ej., trabajo, escuela, amigos, aficiones)
 6. Sensación subjetiva de dificultad para concentrarse
 7. Letargia, fatigabilidad fácil o falta evidente de energía
 8. Cambios significativos del apetito, atracones o antojos por determinadas comidas
 9. Hipersomnia o insomnio
 10. Sensación subjetiva de estar rebasada o fuera de control
 11. Otros síntomas físicos, como hipersensibilidad o aumento del tamaño mamario, dolores de cabeza, molestias articulares o musculares, sensación de hinchazón o ganancia de peso

Nota: En las mujeres fértiles la fase lútea corresponde al período de tiempo comprendido entre la ovulación y el inicio de la hemorragia menstrual, que da paso a la fase folicular. En las mujeres amenorreicas (p. ej., las que han sido histerectomizadas), la determinación de las fases lútea y folicular puede requerir la cuantificación analítica de las hormonas reproductoras circulantes

- B. Estas alteraciones interfieren acusadamente con el trabajo, la escuela, las actividades sociales habituales o las relaciones interpersonales (p. ej., evitación de actividades sociales, disminución de la productividad y eficiencia en el ámbito laboral o académico)
- C. La alteración no representa una simple exacerbación de síntomas de otro trastorno (p. ej., trastorno depresivo mayor, trastorno de angustia, trastorno distímico o trastorno de la personalidad), si bien, en ocasiones, el trastorno disfórico premenstrual se añade también a cualquiera de estos trastornos
- D. Los criterios A, B y C deben ser corroborados por técnicas de valoración diaria y prospectiva de los síntomas en, al menos, 2 ciclos sintomáticos consecutivos. El diagnóstico puede establecerse provisionalmente a la espera de dicha confirmación

En los últimos 20 años, los esfuerzos por aislar un mecanismo fisiopatológico específico no pudieron demostrar muchas diferencias en los valores hormonales a lo largo del ciclo entre mujeres con síntomas y sin ellos. No obstante, la noción errónea de que el PMS se debe a un «lógico» desajuste hormonal continúa presente entre muchos profesionales, y convendría adecuar esta noción a la evidencia.

Se compararon los valores de estrógenos, progesterona, testosterona, hormona folículo-estimulante (FSH), hormona luteinizante (LH), prolactina y globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG), así como el aumento de peso o de los valores de sustancias relacionadas con la regulación de los líquidos, como la aldosterona². Estos estudios incluyeron los valores circulantes, así como los patrones de secreción durante el ciclo menstrual. No se pudo demostrar conexión alguna entre el PMS y los metabolitos endógenos de la progesterona, alopregnenolona y pregnenolona³. Sin embargo, la secreción lútea de alopregnenolona es significativamente más baja en pacientes con PMS, que además muestran concentraciones de progesterona más bajas en todo el ciclo menstrual⁴. Asimismo, las mujeres con PMS, cuando están sintomáticas, manifiestan una respuesta anormal a la progesterona del eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA), en el sentido de que no muestran la activación del eje HPA que se observa en la depresión mayor⁵. Esta actividad reducida del eje HPA había aparecido en un estudio anterior que comparaba la depresión premenstrual con el trastorno disfórico temporal⁶. Las pruebas dinámicas no revelaron anomalías en el eje hipotálamo-hipofisario (como es el caso en la depresión mayor) ni en su relación con las glándulas suprarrenales, la tiroides y los ovarios.

No se detectaron cambios en el magnesio, el cinc, la vitamina A, la vitamina E, la tiamina (vitamina B₁) ni la piridoxina (vitamina B₆)⁷. Algunos investigadores han sugerido cambios relevantes en las endorfinas y que el complejo de síntomas de la fase lútea está causada por la disminución de las concentraciones de opioides endógenos (en realidad, significaría una autoadicción y posterior abstinencia temporal), pero otros no han logrado detectar estos cambios en las endorfinas circulantes en las pacientes sintomáticas⁸⁻¹⁰.

Aunque aparecen cambios en diferentes factores biológicos, éstos no siempre son confinados a la fa-

se lútea. Además de las endorfinas, los cambios incluyen la respuesta a la hormona liberadora de tirotrópina (TRH), la secreción de melatonina, los valores de magnesio de los eritrocitos, las respuestas de la hormona del crecimiento y el cortisol al triptófano, la respuesta del cortisol a la hormona liberadora de corticotropina (CRH), y la secreción de cortisol libre.

Recientemente se encontró que el patrón de secreción de cortisol sí muestra diferencias significativas entre las mujeres con PMDD y las que no lo presentan¹¹.

La función tiroidea en PMS es generalmente normal y, aunque no lo es en un 10% de las pacientes, esta tasa es comparable a la de la prevalencia de hipotiroidismo subclínico en la población general^{12,13}.

Un argumento convincente en contra del supuesto de que los cambios hormonales en fase lútea sean la causa del PMS proviene de unas investigaciones realizadas en 1990 en el National Institute of Mental Health estadounidense¹⁴. En estos estudios, se utilizó un antagonista de la progesterona, RU486, combinado con gonadotropina coriónica humana (HCG) o placebo, para inducir el sangrado en diferentes momentos del ciclo. Los resultados mostraron que la alteración del ciclo menstrual no influyó en el tiempo ni en la gravedad de los síntomas de PMS; por tanto, los fenómenos neuroendocrinos y endocrinos de la fase lútea no parecían ser la causa del síndrome. Sin embargo, los estudios recientes aportan datos que sugieren que la progesterona y los progestágenos sí influyen, porque otros tipos de tratamiento basados en estos fármacos pueden ser eficaces en el PMS¹⁵.

Hay indicios interesantes acerca de la etiología de la problemática premenstrual que se derivan de dos estudios recientes, que continúan una línea de investigación que data de los años setenta. En el primero, el ensayo con tejido del hipocampo animal muestra que las fluctuaciones en los esteroides endógenos, especialmente la progesterona, causan alteraciones de la cinética de determinados receptores GABA, provocando cambios en la excitabilidad tanto del hipocampo como de la conducta. La retirada de la progesterona provocaba ansiedad y susceptibilidad a los ataques epilépticos¹⁶. También en humanos está comprobada esta correlación bimodal entre las concentraciones de progesterona y los cambios negativos anímicos y la posibilidad de ataques du-

rante la fase lútea del ciclo menstrual en mujeres con PMS y epilepsia catamenial, respectivamente¹⁷. Por tanto, en parte podría tratarse de un «síndrome de abstinencia» de la progesterona, cuya intensidad depende de la expresión individual del receptor GABA_A.

En cuanto al segundo estudio, está bien documentado que los efectos de los estrógenos en el cerebro dependen de los receptores específicos α y β , ampliamente presentes en muchas estructuras neuronales. Éstos median en la emoción, la cognición y la procreación, a través de los sistemas noradrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos, los cuales están fuertemente implicados en los trastornos del ánimo. La relación causa-efecto entre esteroides y estrógenos se investigó con el tejido del núcleo paraventricular hipotalámico humano, y se observó que los sujetos con trastornos anímicos tenían un número mucho más elevado de neuronas de la CRH, que poseen receptores de estrógenos y, por tanto, son modulados directamente por los valores de éstos¹⁸. Se estableció que este aumento en dichas neuronas se debe a factores externos, dato importante porque sustenta la influencia del entorno psicosocial en la alteración.

Otro estudio realizado en animales, casi simultáneo al anterior, descubrió que sólo los receptores estrogénicos β tienen relevancia ansiogénica¹⁹.

Consecuentemente, se podría hipotetizar que el componente anímico del PMS y del PMDD se basa en una sensibilidad neuronal a los cambios en los valores de estrógenos, propios del ciclo menstrual, con efectos directos sobre el eje HPA, que se vería agravada por la expresión individual del receptor GABA_A y de la densidad y actividad de los receptores estrogénicos β .

Los resultados poco uniformes de los estudios, en cuanto a la eficacia de los tratamientos sobre la base de las diferentes teorías, refuerzan la sospecha de que no hay una sola causa, sino un origen multifactorial. Otro dato a favor de esta hipótesis es la alta respuesta a los tratamientos con placebo en los estudios con protocolos correctos. En muchos llega a producirse un 35-50% de respuesta al placebo, más aún cuando los sujetos esperan un resultado positivo, mientras que en otros alcanza una respuesta comparable a la respuesta vera. Como uno de nosotros argumentó en otro lugar, el tratamiento con placebo no debe confundirse con un tratamiento «ce-

ro»²⁰. En el presente caso, donde alcanza respuestas tan masivas, el tratamiento con placebo debe considerarse sin sustancia o terapia identificada activa; sin embargo, constituye un tratamiento, dada su eficacia en un alto número de casos. ¿Qué tipo de tratamiento es el placebo? Lo poco que sabemos de los mecanismos por los que actúa el tratamiento placebo nos indica que tiene efectos que se pueden calificar como amplios, u holísticos, o multifactoriales. La sensibilidad extrema al placebo que muestra el PMS revela que tiene un gran componente psicósomático. Esta sensibilidad, combinada con la influencia del aprendizaje y del condicionamiento sociocultural, sostiene que el PMS debe considerarse un síndrome biosociopsicosomático, donde son relevantes los factores biológicos, psicológicos y sociales.

Buena parte del esfuerzo investigador sobre las causas y los remedios del PMS y el PDD se ha dirigido a los factores físicos y fisiológicos, aunque desde hace siglos se reconoce que el cuadro premenstrual tiene componentes psicológicos y sociales notables^{21,22}.

EL ESENCIAL REGISTRO DE SÍNTOMAS

Se ha identificado un número elevado de síntomas clínicos del PMS, que son variables y difíciles de cuantificar. Abarcan emociones, sensaciones sexuales, estados de ánimo, cambios en el comportamiento social y síntomas somáticos. A pesar de una cantidad notable de cuestionarios, propuestos desde diferentes disciplinas, sigue siendo difícil encontrar un método fiable y objetivo para observar y evaluar los síntomas que se experimentan internamente y que no se expresan —o sólo de forma indirecta o tangencial— en síntomas o comportamientos externos²³.

La elevada discrepancia entre los datos tomados de forma retrospectiva o prospectiva está bien documentada y reconocida (aunque a veces los resultados coinciden)²⁴⁻²⁶. Como consecuencia de ello, hay consenso en que el registro siempre debe ser prospectivo. Este requisito —el único sobre el que hay consenso— se refleja en las exigencias y recomendaciones diagnósticas del DSM-IV de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) de Estados Unidos, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos

498 gos (ACOG), la Academia de Médicos de Familia (AAFP) de Estados Unidos y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Las mujeres usan la menstruación como un marcador del tiempo, y las experiencias desagradables, fáciles de recordar, son atribuidas a un indicador reconocible. Si nuestra cultura condiciona a las mujeres a esperar síntomas premenstruales y retención de líquidos, dolor y reacciones emocionales, eso es precisamente lo que informarán^{24,27}.

¿Hay un síndrome premenstrual específico? Una definición del PMS debería considerar que el síndrome compagina cambios fisiológicos con cambios en la conducta social, síntomas somáticos y problemas psicológicos, como si hubiera un síndrome coherente. Parte de esta dificultad es que todas las herramientas de investigación reflejan el modo en que el creador de la herramienta concibe el PMS lo que, a su vez, se basa en el bagaje cultural y académico del autor²⁸. Es aconsejable que el registro sea un autorregistro, para controlar el efecto de las expectativas de quien realiza el ensayo²⁹⁻³¹.

La interpretación de los resultados de los estudios se complica por el ya mencionado alto porcentaje de respuestas al placebo. Sólo son fiables los datos de estudios con un protocolo adecuado, doble ciego, controlado con placebo y aleatorizado³².

Hay más de 30 instrumentos diagnósticos para el PMS y/o el PMDD disponibles, pero pocos proporcionan una base fiable para un diagnóstico²⁵. No disponemos de ningún cuestionario técnicamente validado.

Pocos de los cuestionarios disponibles cumplen dos criterios elementales³³.

El primer criterio trata de la rigurosidad en la recogida de datos. La recogida retrospectiva distorsiona, pero la recogida prospectiva fomenta una interferencia incontrolable del factor placebo.

El segundo criterio exige una mínima interferencia en la práctica clínica por el hecho de aplicar el instrumento psicométrico. La mencionada interferencia del factor placebo desempeña también un papel determinante, pero además es excesiva la extensión de los registros y cuestionarios sobre el PMS, que intentan cumplir la exigencia del DSM-IV de que se haga el registro a diario durante al menos 2 meses, con largas listas de síntomas^{34,35}.

Los problemas logísticos resultantes de cualquier registro diario durante un tiempo prolongado nece-

sitan soluciones modernas. Se ha comprobado que el registro electrónico de datos es eficaz y preferido por el 70% de los usuarios³⁶. Sin embargo, también hay la alternativa de registrar factores, o sea, grupos de síntomas en vez de síntomas aislados, con lo cual se reduciría el número de datos. Obviamente, esta tarea necesita que se entrene a la paciente en el contenido global de cada factor.

Tanto el facultativo como la paciente deben tener presente que el mismo hecho de cumplimentar el autorregistro durante 2 o 3 meses puede tener un efecto terapéutico («placebo») notable³⁷. Llevar un adecuado registro diario de síntomas del PMS ayuda a reducir éste o el PMDD³⁸.

En vista de la concurrencia de síntomas del PMS con trastornos depresivos y ansiosos, con una superposición a veces difícil de distinguir, es preciso que se apliquen algoritmos diagnósticos diferenciales en un momento temprano.

¿Durante cuántos días hay que registrar datos para medir 2 ciclos menstruales? (fig. 1)

Las características básicas compartidas del PMS y del PMDD son las siguientes:

1. Los síntomas son cíclicos.
2. La gravedad de los síntomas es relativa e individual.

Por tanto, el DSM-IV exige que se determine la ciclicidad, midiendo los síntomas durante 2 ciclos menstruales, y el NIMH propone el criterio de que la intensidad de los síntomas incremente al menos el 30% en el período premenstrual.

Sin embargo, para tomar los datos relevantes para el PMS o el PMDD durante 2 ciclos menstruales no basta con un registro de 2 meses, sino que debe ser un registro de 2 meses y al menos 3 días, preferiblemente una semana. No puede ser menos porque debe empezar el registro el primer día del ciclo, que es la única referencia concreta que se tiene en el ciclo menstrual. Como el primer día del ciclo es el primer día de la regla, los días de la menstruación del primer ciclo no nos ofrecen referencias premenstruales y tenemos que esperar a la próxima fase lútea que es cuando los síntomas pueden aparecer. Igualmente, al final del primer ci-

	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<u>7</u>	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Gris: fase lútea, susceptible al PMS
Blanco: fase folicular, asintomática para el PMS

Subrayado: regla de 28 días
Cursiva: días **especialmente** susceptibles al PMS

Figura 1. Ciclo menstrual medio de 28 días. PMS: síndrome premenstrual.

clo menstrual medido, necesitamos los primeros días de la menstruación del segundo ciclo para completar el primer «ciclo de datos premenstruales». En definitiva, al final del segundo mes se necesita tomar los datos de al menos 3 días de la menstruación del tercer mes para completar este segundo ciclo.

Esta realidad ginecológica no se ve recogida en el DSM-IV ni en los cuestionarios disponibles, que son estructurados para medir 2 meses ováricos pero no 2 ciclos «premenstruales» completos.

El hecho de que el registro de datos deba iniciarse el primer día de la regla, aunque el significado estadístico del registro no empiece hasta comenzar la fase lútea, ofrece —además de datos de línea base— una posibilidad de entrenar y acostumbrar a la paciente a la tarea del registro diario, sin que las posibles equivocaciones vicien los datos relevantes.

El Perfil Premenstrual (The Premenstrual Profile)

El Perfil Premenstrual se desarrolló en 2004 como un modelo teórico psicométrico. El valor de un método psicométrico, como un cuestionario, está condicionado por los criterios diagnósticos especificados, validados y aceptados por la disciplina médica referida. En el caso del PMS no hay aún tales criterios, sólo constan sugerencias, indicios y propuestas.

Además, en este caso el cuestionario debe contribuir a desgranar una aparente pero falsa continuidad y establecer una distinción clínica entre los síntomas premenstruales comunes, el PMS y el PMDD.

El desarrollo en el tiempo de cuestionarios desde los años sesenta y su análisis estadístico ha revelado que se pueden identificar «factores», o grupos de síntomas de una misma clase de manifestaciones. La investigación desde Moos empezó con 8 factores, que en posteriores comprobaciones se redujeron a 4 y, últimamente, siguiendo a Steiner³⁹, a 3 factores provisionales de primer orden, que el Perfil Premenstrual recoge y define del modo siguiente:

— Factor I: desánimo o ánimo negativo. Incluye DSM-IV categorías 1-7 y 10.

— Factor II: dolor e incomodidad. Incluye DSM-IV categorías 8, 9, 11 (en parte).

— Factor III: retención de líquidos. Incluye DSM-IV categoría 11 (en parte) (tabla 4).

A diferencia del cuestionario tradicional que aspira a tomar una cantidad de datos, necesaria para llegar a un diagnóstico por umbral calculado, un perfil psicométrico como el presente pretende recoger los datos imprescindibles para un cribado fundamentado. La utilidad de perfiles se ha establecido en otras situaciones donde el facultativo no dispone de métodos diagnósticos validados (p. ej., en el riesgo de suicidio por alteraciones anímicas durante el embarazo)⁴⁰. En el presente caso, el Perfil Premenstrual se define como un autorregistro prospectivo diario por ciclo menstrual que tiene los siguientes objetivos:

1. Determinar la ciclicidad de los 3 factores primarios más comúnmente relacionados con la alteración premenstrual.

2. Valorar la percepción subjetiva de estos tres factores de forma objetiva.

La paciente indica a diario la percepción global del grupo de síntomas en cada uno de los tres factores, así como si el síntoma llega a limitar o imposibilitar la ejecución de las tareas habituales. Los datos psicométricos objetivos resultantes se valoran según criterios sintomáticos del DSM-IV además del criterio del NIMH y otros investigadores, como Rubinow y Steiner, que exigen un incremento sustan-

Tabla 4 Instrucciones para la paciente

- Cada factor se refiere a un conjunto de síntomas y sensaciones más o menos relacionados. Lee el contenido de cada factor varias veces para familiarizarte con su contenido global
- El registro empieza por el primer día de tu ciclo menstrual, que es el primer día de la regla
- Cada día, aproximadamente a mediodía, apunta en el cuadro correspondiente la intensidad con que notes el conjunto de cada factor respecto al día anterior. Marca «0» cuando no tienes síntomas, «1» cuando los síntomas son leves, «2» cuando son de intensidad media y «3» cuando son fuertes y te hace sufrir
- Una vez que hayas tomado buena nota de sus contenidos, no es preciso que te sigas fijando en los detalles. Simplemente apunta la intensidad del conjunto global del factor, tal como se representa por su nombre: «desánimo», «dolor», «hinchazón»
- Si algún factor se presenta con tal intensidad que imposibilita tu funcionamiento habitual, es decir, no puedes (bien) hacer tus tareas habituales, rodea la marca para indicar esta merma de tu funcionalidad; por ejemplo si son fuertes y además incapacitantes: ③
- Cumplimenta el registro durante al menos 2 ciclos menstruales y la semana siguiente

Los tres factores son:

1. Ánimo negativo o desánimo.

Comprende: ánimo notablemente deprimido, sentimientos de desesperanza o pensamientos de baja autoestima; notable ansiedad, tensión, sensaciones de sobreactivación o de hiperalerta; notable inestabilidad emocional, como sentimientos repentinos de tristeza o ganas de llorar o una sensibilidad al rechazo incrementada; ira o irritabilidad persistente, incremento en el número de conflictos personales; interés disminuido en las actividades usuales, como el trabajo, colegio, amigos, aficiones; sentimientos subjetivos de dificultad de concentración; disminución de la libido*, letargia, fatiga rápida o notable falta de energía; un sentimiento subjetivo de estar abrumada o fuera de control

2. Dolor e incomodidad.

Comprende: cambio notable en el apetito, sobreingesta o antojos alimentarios específicos; hipersomnias o insomnio; otros síntomas físicos, como mamas sensibles o dolorosas, cefalea, dolor abdominal o de estómago, dolor articular o muscular

3. Hinchazón/retención de agua.

Comprende: mamas aumentadas; sensación de distensión abdominal; edema o hinchazón de manos, pies, piernas; incremento de peso

Ejemplo del Perfil Premenstrual para un ciclo menstrual de 28 días - con un diagnóstico de PMDD.

(Nota: el autorregistro debe admitir ciclos de hasta 40 días)

Desánimo	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	③	2	③	③	2	③	③	③	
Dolor	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	1	2	2
Retención del líquido	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Día del ciclo	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Regla	X	X	X	X	X																							

Símbolos: 0: sin síntomas; 1: síntomas leves; 2: síntomas medianos; 3: síntomas fuertes. Los mismos símbolos, pero rodeados con un círculo ③: no puedes con tus tareas habituales o sólo parcialmente. X: días de menstruación.

Instrucciones para el facultativo

Leer con la paciente el contenido de los 3 factores y subrayar que el registro diario tiene por objetivo reflejar el cambio global de cada factor. La paciente no debe hacer un cálculo meticuloso por partes, pero simplemente debe preguntarse «¿Qué tal las molestias?» y apuntar la percepción global. Lo mismo para cada uno de los 3 factores

Explicar bien la diferencia entre tener molestias y verse afectada en las tareas diarias a causa de éstas. Cuando la intensidad total de los síntomas de un determinado factor empieza a dificultar o imposibilitar las tareas habituales, debe marcarlo con un círculo de llamada de atención. Así, la primera vez será un 3 con un círculo ③ para señalar: «desánimo» (o dolor, o retención de líquidos) «fuerte e incapacitante». Si el día siguiente el factor tiene la misma intensidad y sigue dificultando las tareas, sigue con la misma marca, hasta que vuelva la funcionalidad y se apunta la intensidad sin círculo de llamada de atención

Explicar el Perfil Premenstrual necesita entre 5 y 7 min

Resultados y diagnóstico

A. El período premenstrual puede manifestarse desde el día 13 del ciclo, aunque en la mayoría de casos comienza en los 7 días antes de la regla. El Perfil considera que la semana antes de la regla es el período premenstrual

Continúa en la pág. siguiente

Tabla 4 Instrucciones para la paciente (Continuación)

- B. No se tiene en cuenta las marcas de los primeros 7 días del primer ciclo menstrual. Es un período de «entrenamiento» para que la paciente se acostumbre al registro diario
- C. Una vez completado el tiempo de registro de 2 meses y una semana, se compara la puntuación media por día de ambos períodos foliculares (días 1 a 13) con la puntuación media por día de ambos períodos lúteos (días 13 hasta fin de ciclo). Una puntuación media lútea que supera en un 50% o más a la media folicular se considera indicio de o bien PMS o PMDD
- D. Una puntuación media folicular de 1 o más, o bien marcas con círculo que indican días disfuncionales, son indicio de posible patología o trastorno específico, diferente del PMS o del PMDD, y necesita un diagnóstico diferencial
- E. Días 22-28 del ciclo. Una puntuación media de 3 es indicativa de PMS. Una o 2 puntuaciones con círculo son indicativas de PMS.
- F. Días 22-28 del ciclo. Tres o más días con puntuaciones con círculo son indicio de PMDD, por confirmar con un cuestionario validado de depresión y de ansiedad

*También puede haber aumento de la libido, pero los síntomas positivos no se reflejan en el cribado.

PMS: síndrome premenstrual; PMDD: trastorno disfórico premenstrual.

cial (entre el 30 y el 50%) de los síntomas en la fase lútea tardía y de una disminución sustancial de éstos en el comienzo de la fase folicular.

El Perfil Premenstrual se utiliza para recoger datos durante al menos 2 ciclos menstruales más 3 días, con lo cual reflejará los cambios subjetivos en los 3 conjuntos de síntomas, durante 2 fases lúteas enteras y la vuelta de éstas a la fase folicular.

El Perfil Premenstrual se ha validado provisionalmente con una muestra de nacionalidad diversa (n = 20). Está pendiente de validación en población española.

TRATAMIENTOS DE LAS ANOMALÍAS PREMENSTRUALES BASADOS EN LA EVIDENCIA

Cada teoría fisiológica en cuanto a la etiología del PMS ha propuesto diferentes métodos de tratamiento. Según una revisión de 1997, los estudios no demostraron beneficio concreto alguno superior al del placebo de las modalidades terapéuticas siguientes⁴¹: anticonceptivos orales, vitamina B₆, bromocriptina, inhibidores de la monoaminooxidasa, progestágenos sintéticos, espironolactona, aceite de onagra (prímula) y progesterona.

Estos resultados experimentales aparentemente negativos no implican que estas sustancias no produzcan efecto terapéutico, sino que el efecto placebo puede ser tan grande como el efecto médico del tratamiento⁴². Las recomendaciones terapéuticas comentadas a continuación muestran la difícil dualidad entre los actuales datos experimentales no concluyentes y las posibilidades derivadas de los datos clínicos.

Anticonceptivos orales

El ACOG recomienda el uso de los anticonceptivos orales para tratar el cuadro premenstrual. Numerosos estudios cuestionan la efectividad de los anticonceptivos orales como tratamiento del PMS⁴³ especialmente en cuanto a los síntomas anímicos⁴⁴, pero nuevos estudios multicéntricos con anticonceptivos modernos de dosis baja (desogestrel, levonorgestrel, drospirenona) indican que unos reducen la dismenorrea y el PMS en general, mientras otros tienen efectos positivos sobre una amplia gama de efectos físicos⁴⁵⁻⁴⁷.

Espironolactona

Es un diurético con propiedades antiandrogénicas y antimineralcorticoides. Varios ensayos adecuados, a doble ciego y controlados con placebo, no lograron demostrar un impacto clínico ni la eliminación de edema, superior al del placebo^{48,49}. Algunos estudios posteriores, sin embargo, revelan un efecto moderado positivo⁵⁰.

Aceite de onagra

Se ha argumentado que las pacientes con PMS tienen una deficiencia en el metabolismo de ácidos grasos, y se ha recomendado tratamiento con aceite de onagra. Este aceite se extrae de la semilla de la prímula; contiene ácido linoleico y gammalinoleico, que son precursores de la prostaglandina E. En estudios adecuadamente controlados y ciegos, no se

502 ha podido demostrar la superioridad del aceite sobre el placebo⁵¹⁻⁵⁵.

Progesterona

Siguiendo las recomendaciones de la recién fallecida profesora Dalton⁵⁶, se solían utilizar inyecciones o supositorios vaginales de progesterona en todo el mundo. Los primeros 4 estudios que no hallaron efectos positivos con este tratamiento fueron criticados por el tamaño de la muestra y la dosis de progesterona⁵⁷⁻⁶⁰. Pero también algunos estudios con un buen protocolo encontraron que ni la progesterona ni el placebo mejoraron los síntomas⁶¹⁻⁶³. En sólo un estudio sobre 23 mujeres altamente motivadas se ha comunicado un efecto beneficioso del tratamiento con progesterona, aunque el mayor efecto se limitó al primer mes de tratamiento⁶⁴.

Histerectomía y ooforectomía bilateral

Es cierto que no se ha encontrado una causa orgánica de la problemática premenstrual, sino indicios claros de varias causas, entre ellas orgánicas. No se ha podido definir las causas necesarias.

El síndrome sólo lo presentan las mujeres con una funcionalidad intacta, así que la ovariectomía u ooforectomía tanto quirúrgica como química —por supresión de la gonadotropina— se presenta como una solución para el PMS grave. No todas las mujeres con PMS o PMDD querrán cambiar su problemática premenstrual por una menopausia prematura inducida.

Las respuestas a la histerectomía y la ooforectomía bilateral quirúrgicas en mujeres que no respondían al tratamiento médico son duraderas^{63,65-72}.

En general, la respuesta a la supresión ovárica con un agonista de la GnRH sugiere que los síntomas de PMS representan una respuesta anormal a cambios hormonales normales⁷¹.

Suplementos de calcio, magnesio y vitamina B₆

En un ensayo controlado con placebo y aleatorizado se encontró que el suplemento de calcio (1.200 mg/día) se asociaba con una disminución del 48% en las valoraciones atribuidas a los síntomas, mien-

tras en el grupo tratado con placebo la reducción fue del 30%⁷². Algunos estudios posteriores confirman estos resultados, así como los efectos positivos⁷³. El suplemento de magnesio (200 mg/día) y un suplemento con una reducida cantidad de vitamina B₆ (50 mg/día) reducían el PMS, sobre todo a partir del segundo mes^{74,75}.

Antidepresivos

La serotonina interviene en la regulación del comportamiento y del ánimo de las personas. Algunos estudios indican que las mujeres con PMS presentan valores bajos de serotonina durante todo el ciclo y, por consiguiente, pueden ser vulnerables al desarrollo de estados disfóricos, como en el PMS o el PMDD. Otros datos parecen indicar que los valores de serotonina pueden verse afectados durante el período premenstrual. Se han publicado ensayos aleatorizados, a doble ciego y controlados con placebo, en los que se obtuvieron resultados positivos tanto respecto a los síntomas físicos como afectivos en hasta un 60% de las pacientes con los antidepresivos fluoxetina, comipramina, sertralina, citalopram, paroxetina y (en menor grado) el ansiolítico alprazolam^{63,76-82}. Los antidepresivos no serotoninérgicos, como maprotilina y desipramina, no presentaron los mismos resultados⁸³. Con fluoxetina se obtenían resultados en un plazo de 2-3 meses, y una dosis de 20 mg de fluoxetina es tan efectiva como las dosis más altas, con menos efectos secundarios asociados^{76,77,81,82,84}.

En un buen porcentaje de casos puede ser efectivo el tratamiento limitado a la fase premenstrual, que puede incluso ser más eficaz que cuando se administra de forma continuada⁸⁵⁻⁸⁷. Los efectos beneficiosos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) —aunque no en todos los casos— sugieren que hay un desequilibrio serotoninérgico, relacionado con los cambios cíclicos en los esteroides gonadales⁸⁸. Sin embargo, los ISRS sólo modulan lentamente los valores de serotonina, así que no está claro cómo un tratamiento intermitente puede ser eficaz. Aunque los efectos serotoninérgicos parecen más acusados que los noradrenérgicos⁸⁰, la noradrenalina en plasma no muestra ciclicidad en mujeres con PMS, mientras en mujeres sin PMS es claramente cíclica, con máximos durante la ovulación y la fase lútea inicial. Se observó que los

valores de noradrenalina muestran una correlación negativa con cambios de humor y cefalea⁸⁹. Por tanto, puede que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina (ISRNS) tengan un efecto sobre el PMS, diferente de los ISRS. Como alternativa para las pacientes con problemas gastrointestinales u otros a causa de los ISRS, se ha sugerido el hipérico (hierba San Juan), que en un estudio mostró ser efectivo (n = 1)⁹⁰.

Aunque en 2002 la fluoxetina se autorizó para el PMDD por las autoridades estadounidenses (FDA), en junio de 2003 la Comisión Europea estableció que el trastorno no se encuentra en la clasificación internacional de enfermedades y que en el DSM-IV sólo se describe como un diagnóstico de investigación. La Comisión obligó al fabricante de Prozac, una marca comercial de la fluoxetina, a eliminar el PMDD como indicación del prospecto del fármaco. La FDA también está bajo presión para que tome la misma medida⁹¹. Sin embargo, en 2005 autorizó otro ISRS, la paroxetina, para el PMDD.

Además de los ISRS, parecen modestamente efectivos la buspirona y el alprazolam^{63,92-94}. El triptófano reduce los síntomas más que el placebo, pero su uso es limitado por razones de seguridad. En cambio, el litio no produce ningún efecto.

Hábitos alimentarios

Los cambios en la dieta habitual han demostrado una eficacia parcial en ciertos síntomas. Esta eficacia tiene fundamentos biológicos:

— Una posible deficiencia en los valores de serotonina circulante puede compensarse aumentando la presencia de triptófano mediante la toma de más carbohidratos u otros alimentos altos en triptófano, con lo cual mejorarían los síntomas anímicos.

— La reducción de ingesta de azúcares refinados y sales reduce la retención de líquidos⁹⁵.

— La reducción de ingesta de metilxantinas (café, té, colas, chocolate) reduce la molestia mamaria⁹⁶.

Fitoterapia

La eficacia del tratamiento fitoterapéutico de la problemática premenstrual con *Vitex agnus castus* es-

tá bien demostrada y recogida en Evidence Based Mental Health (Salud Mental Basada en la Evidencia).

Schellenberg encontró que el tratamiento con 20 mg una vez al día de *Vitex agnus* o sauzgatillo o pimienta de los monjes reducía en un 50% o más la irritabilidad, la alteración anímica, la ira, la cefalea y el aumento mamario^{97,98}. El extracto actúa como un agonista dopaminérgico, inhibiendo la liberación de prolactina y probablemente incrementando la secreción de estrógenos. La planta contiene flavonoides que se ligan a los receptores benzodiazepínicos y presenta propiedades antidepressivas y ansiolíticas similares a los estrógenos y a la progesterona, cuyas concentraciones descienden durante el período premenstrual, lo que se asocia con la disforia premenstrual⁹⁸. Un estudio comparativo, prospectivo, doble ciego con fluoxetina y *Vitex agnus castus* demostró una eficacia comparable (el 68,4 frente al 57,9%), aunque la fluoxetina era más eficaz para los síntomas psicológicos y *agnus castus* reducía principalmente los síntomas físicos⁹⁹.

Terapia psicológica

El PMS debe considerarse una condición psicopsicótica, correlacionada con una ciclicidad biológica. No debe limitarse, pues, al tratamiento farmacológico de los síntomas fisiológicos o anímicos, sino abarcar el tratamiento adecuado de todos los factores implicados. La bibliografía moderna sobre el síndrome hace hincapié en que el médico intente conseguir que la paciente considere los síntomas premenstruales con menor negatividad, instigándole de esta forma a aplicar una especie de terapia psicológica «ligera», aunque su labor sigue enfocándose en la farmacoterapia o la cirugía.

Si los componentes psicológico y social del síndrome representan una influencia tan notable, los tratamientos psicológicos y sociales deben de ocupar un lugar destacado tanto en la investigación como en la práctica clínica, no en versiones *light* sino de forma profesional y validada^{100,101}.

Hace unos 20 años, Keye y Trunnell combinaron lo que se sabía desde hace tiempo en un modelo biopsicosocial del síndrome premenstrual, con su correspondiente forma de evaluar a las mujeres con PMS sobre la base de seis factores. Aunque su modelo no se adecua del todo a la problemática pre-

504 menstrual, desde entonces ha ganado terreno la convicción de que, en la mayoría de los casos, no basta con prescribir un fármaco, no es suficiente cambiar hábitos ni tampoco reducir el estrés, sino que debe aplicarse una apropiada terapia multidisciplinaria^{102,103}.

La importancia de lo que se ha identificado como «vías sociales hacia los síntomas premenstruales» se analizó en un estudio publicado en 1995, en que se identificaron tres patrones de síntomas perimenstruales: el síntoma de baja intensidad (PS), el PMS y la magnificación premenstrual (PMM). El análisis funcional discriminatorio por pasos demostraba que la diferencia entre mujeres con PS y con PMM radica en el contexto del estrés vital, la socialización menstrual y las expectativas acerca de los síntomas relacionados con la menstruación. Además, el factor diferenciador entre los tres grupos fue el ánimo depresivo¹⁰⁴. Un pequeño estudio español del mismo año estableció que una charla informativa sobre la menstruación tiene un efecto positivo duradero sobre el PMS¹⁰⁵.

La ansiedad como rasgo y como estado tiene correlaciones destacadas con la problemática premenstrual. La fase premenstrual suele incrementar el nivel de estrés en las mujeres, tanto si padecen PMS como si no¹⁰⁶. En otro estudio, las mujeres con habilidades de resolución de problemas y estrategias de afrontamiento mostraron niveles bajos de dolor premenstrual y menstrual, mientras que las que se confiesan ineficaces en cuanto al control personal presentan altos niveles de malestar premenstrual y menstrual¹⁰⁷. El autodiagnóstico de PMS tiene efectos negativos sobre la conducta y los sentimientos^{108,109}. Todo esto demuestra el hecho conocido de que el estrés predispone y aumenta la percepción de estímulos negativos. Por tanto, mejorar la evaluación y las actitudes sociales y personales puede ayudar a reducir la percepción de síntomas aunque no se eliminarán hasta haberse reducido también el componente biológico.

Posiblemente los modelos biopsicosociales del síndrome premenstrual no podrán explicar el origen del problema, sino, a lo sumo, el alcance de la vivencia subjetiva y los factores que en él inciden. Las variaciones biológicas no necesariamente alcanzan valores de anormalidad, sino que contribuyen a un desalojo del organismo de su plataforma homeostática, con lo cual se crea la base para una sintoma-

tología en los casos donde la persona no tiene los medios necesarios para absorber este desarreglo, bien porque faltan respuestas bioquímicas adecuadas, o bien porque no dispone de habilidades psicológicas suficientes. De esta forma, se especifica la interacción de los factores biológicos, psicológicos y sociales en cuanto a la génesis y el mantenimiento de la problemática premenstrual. Nuestro modelo acepta que hay una base biológica real del problema (el fallo homeostático), y no trata de achacar la sintomatología a aspectos sociales o psicológicos exclusivamente. La propuesta desengrana la supuesta aparente continuidad entre el PMS y el PMDD, y deja de un lado el PMDD como trastorno anímico específico del período premenstrual y de otro, el PMS como desequilibrio cíclico biológico con componentes sociopsicosomáticos. De este modo, el modelo rechaza la sugerencia de diversos autores de que el PMS implica un «problema comportamental», porque las manifestaciones biológicas pueden ser muy reales. Sólo si se tratara de una problemática de estado de ánimo, que coincida con los criterios diagnósticos del DSM-IV, estaría justificado el diagnóstico de «problema mental».

El hecho de que el PMS tenga un factor psicológico importante no significa que durante la fase lútea tardía la mujer vea mermada sus facultades cognitivas. Aunque algunas teorías sugieren algo parecido, se ha demostrado que no hay una reducción de las capacidades cognitivas en las mujeres con PMS, aunque ellas mismas se sientan más torpes¹¹⁰. Lo que aportó este estudio también es el dato ya comprobado clínicamente por la eficacia de los antidepresivos ISRS, de que la mujer con PMS muestra un estado significativamente más depresivo que el grupo control.

Las mujeres premenstruales se sienten a veces torpes sin serlo, también creen que están más tristes o emotivas en esos días de lo que en realidad son. Los datos prospectivos de un amplio estudio (n = 2.447) demostraron que estas mujeres no lloran más durante el período premenstrual, aunque en sus opiniones retrospectivas decían que sí¹¹¹.

El tratamiento del factor psicológico del PMS con terapia cognitivo-conductual ha demostrado su eficacia comparada con los conocidos tratamientos farmacológicos¹¹². Una investigación del John Radcliffe Hospital de Oxford determinó que la terapia cognitiva provocaba una remisión casi total a me-

Tabla 5 Recomendaciones clínicas del ACOG (2000)¹⁰⁰

Recomendaciones con evidencia científica sólida y consistente (nivel A):

- Las mujeres con diagnóstico de PMS deben reunir los criterios diagnósticos estandarizados y se debe confirmar la correlación de sus síntomas con el ciclo ovárico con un calendario sintomático prospectivo
- Los factores de riesgo como un estrés incrementado y determinados tipos de personalidad dificultan la diferenciación de mujeres con y sin PMS
- Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS), especialmente fluoxetina y sertralina, han demostrado ser eficaces en el tratamiento del PMS
- La mayor parte de la evidencia científica no apoya el uso de progesterona natural o de aceite de onagra en el tratamiento del PMS

Recomendaciones con evidencia científica limitada o inconsistente (nivel B):

- El uso de agonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina (GnRH) así como la ovariectomía quirúrgica han demostrado ser eficaces en PMS. Sin embargo, los efectos colaterales de los agonistas GnRH y la ovariectomía limitan su uso en la mayoría de pacientes
- El tratamiento con el ansiolítico alprazolam es eficaz en algunas pacientes. Sus efectos colaterales limitan su uso a situaciones puntuales de corta duración
- Comida y bebidas ricas en hidratos de carbono pueden mejorar los síntomas anímicos y los antojos en mujeres con PMS y son una aproximación de primera línea razonable en muchas pacientes
- Los suplementos de calcio han demostrado su eficacia en el tratamiento del PMS
- El magnesio, la vitamina B₆ y la vitamina E tienen una eficacia mínima en el tratamiento del PMS
- Los anticonceptivos orales pueden mejorar los síntomas físicos del PMS

Recomendaciones basadas mayoritariamente en el consenso y la opinión de expertos (nivel C):

- La terapia de apoyo es central para el manejo de todas las pacientes con PMS
- Se puede recomendar el ejercicio aeróbico a las pacientes con PMS
- Como aproximación clínica general, los tratamientos se deben emplear en orden ascendente de complejidad. Usando este principio, en la mayoría de los casos, las terapias deben utilizarse en el siguiente orden:

Paso 1. Terapia de apoyo, dieta rica en hidratos de carbono, ejercicio aeróbico, suplementos nutricionales (calcio, magnesio, vitamina E), espirolactona

Paso 2. ISRS (fluoxetina o sertralina como primera selección); para las mujeres que no responden, considerar un ansiolítico para síntomas específicos

Paso 3. Supresión hormonal de la ovulación (anticonceptivos orales o agonistas GnRH)

PMS: síndrome premenstrual.

dió plazo de los síntomas psicológicos y somáticos¹¹³. Los antidepresivos ISRS se han popularizado por su eficacia relativa, pero varios estudios que compararon los efectos de la fluoxetina con los efectos de la terapia cognitivo-conductual en mujeres con PMDD confirman que esta última es igual de efectiva que la fluoxetina a 6 meses, y más efectiva a 12 meses por haber aprendido estrategias conductuales adaptativas (*doping*). La combinación de ambos tratamientos no aumentó los beneficios^{114,115}.

Faltan más estudios controlados para verificar la eficacia de las terapias cognitivo-conductuales.

Estrategias conductuales adaptativas (*coping*): pasos a seguir

El ACOG acordó en 2000, sobre la base de la evidencia disponible en aquel momento, unas recomendaciones que, curiosamente, priman los tratamientos que no gozaban de apoyo científico suficiente, pero que se consideraban clínicamente mejores entre las alternativas disponibles. Dichas recomendaciones se dividen en 3 grupos, según el nivel del apoyo científico que tienen, para concluir con los 3 pasos en que debe estructurarse la aproximación clínica que, según el ACOG, empieza por

Tabla 6 Directivas para el manejo del PMS y del PMDD de Dickerson, Mazyck y Hunter en American Family Physician (2003)

Todas las mujeres con PMS o PMDD
 Tratamiento no farmacológico: educación, terapia de apoyo, descanso, ejercicio, modificaciones de la dieta

Registro diario de síntomas para identificar los momentos para aplicar tratamientos y para realizar un seguimiento de la reducción de síntomas

Tratamiento de síntomas específicamente físicos
 Edema, hinchazón: espironolactona

Cefalea: analgésicos no esteroideos como paracetamol, ibuprofeno o naproxeno

Fatiga e insomnio: entrenamiento en higiene del sueño y restricción de cafeína

Sensibilidad mamaria: vitamina E, aceite de onagra, espironolactona en la fase lútea o danazol

Tratamiento de síntomas psicológicos
 Para los síntomas de PMDD: terapia continua o intermitente con un ISRS

Fracaso de tratamiento
 Terapia hormonal con que manipular el ciclo menstrual

PMDD: trastorno disfórico premenstrual; PMS: síndrome premenstrual.

los tratamientos más livianos, aunque de menor nivel de evidencia. Se trata, por tanto, de una «intuición clínica compartida», solo parcialmente respaldada por hechos experimentalmente comprobados.

La AAFP y el ACOG, como se refleja en las tablas 4 y 5, consideran que a todas las pacientes con PMS inicialmente se debe ofrecer tratamiento no farmacológico, incluidos los tratamientos sociopsicológicos, como son: educación de la paciente, terapia de apoyo y cambios de conducta¹¹⁶. Aun así, no han llegado a un consenso en cuanto a la definición del PMS o de sus características diagnósticas. Tampoco se han adaptado las recomendaciones de tratamiento a la evidencia disponible.

En 2005 la SEGO publicó un Informe de Consenso que, tanto en su descripción de la problemática como en las recomendaciones de tratamiento, dista notablemente de los consensos estadounidenses y británicos

Tabla 7 Eficacia de tratamientos no farmacológicos

Evidencia positiva y relativamente consistente de beneficios notables

- Vitex castus (fitoterapia)
- Calcio
- Vitamina B₆

Evidencia contradictoria, insuficiente o preliminar de beneficios posibles

- Aceite de onagra
- Gluconato de potasio
- Magnesio
- Vitamina E
- Comida o bebida rica en hidratos de carbono
- Reducir o evitar azúcar, alcohol, cafeína, grasas

Evidencia por su eficacia en síntomas anímicos y cuadro depresivo

- Hipérico (hierba de San Juan)

Figura 2. Algoritmo diagnóstico de síntomas premenstruales (PS), síndrome premenstrual (PMS) y trastorno disfórico premenstrual (PMDD). (Modificado de Campagne et al, 2004.)

referidos, así como los datos experimentales más recientes. Es necesaria una unificación de criterios diagnósticos y pautas de tratamiento (tablas 6 y 7).

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES CLÍNICAS

La ciclicidad ovárica de la mujer en edad reproductiva afecta a diversos parámetros fisiológicos, hormonales y neurológicos, lo cual produce una sintomatología premenstrual diversa sin causa única específica. Los problemas clínicos que resultan de ella pueden mermar notablemente la calidad de vida, o bien impedir la funcionalidad de la mujer durante un tiempo de varios días antes de la regla. Los desarreglos hormonales cíclicos pueden ser una de sus causas, pero se han identificado otras, entre ellas una especial sensibilidad a la retirada (parcial) de sustancias hormonales o neurosteroideas relacionadas con los cambios cíclicos. Además, la gravedad percibida de los síntomas depende de las habilidades psicológicas de la persona y, por tanto, de una valoración subjetiva (fig. 2).

Las 2 vertientes «anormales» de los cambios premenstruales son el PMS y el PMDD. El requisito indispensable para el primero es la presencia de síntomas biológicos y posiblemente anímicos, mientras que el segundo requiere la presencia dominante de síntomas anímicos. El primero produce una considerable merma de la calidad de vida, mientras el se-

gundo ocasiona necesariamente la disfuncionalidad durante unos cuantos días. En la figura 2 se incluye un algoritmo clínico elemental relacionado con ello.

Si el diagnóstico inicial es de PMDD, el facultativo debe remitir o al menos consultar al especialista en psiquiatría, para el adecuado tratamiento de este (provisional) trastorno mental. La revisión actual de Grady-Weliky¹¹⁷ establece una orientación sobre el tratamiento clínico del PMDD.

En otros muchos aspectos el PMS y el PMDD pueden compartir elementos. Es importante que se establezca y se tenga presente la distinción clínica entre ambas «anomalías», para evitar que se aplique, sin razón fundada, el estigma de «trastorno mental» o «anomalía comportamental» a la mujer que padece el PMS. Es imprescindible, además, que se verifique, mediante el diagnóstico diferencial, que la sintomatología no se deba a otras causas, como podría ser la exacerbación durante la fase premenstrual de cuadros psíquicos o físicos subyacentes. A tal fin es de obligado uso un registro de los síntomas premenstruales durante al menos 2 ciclos completos.

Finalmente, se necesita más investigación en cuanto a los efectos de los fármacos, la fitoterapia, los tratamientos psicológicos y de otras intervenciones de los que ya se ha evidenciado su eficacia, con el fin de determinar un algoritmo de tratamiento clínico multifactorial y multidisciplinario. Hasta entonces, el clínico puede guiarse por las recomendaciones y evidencias que se recopilan en las tablas 5-7.

BIBLIOGRAFÍA

1. American Psychiatric Association (1994/2002). Manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales. Texto revisado (DSM-IV-TR), APA Washington. Barcelona: Masson; 2002.
2. Rubinow DR, Schmidt PJ. Premenstrual syndrome: a review of endocrine studies. *Endocrinologist*. 1992;2:47-56.
3. Schmidt PJ, Purdy RH, Moore Jr PH, Paul SM, Rubinow DR. Circulating levels of anxiolytic steroids in the luteal phase in women with premenstrual syndrome and in control subjects. *J Clin Endocrinol Metab*. 1994;79:1256-60.
4. Lombardi I, Luisi S, Quirici B, Monteleone P, Bernardi F, Liut M, et al. Adrenal response to adrenocorticotrophic hormone stimulation in patients with premenstrual syndrome. *Gynecol Endocrinol*. 2004;18:79-87.
5. Roca CA, Schmidt PJ, Altemus M, Deuster P, Danaceau MA, Putnam K, et al. Differential menstrual cycle regulation of hypothalamic-pituitary-adrenal axis in women with premenstrual syndrome and controls. *J Clin Endocrinol Metab*. 2003;88:3057-63.

6. Odber J, Cawood EH, Bancroft J. Salivary cortisol in women with and without perimenstrual mood changes. *J Psychosom Res.* 1998;45:557-68.
7. Mira M, Stewart PM, Abraham SF. Vitamin and trace element status in premenstrual syndrome. *Am J Clin Nutr.* 1988;47:636-4.
8. Facchinetti F, Martignoni E, Petraglia F, Sances MG, Nappi G, Genazzani AR. Premenstrual fall of plasma beta-endorphin in patients with premenstrual syndrome. *Fertil Steril.* 1987;47:570-3.
9. Tulenheimo A, Laatikainen T, Salminen K. Plasma beta-endorphin immunoreactivity in premenstrual tension. *Br J Obstet Gynaecol.* 1987;94:26-9.
10. Chuong CJ, Coulam CB, Bergstrahl EJ, O'Fallon WM, Steinmetz GI. Clinical trial of naltrexone in premenstrual syndrome. *Obstet Gynecol.* 1988;72:332-6.
11. Parry BL, Javeed S, Laughlin GA, Hauger R, Clopton P. Cortisol circadian rhythms during the menstrual cycle and with sleep deprivation in premenstrual dysphoric disorder and normal control subjects. *Biol Psychiatry.* 2000;48:920-31.
12. Korzekwa MI, Lamont JA, Steiner M. Late luteal phase dysphoric disorder and the thyroid axis revisited. *J Clin Endocrinol Metab.* 1996;81:2280-4.
13. Joffe H, Cohen LS, Harlow BL. Impact of oral contraceptive pill use on premenstrual mood: predictors of improvement and deterioration. *Am J Obstet Gynecol.* 2003;189:1523-30.
14. Schmidt PJ, Nieman LK, Grover GN, Muller KL, Merriam GR, Rubinow DR. Lack of effect of induced menses on symptoms in women with premenstrual syndrome. *N Engl J Med.* 1991;324:1174-9.
15. Wyatt K, Dimmock P, Jones P, et al. Efficacy of progesterone and progestogens in management of premenstrual syndrome: systematic review. *BMJ.* 2001;323:776-80.
16. Smith SS, Gong QH. Neurosteroid administration and withdrawal alter GABAA receptor kinetics in CA1 hippocampus of female rats. *J Physiology.* En línea Feb 10,2005 as 10.1113/jphysiol.2004.077297
17. Rapkin AJ, Morgan M, Goldman L, Brann DW, Simone D, Mahesh VB. Progesterone metabolite allopregnanolone in women with premenstrual syndrome. *Obstet Gynecol.* 1997;90:709-14.
18. Bao AM, Hestiantoro A, Van Someren EJW, Swaab DF, Zhou JN. Colocalization of corticotropin-releasing hormone and oestrogen receptor- α in the paraventricular nucleus of the hypothalamus in mood disorders. *Brain, Advance Access,* Feb 10,2005, doi:10.1093/brain/awh448
19. Lund TD, Rovis T, Chung WCJ, Handa RJ. Novel actions of estrogen receptor- β on anxiety-related behaviors. *Endocrinology.* 2005;146:2:797-807.
20. Campagne DM. La gradación del efecto placebo. Un estudio N = 1, doble ciego, con Belladonna homeopática 30 C. *Psiquis.* 2002;4:148-54.
21. Gelder M, Gath D, Mayou R. Concise Oxford textbook of psychiatry. Oxford: Oxford University Press; 1998. p. 242.
22. Watson NR, Studd JWW, Savas M, et al. Treatment of severe premenstrual syndrome with oestradiol patches and cyclical oral norethisterone. *Lancet.* 1989;2:730-2.
23. Rubinow DR, Roy-Byrne P. Premenstrual syndromes: overview from a methodologic perspective. *Am J Psychiatry.* 1984;141:163-72.
24. Brooks J, Ruble D, Clark A. College women's attitudes and expectations concerning menstrual-related changes. *Psychosom Med.* 1977;39:288-98.
25. Haywood A, Slade P, King H. Assessing the assessment measures for menstrual cycle symptoms: a guide for researchers and clinicians. *J Psychosom Res.* 2002;52:223-37.
26. Ross C, Coleman G, Stojanovska C. Factor structure of the modified Moos Menstrual Distress Questionnaire: assessment of prospectively reported follicular, menstrual and premenstrual symptomatology. *J Psychosom Obstet Gynaecol.* 2003;24:163-74.
27. Ruble DN. Premenstrual symptoms: a reinterpretation. *Science.* 1977;197:291-2.
28. Halbreich U, Endicott J. Classification of premenstrual syndromes. En: Friedman R, editor. *Behavior and the menstrual cycle.* New York: Marcel Dekker; 1982.
29. Vila J, Beech HR. Premenstrual symptomatology: an interaction hypothesis. *Br J Soc Clin Psychol.* 1980;19:73-80.
30. AuBuchon PG, Calhoun KS. Menstrual cycle symptomatology: the role of social expectancy and experimental demand characteristics. *Psychosom Med.* 1985;47:35-45.
31. Olasov B, Jackson J. Effects of expectancies on women's reports of moods during the menstrual cycle. *Psychosom Med.* 1987;49:65-77.
32. Eisenberg L. The subjective in medicine. *Perspectives Biol Med.* 1983;27:48.
33. Gallant SJ, Popiel DA, Hoffman DM, Chakraborty PK, Hamilton J. Using daily ratings to confirm premenstrual syndrome/late luteal phase dysphoric disorder. *Psychosom Med.* 1992;54:149-81.
34. Angst J, Sellaro R, Merikangas KR, Endicott J. The epidemiology of perimenstrual psychological symptoms. *Acta Psychiatr Scand.* 2001;104:110-6.
35. Smith MJ, Schmidt PJ, Rubinow DR. Operationalizing DSM-IV criteria for PMDD: selecting symptomatic and asymptomatic cycles for research. *J Psychiatr Res.* 2003;37:75-83.
36. Johannes C, Woods JC, Crawford S, Cochran H, Tran D, Schuth B. Electronic versus paper instruments for daily data collection. *Ann Epidemiol.* 2000;10:457.
37. Gise LH, Lebovits AH, Paddison PL, Strain JJ. Issues in the identification of premenstrual syndromes. *J Nerv Ment Dis.* 1990;178:228-34.
38. Kessel B. Premenstrual syndrome. *Advances in diagnosis and treatment. Obstet Gynecol Clin North Am.* 2000;27:625-39.

39. Steiner M, Haskett R, Carroll B. Premenstrual tension syndrome: the development of research diagnostic criteria and new rating scales. *Acta Psychiatr Scand.* 1980;62:177-90.
40. Campagne DM. Detectar la depresión antes, durante y después de la gestación con el perfil anímico del embarazo. *Prog Obstet Ginecol.* 2004;47:27-35.
41. Parry BL. Psychobiology of premenstrual dysphoric disorder. *Semin Reprod Endocrinol.* 1997;15:55-68.
42. Renckens CNM. Hysterectomy and bilateral oophorectomy for severe premenstrual syndrome. *Hum Reprod.* 2005;20:1113-4.
43. Abraham S, Luscombe G, Soo I. Oral contraception and cyclic changes in premenstrual and menstrual experiences. *J Psychosom Obstet Gynaecol.* 2003;24:185-93.
44. Winkler UH, Ferguson H, Mulders JA. Cycle control, quality of life and acne with two low-dose oral contraceptives containing 20 microg ethinylestradiol. *Contraception.* 2004;69:469-76.
45. Sillem M, Schneiderei R, Heithecker R, Mueck AO. Use of an oral contraceptive containing drospirenone in an extended regimen. *Eur J Contracept Reprod Health Care.* 2003;8:162-9.
46. Joffe H, Cohen LS, Harlow BL. Impact of oral contraceptive pill use on premenstrual mood: predictors of improvement and deterioration. *Am J Obstet Gynecol.* 2003;189:1523-30.
47. Schmidt PJ, Grover GN, Roy-Byrne PP, Rubinow DR. Thyroid function in women with premenstrual syndrome. *J Clin Endocrinol Metab.* 1993;76:671-4.
48. Vellacott ID, Shroff NE, Pearce MY, Stratford ME, Akbar FA. A double-blind, placebo-controlled evaluation of spironolactone in the premenstrual syndrome. *Curr Med Res Opin.* 1987;10:450-6.
49. Burnet RB, Radden HS, Easterbrook EG, McKinnon RA. Premenstrual syndrome and spironolactone. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.* 1991;31:366-8.
50. Wang H, Hammerback S, Lindhe BA, Backstrom T. Treatment of premenstrual syndrome by spironolactone: a double-blind, placebo-controlled study. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 1995;74:803-8.
51. Khoo SK, Munro C, Battistutta D. Evening primrose oil and treatment of premenstrual syndrome. *Med J Aust.* 1990;153:189-92.
52. Collins A, Cerin A, Coleman G, Landgren BM. Essential fatty acids in the treatment of premenstrual syndrome. *Obstet Gynecol.* 1993;81:93-8.
53. Budeiri D, Li Wan Po A, Dornan JC. Is evening primrose oil of value in the treatment of premenstrual syndrome? *Contr Clin Trials.* 1996;17:60-68.
54. Puolakka J, Makarainen L, Viinikka L, Ylikorkola O. Biochemical and clinical effects of treating the premenstrual syndrome with prostaglandin synthesis precursors. *J Reprod Med.* 1985;30:149-53.
55. Mira M, McNeil D, Fraser IS, Vizzard J, Abraham S. Mefenamic acid in the treatment of premenstrual syndrome. *Obstet Gynecol.* 1986;68:395-8.
56. Dalton K. *The premenstrual syndrome and progesterone therapy.* 2nd ed. Chicago: Yearbook Medical Publishers, Inc.; 1984.
57. Sampson GA. Premenstrual syndrome: a double-blind controlled trial of progesterone and placebo. *Br J Psychiatry.* 1979;135:209-15.
58. Van der Meer YG, Benedek-Jaszmann LJ, Van Loenen AC. Effects of high-dose progesterone on the premenstrual syndrome: a double-blind cross-over trial. *J Psychosom Obstet Gynaecol.* 1983;2:220-2.
59. Andersch B, Hahn L. Progesterone treatment of premenstrual tension: a double blind study. *J Psychosom Res.* 1985;29:489-93.
60. Richter MA, Haltvick R, Shapiro SS. Progesterone treatment of premenstrual syndrome. *Curr Ther Res.* 1984;36:850.
61. Maddocks S, Hahn P, Moller F, Reid RL. A double-blind placebo-controlled trial of progesterone vaginal suppositories in the treatment of premenstrual syndrome. *Am J Obstet Gynecol.* 1986;154:573-81.
62. Freeman E, Rickels K, Sondheimer SJ, Polansky M. Ineffectiveness of progesterone suppository treatment for premenstrual syndrome. *JAMA.* 1990;264:349-53.
63. Freeman EW, Richels K, Sondheimer SJ, Polansky M. A double-blind trial of oral progesterone, alprazolam, and placebo in treatment of severe premenstrual syndrome. *JAMA.* 1995;274:51-7.
64. Dennerstein L, Spencer-Gardner C, Gotts G, Brown JB, Smith MA, Burrows GD. Progesterone and the premenstrual syndrome: a double blind cross-over trial. *BMJ (Clin Res Ed).* 1985;290:1617-21.
65. Casson P, Hahn PM, Van Vugt DA, Reid RL. Lasting response to ovariectomy in severe intractable premenstrual syndrome. *Am J Obstet Gynecol.* 1990;162:99-105.
66. Cronje WH, Vashisht A, Studd JW. Hysterectomy and bilateral oophorectomy for severe premenstrual syndrome. *Hum Reprod.* 2004;19:2152-5.
67. Casper RF, Hearn MT. The effect of hysterectomy and bilateral oophorectomy in women with severe premenstrual syndrome. *Am J Obstet Gynecol.* 1990;162:105-9.
68. Rapkin A. A review of treatment of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. *Psychoneuroendocrinology.* 2003;28 Suppl 3:39-53.
69. Mortola JF, Girton L, Fischer U. Successful treatment of severe premenstrual syndrome by combined use of gonadotropin-releasing hormone agonist and estrogen/progestin. *J Clin Endocrinol Metab.* 1991;72:252A-252F.
70. Hussain SY, Massil JH, Matta WH, Shaw RW, O'Brien PM. Buserelin in premenstrual syndrome. *Gynecol Endocrinol.* 1992;6:57-64.

71. Wyatt KM, Dimmock PW, Ismail KM, Jones PW, O'Brien PM. The effectiveness of GnRHa with and without 'add-back' therapy in treating premenstrual syndrome: a metaanalysis. *BJOG*. 2004;111:585-93.
72. Thys-Jacobs S, Starkey P, Bernstein D, Tian J. Calcium carbonate and the premenstrual syndrome: effects on premenstrual and menstrual symptoms. *Am J Obstet Gynecol*. 1998;179:444-52.
73. Pearlstein T, Steiner M. Non-antidepressant treatment of premenstrual syndrome. *Clin Psychiatry*. 2000;61 Suppl 12:22-7.
74. Walker AF, De Souza MC, Vickers MF, Abeyasekera S, Collins ML, Trinca LA. Magnesium supplementation alleviates premenstrual symptoms of fluid retention. *J Womens Health*. 1998;7:1157-65.
75. De Souza MC, Walker AF, Robinson PA, Bolland K. A synergistic effect of a daily supplement for 1 month of 200 mg magnesium plus 50 mg vitamin B6 for the relief of anxiety-related premenstrual symptoms: a randomized, double-blind, crossover study. *J Womens Health Gend Based Med*. 2000;9:131-9.
76. Stone AB, Pearlstein TB, Brown WA. Fluoxetine in the treatment of late luteal phase dysphoric disorder. *J Clin Psychiatry*. 1991;52:290-3.
77. Wood SH, Mortola JF, Chan YF, Moossazadeh F, Yen SS. Treatment of premenstrual syndrome with fluoxetine: a double-blind, placebo-controlled, crossover study. *Obstet Gynecol*. 1992;80:339-44.
78. Menkes DB, Taghavi E, Mason PA, Spears GF, Howard RC. Fluoxetine treatment of severe premenstrual syndrome. *BMJ*. 1992;305:346-7.
79. Sundblad C, Hedberg MA, Eriksson E. Clomipramine administered during the luteal phase reduces the symptoms of premenstrual syndrome: a placebo-controlled trial. *Neuropsychopharmacology*. 1993;9:133-45.
80. Eriksson E, Hedberg MA, Andersch B, Sundblad C. The serotonin reuptake inhibitor paroxetine is superior to the noradrenaline reuptake inhibitor maprotiline in the treatment of premenstrual syndrome: a placebo-controlled trial. *Neuropsychopharmacology*. 1995;12:167-76.
81. Steiner M, Steinberg S, Stewart D, Carter D, Berger C, Reid R, et al. Fluoxetine in the treatment of premenstrual dysphoria. *N Engl J Med*. 1995;332:1529-34.
82. Yonkers KA, Halbreich U, Freeman E, Brown C, Endicott J, Frank E, et al, for the Sertraline Premenstrual Dysphoric Collaborative Study Group. Symptomatic improvement of premenstrual dysphoric disorder with sertraline treatment. A randomized controlled trial. *JAMA*. 1997;278:983-8.
83. Eriksson E. Serotonin re-uptake inhibitors for the treatment of premenstrual dysphoria. *Int Clin Psychopharmacol*. 1997;14 Suppl 2:27-33.
84. Pearlstein TB, Stone AB, Lund SA, Scheft H, Zlotnick C, Brown WA. Comparison of fluoxetine, bupropion and placebo in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. *J Clin Psychopharmacol*. 1997;17:261-6.
85. Freeman EW. Luteal phase administration of agents for the treatment of premenstrual dysphoric disorder. *CNS Drugs*. 2004;18:453-68.
86. Freeman EW, Rickels K, Sondheimer SJ, Polansky M, Xiao S. Continuous or intermittent dosing with sertraline for patients with severe premenstrual syndrome or premenstrual dysphoric disorder. *Am J Psychiatry*. 2004;161:343-51.
87. Halbreich U, Smoller JW. Intermittent luteal phase sertraline treatment of dysphoric premenstrual syndrome. *J Clin Psychiatry*. 1997;58:399-402.
88. Freeman EW, Sondheimer SJ. Premenstrual dysphoric disorder: recognition and treatment. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry*. 2003;5:30-9.
89. Blum I, Lerman M, Misrahi I, Nordenberg Y, Grosskopf I, Weizman A, et al. Lack of plasma norepinephrine cyclicality, increased estradiol during the follicular phase, and of progesterone and gonadotrophins at ovulation in women with premenstrual syndrome. *Neuropsychobiology*. 2004;50:10-5.
90. Huang KL, Tsai SJ. StJohn's wort (*Hypericum perforatum*) as a treatment for premenstrual dysphoric disorder: case report. *In J Psychiatr Med*. 2003;33:295-7.
91. Smith S, Rinehart JS, Ruddock VE, Schiff I. Treatment of premenstrual syndrome with alprazolam: results of a double-blind, placebo-controlled, randomized crossover clinical trial. *Obstet Gynecol*. 1987;70:37-43.
92. Harrison WM, Endicott J, Nee J. Treatment of premenstrual dysphoria with alprazolam. *Arch Gen Psychiatry*. 1990;47:270-5.
93. West CP, Hillier H. Ovarian suppression with the gonadotrophin-releasing hormone agonist goserelin (Zoladex) in management of the premenstrual tension syndrome. *Hum Reprod*. 1994;9:1058-63.
94. Moynihan R. Controversial disease dropped from Prozac product information. *BMJ*. 2004;328:365.
95. Harrison W, Sharpe L, Endicott J. Treatment of Premenstrual symptoms. *Gen Hosp Psychiatry*. 1985;7:54-65.
96. Minton JP, Foecking MK, Webster DJT. Caffeine, cyclic nucleotides and breast disease. *Surgery*. 1979;86:105.
97. Schellenberg R. Treatment for the premenstrual syndrome with agnus castus fruit extract: prospective, randomized, placebo controlled study. *BMJ*. 2001;322:134-7.
98. Daniele C, Thompson Coon J, Pittler MH, Ernst E. *Vitex agnus castus*: a systematic review of adverse events. *Drug Saf*. 2005;28:319-32.
99. Atmaca M, Kumru S, Tezcan E. Fluoxetine versus *Vitex agnus castus* extract in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. *Hum Psychopharmacol*. 2003;18:191-5.
100. The American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin, Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists, «Premenstrual Syndrome», Number 15, April 2000.

101. Bailey JW, Cohen LS. Prevalence of mood and anxiety disorders in women who seek treatment for premenstrual syndrome. *J Womens Health Gend Based Med.* 1999;8:1181-4.
102. Keye WR Jr, Trunnell EP. A biopsychosocial model of premenstrual syndrome. *Int J Fertil.* 1986;31:259-62.
103. Keye WR Jr. Premenstrual syndrome. Seven steps in management. *Postgrad Med.* 1988;83:167-73.
104. Woods NF, Mitchell ES, Lentz MJ. Social Pathways to premenstrual symptoms. *Res Nurs Health.* 1995;18:225-37.
105. Pérez R, Ferreres A, Gadea M, González E, Hernández A, Navarro N. Efectos de la información acerca del ciclo menstrual sobre las actitudes hacia la menstruación. *Psicothema.* 1995;7:2:297-308.
106. Kirsch JR, Geer JH. Skin conductance and heart rate in women with premenstrual syndrome. *Psychosom Med.* 1998;50:175-82.
107. Elliot TR. Problem-solving appraisal, oral contraceptive use, and menstrual pain. *J Appl Soc Psychol.* 1992;22:286-97.
108. Schmidt PJ, Grover GN, Hoban M, Rubinow DR. State-dependent alterations in the perception of life events in menstrual-related mood disorders. *Am J Psychiatry.* 1990;147:2, 230-4.
109. Ussher JM, Wilding JM. Performance and state changes during the menstrual cycle, conceptualized within a broad band testing framework. *Social Sci Med.* 1991;32:525-34.
110. Morgan M, Rapkin AJ, D'Elia L, Reading A, Goldman L. Cognitive functioning in premenstrual syndrome. *Obstet Gynecol.* 1996;88:961-6.
111. Van Tilburg MA, Becht MC, Vingerhoets AJ. Self-reported crying during the menstrual cycle: sign of discomfort and emotional turmoil or erroneous beliefs? *J Psychosom Obstet Gynaecol.* 2003;24:247-55.
112. Christensen AP, Oei TP. The efficacy of cognitive behaviour therapy in treating premenstrual dysphoric changes. *J Affect Disord.* 1995;33:57-63.
113. Blake F, Salkovskis P, Gath D, Day A, Garrod A. Cognitive therapy for premenstrual syndrome: a controlled trial. *J Psychosom Res.* 1998;45:307-18.
114. Hunter MS, Essher JM, Cariss M, Browne S, Jelley R, Katz M. Medical (fluoxetine) and psychological (cognitive-behavioural therapy) treatment for premenstrual dysphoric disorder: a study of treatment processes. *J Psychosom Res.* 2002;53:811-7.
115. Hunter MS, Ussher JM, Browne SJ, Cariss M, Jelley R, Katz M. A randomized comparison of psychological (cognitive behavior therapy), medical (fluoxetine) and combined treatment for women with premenstrual dysphoric disorder. *J Psychosom Obstet Gynaecol.* 2002;23:193-9.
116. Dickerson LM, Mazyck PJ, Hunter MH. Premenstrual Syndrome. *Am Fam Physician.* 2003;67:1743-52.
117. Grady-Weliky TA. Clinical practice: premenstrual dysphoric disorder. *N Engl J Med.* 2003;348:433-8.