# Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2007;58[6]:609)

## Úlceras por presión

*Figura 1.* Lesión recubierta de fibrina en el arco palatino.

*Criterios de diferenciación*

- En general más dolorosas.
- Se puede descubrir una causa local (en este caso una muela de juicio superior erupcionada).
- El resto de la mucosa no presenta alteraciones.
- Regresión espontánea una vez eliminada la causa.
- Ausencia de alteraciones cutáneas.

*Diagnósticos diferenciales*

*Carcinoma de células escamosas:* crecimiento más lento, base y borde infiltrados, histología, menos doloroso.

*Afta:* posibilidad de confusión, no se identifica una causa local.

*Quemadura:* frecuentemente restos de ampollas marginales, anamnesis.

*Enfermedad de Behçet:* alteraciones oculares y genitales, habitualmente varios focos aislados intraorales.

*Enfermedades ampollosas:* en general afectación del resto de la mucosa, histología.

## Tratamiento

Eliminación de la causa, seguimiento de la regresión.

Correspondencia: Wolfgang Bengel.
Wilhelm-Leuschner-Strasse 11, 64625 Bensheim, Alemania.

## Liquen erosivo de mucosas



*Figura 2.* Erosiones recubiertas de fibrina en la parte posterior de la mucosa yugal.

*Criterios de diferenciación*

- El dolor no suele ser el síntoma principal.
- No se logra descubrir una causa local.
- El resto de la mucosa muestra los signos característicos de liquen.
- Sin regresión espontánea.
- Posibilidad de alteraciones cutáneas: pápulas parduzcas preferentemente en las caras flexoras de los antebrazos.

*Diagnósticos diferenciales*

*Afta:* sólo posibilidad de confusión en caso de formas circunscritas, ausencia de los signos característicos de liquen en los bordes y en el resto de la mucosa.

*Enfermedad de Behçet:* alteraciones oculares y genitales, habitualmente varios focos aislados intraorales.

*Enfermedades ampollosas:* en general afectación del resto de la mucosa, histología, ausencia de los signos característicos de liquen en los bordes y en el resto de la mucosa.

*Tratamiento*

Sólo se trata la forma erosiva, geles de corticosteroides, en casos graves administración de corticoides sistémicos.