

ANEURISMA VENOSO

J. SALA DE PABLO

Hospital Provincial de Soria

El aneurisma venoso cuya historia clínica y fotografías aportamos, creemos que constituye una rareza, sobre todo por lo que a su localización respecta.

Se trata de un enfermo de 27 años que desde hacía tres, sin antecedentes previo, le apareció en cara interna de rodilla derecha un abultamiento del tamaño de




Fig. 1




Fig. 2

una avellana, de vez en cuando disminuía de tamaño, y al comprimirlo desaparecía. Hacía un mes aproximadamente que había tenido molestias en la pierna derecha y fiebre no muy elevada durante unos cinco días. A partir de este momento, el bulto

fué creciendo poco a poco hasta adquirir el tamaño que puede apreciarse en la figura 1.^a, haciéndose irreductible. Su forma era ovoidea y sus ejes transversales y longitudinales median 4,6 y 6 cm. respectivamente. En su parte más prominente tenía, desde hacía unos diez días, una zona del tamaño de un círculo de 2 cm. de diámetro, de color azulado y piel adelgazada. A su polo inferior aflua una vena tortuosa. Su consistencia era semidura, homogénea, adherida a planos superficiales y profundos. Mediante punción se extrajo una pequeña cantidad de sangre de color rojo pálido muy fluida.

Esta tumoración fué extirpada. Un fácil plano de clivaje permitió una rápida enucleación, excepto en sus dos polos donde se continuaba con una vena tortuosa (figura 2).

Incandida la pieza extirpada, se halló una pequeña cavidad del tamaño de una avellana y coágulos organizados adheridos a la pared venosa.

El enfermo curó sin que hayamos vuelto a tener noticias de él, desde hace 15 años.

Se trata, pues, de una dilatación aneurismática de una vena correspondiente al sistema de la safena interna y consecutiva esta dilatación a un proceso tromboflebítico que debió ocurrir en el momento en que el enfermo atravesó el breve episodio febril y doloroso.

Con alguna frecuencia se citan dilataciones aneurismáticas de la safena interna a nivel de la región crural, las cuales pueden confundirse con una hernia crural cuando la dilatación es reductible, pero la localización a nivel de la cara interna de la rodilla creemos constituye una excepción.

RESUMEN

Se expone un caso raro de aneurisma venoso trombosado de la safena interna, a nivel de la rodilla, curado por extirpación.

SUMMARY

A rare case of thrombosed aneurysm of the saphenous vein, at the knee level, is reported. Cure was obtained by excision.