Aneurisma de vena poplítea recidivado

P. Rodríguez-Cabeza, C. Esteban-Gracia, P. Pérez-R., C. Lisbona-S.,
R. Lerma-R., A. Martorell-L., J.M. Callejas-P.

Figura 1. Abordaje posterior del aneurisma poplíteo.

Figura 2. Bypass venoso con vena safena interna contralateral.

La necesidad del tratamiento quirúrgico de los aneurismas de vena poplítea radica en su potencial capacidad embolígena [1]. Se han descrito diversas técnicas quirúrgicas en la literatura; entre ellas, la aneurismectomía tangencial con venorrafia lateral es la más aceptada [2].

Caso clínico. Varón de 54 años, fumador activo, con una hepatitis A en la infancia como único antecedente

patológico de interés, que a raíz de parestias en la pierna derecha fue diagnosticado mediante eco-Doppler de un aneurisma sacular de vena poplítea de 3 cm de diámetro máximo.

Con el paciente en decúbito prono, se practica una incisión en hueco poplíteo (Fig. 1). Se procede a la apertura del saco aneurismático, sin hallarse trombo en su interior y apreciándose una considerable diferencia en la calidad de la pared venosa entre la del saco aneurismático (que se extrae) y la del fondo de la vena poplítea (que se halla sana). Finalmente, se practica una aneurismorrafia con parche de vena safena externa homolateral.

El postoperatorio transcurre sin incidencias y el paciente es alta al sexto día de la intervención con tratamiento anticoagulante.

Aceptado tras revisión externa: 16.03.07.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona, España.

Correspondencia: Dra. Patricia Rodríguez Cabeza. Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra. Canyet, s/n. E-08916 Badalona (Barcelona). Fax: +34 934 978 940. E-mail: prodrica@hotmail.com

© 2007, ANGIOLOGÍA

El paciente siguió controles ecográficos ambulatorios al mes y a los seis meses, hallándose una correcta permeabilidad de la vena; sin embargo, el control ecográfico anual objetivó una recidiva del aneurisma, que se confirmó mediante flebografía.

Se reintervino practicándose un *bypass* desde la tercera porción de la vena poplítea a la primera porción con vena safena interna contralateral (del muslo) no invertida, con ligadura proximal del saco aneurismático venoso (Figs. 2 y 3).

Un mes después de la intervención, el control ecográfico objetivó una trombosis total del aneurisma y una correcta permeabilidad del *bypass*.

Discusión. Existen diversas técnicas quirúrgicas descritas para el tratamiento de los aneurismas de vena poplítea, pero la elección de la más adecuada depende, en muchos casos, de los hallazgos morfológicos intraoperatorios [3].

El resultado a largo plazo de la reconstrucción de vena poplítea está pobremente documentado en la bibliografía; pese a ello, el tratamiento más adecuado de los aneurismas de vena poplítea sintomáticos es quirúrgico, con el fin de evitar el tromboembolismo pulmonar.

Figura 3. Imagen del postoperatorio inmediato con *bypass* venoso permeable y aneurisma parcialmente trombosado.

Bibliografía

1. Sessa C, Nicolini P, Perrin M, Farra I, Magne J, Guidicelli H. Management of symptomatic and asymptomatic popliteal venous aneurysms: a retrospective analysis of 25 patients and a review of the literature. *J Vasc Surg* 2000; 32: 902-12.
2. Coffman SW, Leon SM, Gupta SK. Popliteal venous aneurysms: report of an unusual presentation and literature review. *Ann Vasc Surg* 2000; 14: 286-90.
3. Bergqvist D, Björck M, Ljungman C. Popliteal venous aneurysms. A systematic review. *World J Surg* 2006; 30: 273-9.