



IMAGEN CLÍNICA DEL MES

Caso 7. Degeneración quística adventicial de la arteria poplítea



Case 7. Degeneration of an adventitial cyst of the popliteal artery

M. Barbosa Barros*, L. Carpintero Mediavilla, J.A. Gonzalez Fajardo y C. Vaquero Puerta

Servicio de Angiología y Cirugía Vascul, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

Recibido el 18 de septiembre de 2014; aceptado el 27 de octubre de 2014
Disponibile en Internet el 5 de enero de 2015

Historia clínica

Varón de 38 años que acude por claudicación gemelar derecha invalidante a 10m desde hace 2 meses y parestesias en pie derecho. Cardiópata con IAM a los 32 y 36 años, ex-fumador y dislipémico. A la exploración: ausencia de pulsos poplíteo y distales en extremidad inferior izquierda a la extensión con recuperación al flexionar la rodilla. ITB derecho: 0,64.

Se realiza arteriografía (fig. 1).

Pregunta: ¿Qué diagnóstico cree más probable?

- a) Atrapamiento poplíteo
- b) Quiste adventicial
- c) Embolia
- d) Arteritis

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.



Figura 1 Arteriografía preoperatoria evidenciando el defecto de relleno en la 1.ª porción poplítea derecha (flecha).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mbbvasc@gmail.com (M. Barbosa Barros).