

La imagen del mes

Hernia de Spiegel incarcerada

Incarcerated Spiegel Hernia

Fernando Estremiana Garcia^{a,*}, Laura Lladó Garriga^a, Richard Mast Vilaseca^b y Antonio Rafecas-Renau^a

^aServicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

^bServicio de Radiología, Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España



Figura 1




Figura 2

Paciente de 71 años que acude a urgencias por clínica de 3 días de evolución de dolor en FII y ausencia de deposiciones en las últimas 48 h, acompañados de fiebre de 38 °C.

En la exploración destaca zona indurada dolorosa a la palpación en FII con descompresión positiva. Analítica dentro de los parámetros de la normalidad. Se solicita tomografía computarizada, que informa de hernia de Spiegel.

Se interviene de urgencia, y se confirman la hernia de Spiegel con apéndice epiploico necrosado en su interior; se realiza hernioplastia más malla, sin incidencias, y se da el alta hospitalaria a los 4 días.

En las figuras 1 y 2 se muestra una imagen axial de tomografía computarizada y reconstrucción coronal en fase portal que muestran herniación de apéndice epiploico de la cara antimesentérica de sigma a través de diástasis entre los músculos oblicuo y recto abdominal anterior izquierdos (flechas); se acompaña de cambios inflamatorios de la grasa mesentérica (asteriscos) y del tejido subcutáneo adyacente, así como líquido a nivel del saco.

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: fernando_estremiana@yahoo.es (F. Estremiana Garcia).