

La imagen del mes

Neumatosis gástrica secundaria a estenosis pilórica de origen péptico

Gastric pneumatosis secondary to a pyloric stenosis of peptic origin

Marta Gutiérrez Andreu ^{a,*}, Bárbara Otero Perpiñá ^b, Carolina Muñoz ^c
y Felipe De La Cruz Vigo ^d

^a Cirugía General y del Aparato Digestivo A, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

^b Medicina Interna, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

^c Medicina Aparato Digestivo, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

^d Cirugía General y del Aparato Digestivo A, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España



Figura 1



Figura 2

Varón de 75 años de edad que acude a urgencias por presentar vómitos biliosos de tres días de evolución y cuadro de somnolencia. A la exploración física presenta un abdomen distendido sin dolor a la palpación ni signos de irritación peritoneal. En el estudio analítico destaca una neutrofilia y alcalosis metabólica. Se realizó una radiografía de abdomen, en la que se observa una marcada dilatación gástrica, con neumatosis de la pared gástrica (figs. 1 y 2). Tras la colocación de una sonda nasogástrica, se observa la salida de 1.000 cm³ de contenido bilioso. Se efectuó una fibrogastroscoopia que mostró una úlcera duodenal, con una estenosis pilórica secundaria.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: martaguti21@hotmail.com (M. Gutiérrez Andreu).

0009-739X/\$ - see front matter © 2009 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

doi:10.1016/j.ciresp.2009.09.010