CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia

La imagen del mes

Hernia diafragmática postraumática de diagnóstico diferido

Delayed diagnosis of a post-traumatic diaphragmatic hernia

Lucía Lesquereux Martínez *, *Purificación Parada González*, *José Antonio Puñal Rodríguez* y *Jorge Juan Matínez Castro*

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, La Coruña, España



Figura 1

Figura 2

La hernia diafragmática traumática es una entidad poco frecuente y de diagnóstico difícil que debe sospecharse incluso ante traumatismos banales toraco-abdominales; omitiéndose con frecuencia en fase aguda, lo que aumenta el riesgo de complicaciones tardías.

Las imágenes de TC (figs. 1 y 2) corresponden a una paciente de 27 años que consulta por dolor epigástrico intenso y vómitos. Hace 2 años sufrió caída casual y desde entonces presenta episodios similares de menor intensidad. Con diagnóstico de hernia diafragmática fue intervenida quirúrgicamente realizándose reducción del contenido herniado y cierre del defecto diafragmático con sutura irreabsorbible por vía toracoscópica.

* *Autor para correspondencia.*
Correo electrónico: lucialesquereux@hotmail.com (L. Lesquereux Martínez).
0009-739X/$ – see front matter © 2010 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
doi:10.1016/j.ciresp.2010.07.021