

## La imagen del mes

**Schwannoma axilar: una localización poco habitual****Axillary Schwannoma: an unusual location**

Eva Iglesias Porto<sup>a,\*</sup>, Jorge Quiroga Martínez<sup>b</sup>, María Isabel Pérez Moreiras<sup>a</sup> y Rocío González López<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Xeral-Calde de Lugo, Lugo, España

<sup>b</sup>Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España




Figura 1




Figura 2



Figura 3

Varón de 64 años que como antecedente destacado presenta linfoma esplénico vellosa por el que se realizó esplenectomía, sin necesidad de otros tratamientos. En su seguimiento se detecta, en TC (figs. 1 y 2) y RMN torácica, una tumoración heterogénea y ovoidea de partes blandas axilar derecha, adyacente a la pared torácica, entre los músculos subescapular y serrato. Se realiza PAAF, no concluyente, por lo que se decide intervención quirúrgica para exéresis, hallándose tumoración bien delimitada, no infiltrante (fig. 3). El resultado anatómo-patológico definitivo fue de Schwannoma, que se trata de una afección poco frecuente y de extraña localización en este caso.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: evaiglesiasporto@yahoo.es (E. Iglesias Porto).

0009-739X/\$ – see front matter © 2010 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

doi:10.1016/j.ciresp.2011.01.015