

La imagen del mes

Masa abdominal gigante de origen indeterminado, ¿es el carcinoma de células cromóforas un diagnóstico a tener en cuenta?

Giant abdominal mass of undetermined origin: Should the diagnosis of chromophobe carcinoma be considered?

Francisco Javier Gonzalez Rodriguez*, Manuel Bustamante Montalvo, Aquilino Fernandez Perez y Cristina Fernandez Saavedra

Servicio de Cirugía, Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela, La Coruña, España



Figura 1



Figura 2




Figura 3

Paciente de 46 años sin antecedentes de interés con sensación de plenitud posprandial y una masa a nivel epigástrico (fig. 1). En la TC abdominal observamos una gran masa de $37 \times 27 \times 30$ cm situada entre el lóbulo hepático izquierdo, el páncreas, el riñón y el hilio esplénico (fig. 2). Existe una ligera elevación de marcadores tumorales: Ca 19.9 (80,8 U/ml), y Ca 15.3 (85 U/ml). Realizamos una resección en bloque de la masa, revelando el estudio anatomopatológico un carcinoma de células cromóforas variante eosinofílica grado 3 nuclear de Fuhrman, con extensa necrosis central (fig. 3). Este tipo de tumor es poco frecuente, con buen pronóstico, con poca tendencia a progresar y metastatizar, y con una supervivencia aproximada a los 10 años del 90%, siendo el tamaño tumoral, la presencia de diferenciación sarcomatoide y la necrosis tumoral los factores pronósticos más importantes.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: fran.padroso@gmail.com (F.J. Gonzalez Rodriguez).

0009-739X/\$ – see front matter © 2013 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2013.02.020>