

La imagen del mes

Quiste hidatídico glúteo sobreinfectado[☆]

Infected gluteal hydatid cyst

Isabel Belda González^{a,*}, Daniel Soliva Martínez^a,
Sagrario Relanzon Molinero^a y María José Cantero Ayllon^b

^a Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España

^b Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España



Figura 1



Figura 2

Mujer de 77 años con antecedente de quiste hidatídico glúteo intervenido hace años, que acude a urgencias por supuración por la cicatriz, donde se aprecia salida de vesículas hijas y material purulento. Se realizan pruebas complementarias, y tanto en TC como en RM se aprecian quistes hidatídicos multivesiculares en músculo glúteo derecho (fig. 1), que afectan a los músculos adyacentes y se extienden a pelvis (fig. 2), con alteración de la grasa adyacente, posiblemente por sobreinfección. Con el diagnóstico de hidatidosis musculoesquelética extensa sobreinfectada se interviene, realizando desbridamiento y exéresis de las lesiones accesibles, con buena evolución posterior.

[☆] El contenido del trabajo ha sido publicado parcialmente, como parte de una presentación tipo póster en el Congreso Europeo de Radiología, celebrado en Viena del 7 al 11 de marzo de 2013; el nombre del trabajo era «Imaging findings in complicated hydatid disease». Las figuras son originales.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: isa_belda@yahoo.es, tengoguardia@hotmail.com (I. Belda González).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2014.04.004>

0009-739X/© 2014 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.