

La imagen del mes

Hernia epigástrica con incarceration del antro gástrico



Epigastric hernia with gastric antrum incarceration

Janet Pagnozzi Angel^{a,*}, Paul Ugalde^a, Fatima Perez Lopez^b
y José Carlos Fernández Fernández^{a,b}

^a Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

^b Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España



Figura 1



Figura 2




Figura 3

Mujer de 95 años con vómitos y dolor epigástrico de 2 días de evolución. A la exploración, tumoración epigástrica irreducible dolorosa (fig. 1 reconstrucción 3D por TC). En la tomografía computarizada se objetiva una hernia epigástrica que contiene el antro gástrico con mucosa edematosa (fig. 2 corte coronal, fig. 3 corte sagital). Se interviene de urgencias evidenciando defecto de pared de 4 cm, por el cual protruye una zona circular de 2 × 2 cm de antro gástrico, con área fibrótica circular en su superficie que no obstruye el paso. Se reintroduce el contenido herniario, que presenta un aspecto viable a la cavidad, y se coloca malla de polipropileno fijándola con puntos sueltos de material irreabsorbible, siendo alta al tercer día de ingreso sin complicaciones.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: jpagnozzi@hotmail.com (J. Pagnozzi Angel).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2014.09.013>

0009-739X/© 2014 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.