



La imagen del mes

Hidatidosis peritoneal masiva de diagnóstico tardío tras traumatismo abdominal cerrado



Late diagnosis of massive peritoneal hidatidosis after blunt abdominal trauma

Montiel Jiménez-Fuertes^{a,*}, Jaime Ruíz-Tovar^a, Antonia Arjonilla-Lopez^b
y Damián García-Olmo^c

^a Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid, España

^b Servicio de Radiología, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid, España

^c Servicio de Cirugía General y Digestiva, Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España




Figura 1

Mujer de 38 años que consulta por dolor y distensión abdominal progresiva. Como antecedente presentaba un quiste hidatídico en segmento VII diagnosticado mediante ecografía tras sufrir un accidente de tráfico 2 años antes. La TAC (fig. 1) evidenció innumerables lesiones en el contexto de hidatidosis diseminada. En la cirugía se evidenció hidatidoperitoneo (líquido cristalino en el que flotaban múltiples vesículas), con hidatidosis diseminada múltiple y carcinomatosis hidatídica (quistes milimétricos diseminados en la superficie peritoneal). Se realizó aspiración del líquido, esplenectomía, quistoperiquistectomía, resección diafragmática bilateral, exéresis de las vesículas visibles y peritonectomía con electrofulguración del peritoneo parietal no resecado.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: montieljf@hotmail.com (M. Jiménez-Fuertes).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2015.08.005>

0009-739X/© 2015 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.