



CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



La imagen del mes

Tumor anal gigante

Giant anal tumor



Aida Cristina Rahy-Martín *, **Alberto Felipe Bravo-Gutiérrez**, **Vicente Medina-Arana**
y **Antonio Alarcó-Hernández**

Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Universitario de Canarias, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España



Figura 1



Figura 2

Varón de 52 años con una lesión tumoral anal de 6 meses de evolución. El paciente refería pérdida ponderal de 20 kg, dolor y sangrado local. A la exploración se evidenciaba una tumoración exofítica de 20 × 18 cm en el margen anal, ulcerada, con drenaje purulento (fig. 1). La tomografía computarizada objetivó una extensa masa pélvica, sin infiltración de la pared rectal (fig. 2). Se realizó una amputación abdomino-perineal y radioterapia posterior. El estudio anatómo-patológico informó de la lesión como condiloma acuminado gigante o tumor de Buschke-Löwenstein. Dos meses después de la cirugía, el paciente presentó una recidiva local y un rápido deterioro de su estado general, falleciendo después de pocas semanas.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: aidarahy@hotmail.com (A.C. Rahy-Martín).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2015.12.013>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.