



La imagen del mes

Pancreatitis aguda secundaria a diverticulitis duodenal periampular



Acute pancreatitis secondary to periampullary duodenal diverticulitis

Ismael Mora-Guzmán*, José Luis Muñoz de Nova, Íñigo García-Sanz y Elena Martín-Pérez

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España



Figura 1



Figura 2

Mujer de 93 años con antecedentes de pancreatitis y colecistitis aguda de repetición que acude a Urgencias por dolor abdominal epigástrico con irradiación a la espalda y náuseas. Analítica con parámetros inflamatorios normales, amilasa 1.261 U/l, perfil hepático sin alteraciones. La tomografía computarizada objetiva múltiples divertículos duodenales, y detecta uno a nivel periampular con signos inflamatorios locales, que impronta sobre colédoco intrapancreático (figs. 1 y 2). Vía biliar extrahepática sin alteraciones, y páncreas con atrofia leve y un conducto de Wirsung con dilatación moderada. La paciente cursó ingreso y manejo conservador con evolución favorable y alta hospitalaria a la semana.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: moraguzman.dr@gmail.com (I. Mora-Guzmán).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.03.009>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.